2024江苏省滨湖区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背200题附答案（突破训练）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.患者，女，77岁，53kg，既往糖尿病病史10年，因“反复尿路感染4个月，加重3天”来院就诊。4个月前，患者无明显诱因出现排尿疼痛，间断低热，体温波动在37.2℃～37.5℃之间，自服左氧氟沙星片0.29bid治疗5天后好转停药。其间多次反复发作，自服左氧氟沙星片好转。3天前，患者再次出现尿路刺激症状，自行口服左氧氟沙星0.29bid治疗后无明显好转。门诊查尿常规示：白细胞（+++），白细胞计数463.2/gl，细菌计数1262.1/μl。查体：T37.9℃P86次/分R21次/分BP132/77mmHg，心、肺听诊无异常，腹平软，无压痛及反跳痛，左肾区叩击痛（+），双下肢无水肿。辅助检查：血常规：白细胞计数12.35×109/L、中性粒细胞百分比86.5%，CRP69.5mg/L。血生化：AST15U/L，ALT11U/L，ALB43.29/L，Scr669mol/L。尿培养及药敏试验结果：大肠埃希菌（ESBLs+），细菌计数>105cfu/ml；对左氧氟沙星耐药，对哌拉西林一他唑巴坦、亚胺培南敏感。

A: HAS—BLED评分

B: CAT评分

C: 计算肌酐清除率

D: CTP评分

答案：C

2.青蒿素联用乙胺嘧啶抗疟

A: 作用不同的靶点

B: 协同作用

C: 促进机体的利用

D: 延缓或降低抗药性

答案：D

3.氯霉素的禁用范围是

A: 1岁以下婴儿

B: 婴幼儿

C: 新生儿

D: 3岁以下幼儿

答案：C

4.无水乙醇5ml加入10%葡萄糖注射液100ml中静滴，用于解救

A: 氰化氢中毒

B: 氟乙酰胺中毒

C: 瘦肉精中毒

D: 有机磷杀虫药中毒

答案：B

5.以下血浆脂质水平检查结果中，不能判断为高脂血症的是

A: 三酰甘油(TG)高于同年龄正常值

B: 总胆固醇(Tc)高于同年龄正常值

C: 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-ch)高于同年龄正常值

D: 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-ch)高于同年龄正常值

答案：A

6.早期AD患者选用

A: 普拉克索

B: 加兰他敏

C: 金刚烷胺

D: 司来吉兰

答案：B

7.用于前列腺增生症的高选择性 α1A 受体阻断剂是（）

A: 坦索罗辛

B: 托特罗定

C: 索利那新

D: 特拉唑嗪

答案：A

8.处方的法律性质主要是指()。

A: 因开具处方或调配处方所造成的医疗差错或事故，医师和药师分别负有相应的法律责任

B: 因处方所造成的医疗差错或事故，医师负有法律责任

C: 医师具有诊断权和开具处方权和调配处方权

D: 药师具有审核、调配处方权和开具处方权

答案：A

9.对由营养不良、婴儿期所致的恶性贫血者应选用

A: 富马酸亚铁

B: 维生素 K

C: 叶酸+维生素 B

D: 甲磺酸去铁胺

答案：C

10.癌症患者化疗出现腹泻合并中性粒细胞核左移时，需给予的预防性治疗药物是

A: 药用炭

B: 洛哌丁胺

C: 奠沙必利

D: 广谱抗生素

答案：D

11.可致直立性低血压的抗焦虑药物为（）

A: 氟西汀

B: 丁螺环酮

C: 劳拉西泮

D: 阿米替林

答案：D

12.口服补液盐(氯化钠3．5g、碳酸氢钠2．5g和葡萄糖20g，加水至1000ml)用于中度脱水腹泻病人，成人给予3400ml。问给予体重10kg的患儿口服补液盐多少克，应配制成多少毫升

A: 20.89，800ml

B: 12.69，485ml

C: 22.19，850ml

D: 24.79，950ml

答案：B

13.降钙素

A: 骨形成刺激剂

B: 骨吸收抑制剂

C: 促进骨矿化剂

D: 激素替代剂

答案：B

14.以下临床用药的事例中，由于药物相互作用影响药物分布的是

A: 阿司匹林合用格列美脲

B: 抗酸药合用四环素类

C: 磺胺类药与青霉素合用

D: 同服甲氧氯普胺或丙胺太林

答案：A

15.药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示并不存在风险，目前不需采取措施的信号属于

A: 尚不确定的信号

B: 驳倒的信号

C: 部分确认的信号

D: 确认的信号

答案：B

16.患者，男，50岁，身高167cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查：空腹血糖7.8mmol／L（正常值：3.9～6.1mmol／L），餐后血糖14.8mmol／L；血尿酸580μmol/L（正常值：男性180～440μmol／L），低密度脂蛋白胆固醇3.7mmol／L（正常值：2.1～3.1mmol／L），肌酐清除率100ml／min。颈动脉彩超提示：动脉粥样硬化，有混合性脂质斑块。临床诊断为2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A: ALT升高

B: 腹胀

C: 低血糖

D: 心律失常

答案：B

17.告知"培高利特致心脏瓣膜病风险已经撤市"属于

A: 合理用药信息

B: 禁忌证

C: 药品不良反应

D: 药物相互作用

答案：C

18.是前药，其活性代谢产物是强效的选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂，通常用于甲型或乙型流感病毒治疗的是

A: 干扰素

B: 奥司他韦

C: 氟胞嘧啶

D: 更昔洛韦

答案：B

19.用药后可出现痛风、面色潮红的抗结核药是

A: 链霉素

B: 吡嗪酰胺

C: 利福平

D: 乙胺丁醇

答案：B

20.伴有认知障碍的老年帕金森病患者，首选治疗药物为

A: 金刚烷胺

B: 司来吉兰

C: 复方左旋多巴

D: 苯海索

答案：C

21.患者，男，60岁，呈典型的“面具脸”、“慌张步态”及“小字征”表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病药物是（）

A: 普拉克索

B: 司来吉兰

C: 左旋多巴

D: 多奈哌齐

答案：C

22.可降低性传播疾病感染风险的个体避孕措施是

A: 宫内节育器

B: 口服复方短效避孕药

C: 使用避孕套

D: 外用杀精剂

答案：C

23.关于蛇咬伤中毒后的一般处理措施，叙述错误的是

A: 在伤口上做多个“十”字小切口以便排毒

B: 用绳索将伤口的近心端5cm处捆住，以防止毒液在体内扩散

C: 用1：1000高锰酸钾溶液反复冲洗伤口

D: 每隔15～20min放松带子1～2min.以防止肢体缺血坏死

答案：C

24.欧洲药物管理局(EMA)提议“限制临床使用多潘立酮”的主要原因是

A：可能引起腹胀、胃灼热

B：易发生严重的口腔溃疡

C：消化不良患者常擅自服用

D：可能引起心脏相关风险

答案：D

25.用于治疗氰化物中毒的解救药物是

A：谷胱甘肽

B：亚硝酸钠

C：盐酸烯丙吗啡

D：双解磷

答案：B

26.大剂量或连续使用顺铂可导致药源性肾病的机制是

A：不可逆性肾小管坏死

B：前列腺素合成障碍

C：阻塞肾小管、肾小球

D：肾间质纤维化

答案：A

27.关于头痛、偏头痛、紧张性头痛、三叉神经痛的药物治疗(对症治疗),反复性偏头痛者

A：乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林等

B：服用麦角胺咖啡因片、罗通定片、天麻素、苯噻啶、舒马曲坦、佐米曲坦

C：推荐应用地西泮(安定)片

D: 一般可首选对乙酰氨基酚，推荐合并应用谷维素、维生素B1

答案：B

28.30g/L≤Hb量＜60g/L可诊断为

A: 重度贫血

B: 基本正常

C: 轻度贫血

D: 中度贫血

答案：A

29.饮酒过多也可能致命，导致儿童丧生的纯乙醇致死量是（）

A: 20ml

B: 10ml

C: 25ml

D: 15ml

答案：C

30.药师应告知医师“血药浓度监测是安全实施该治疗的重要措施”的事例是

A: 利巴韦林可致畸与肿瘤

B: 替加色罗存在心绞痛风险

C: 地高辛用于肾功不全患者

D: 阿昔洛韦可致急性肾衰竭

答案：C

31.能减轻眼部平滑肌及血管痉挛,改善局部微循环,缓解视疲劳的药物是（）

A: 硫酸锌滴眼液

B：聚乙烯醇滴眼

C：可的松滴眼液

D：山莨菪碱滴眼液

答案：D

32.“制定疾病的防治指南、国家基本药物目录、非处方药目录、医疗保险目录等以及药品淘汰时都需要参考循证医学的研究结果”表明循证医学实践能够

A：有助于个体化给药

B：有利于诊断特殊疾患

C：列为医药卫生行政决策的依据

D：改变降脂治疗观念

答案：C

33.可导致性功能减退、皮疹、乳腺增大的药物是

A：坦索罗辛

B：非那雄胺

C：多沙唑嗪

D：奥昔布宁

答案：B

34.可引起局部组织萎缩

A：氯己定

B：硼酸甘油

C：地塞米松粘贴片

D：甲硝唑含漱制剂

答案：C

35.服用两咪替丁等H2受体阻断剂、地西泮等苯二氮䓬类药物应该禁用的是

A：酒

B：食醋

C：烟

D：浓茶

答案：C

36.收缩血管平滑肌，引起高血压的药物是

A：伪麻黄碱

B：糖皮质激素

C：重组人促红细胞生成素

D：咖啡因

答案：A

37.（2016年真题）从事驾车、高空作业的患者不宜服用的药物是（）。

A：对乙酰氨基酚

B：布洛芬

C：伪麻黄碱

D：氯苯那敏

答案：D

38.患者，男，50岁，主诉咳嗽，症状持续8天，现在每次咳嗽都伴有黄痰，由于咳嗽感到疲劳和睡眠困难，近期未患其他疾病。患者14岁的儿子最近患轻度感冒，无恶心、呕吐、发热及畏寒。既往史：服用赖诺普利控制高血压、服用阿托伐他汀治疗高脂血症、服用小剂量阿司匹林预防脑卒中。查体：体温37．1℃、心率70次／分、血压130／70mmHg、呼吸18次／分，动脉血氧饱和度为98％，肺部可闻及喘鸣音。

A: 桉柠蒎肠溶软胶囊300mg／次qd

B: 阿奇霉素片500mgqd

C: 右美沙芬片30mgtid

D: 氨溴索片30mg／次tid

答案：D

39.并不存在风险，目前不需采取措施；评判为

A: 验证

B: 驳倒

C: 确认

D: 待验证

答案：B

40.饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物的药动学的机制是

A: 抑制CYP3A4

B: 抑制CYP2C9

C: 诱导CYP3A4

D: 抑制CYPIA2

答案：A

41.赵某，男性，60岁，既往高血压病史8年。与邻居吵架后突然起病，言语不清、左侧肢体无力、意识不清。查体：BP210／120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激阳性，左侧肢体无法活动，左侧巴宾斯基征阳性。

A: 尼莫地平

B: 硝普钠

C: 甘油果糖

D: 呋塞米

答案：C

42.苯二氮类药物过量或者中毒，特异性解救药物是

A: 氟马西尼

B: 氟奋乃静

C: 碘解磷定

D: 新斯的明

答案：A

43.用于治疗苯二氮革类药物中毒的特殊解毒剂是查看材料

A: 纳洛酮

B: 乙酰胺

C: 青霉胺

D: 氟马西尼

答案：D

44.原发性蛛网膜下腔出血常见病因为

A: 动脉炎

B: 高血压性动脉硬化

C: 颅内动脉瘤

D: 脑血管畸形

答案：C

45.选择性地作用于骨性关节、有直接抗炎作用的处方药是

A: 塞来昔布

B: 硫酸氨基葡萄糖

C: 可待因

D: 阿司匹林

答案：B

46.在"应用软膏剂和乳膏剂的注意事项"中，不正确的是

A: 不宜涂敷于口腔、眼结膜

B: 涂敷后封包以增加药物的吸收、提高疗效

C: 一般不要涂敷破损、溃烂、渗出的部位

D: 涂敷前将皮肤清洗干净

答案：B

47.药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑ADR时，需要进行因果关系评价患者，男，32岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒，立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再服用阿莫西林。该ADR的因果关系评价结果是

A: 肯定

B: 很可能

C: 可能无关

D: 可能

答案：B

48.痛风时尿沉渣结晶为（）

A: 酪氨酸?

B: 磷酸盐结晶?

C: 尿酸盐结晶?

D: 草酸盐结晶?

答案：C

49.抑制细胞色素氧化酶损害中枢神经系统的是

A: 氯化钠

B: 氯化锌

C: 磷化氢

D: 磷化锌

答案：C

50.不属于处方前记内容的是()。

A: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量

B: 门诊或住院病历号、日期

C: 医疗、预防、保健机构名称

D: 患者姓名、性别、年龄

答案：A

51.患者，男，50岁，主诉咳嗽，症状持续8天，现在每次咳嗽都伴有黄痰，由于咳嗽感到疲劳和睡眠困难，近期未患其他疾病。患者14岁的儿子最近患轻度感冒，无恶心、呕吐、发热及畏寒。既往史：服用赖诺普利控制高血压、服用阿托伐他汀治疗高脂血症、服用小剂量阿司匹林预防脑卒中。查体：体温37．1℃、心率70次／分、血压130／70mmHg、呼吸18次／分，动脉血氧饱和度为98%，肺部可闻及喘鸣音。

A: 喷托维林

B: 右美沙芬

C: 阿莫西林

D: 沙丁胺醇

答案：B

52.有关血红蛋白的叙述正确的是

A: 血红蛋白常被称为"血色素"，是组成血液的主要成分

B: 缺铁性贫血时红细胞计数的减少程度较血红蛋白的减少程度明显

C: 血红蛋白减少是诊断贫血的重要指标，并能确定贫血的类型

D: 血红蛋白承担着机体向器官组织运输氧气和运出二氧化碳的功能

答案：D

53.可消除便秘，避免腹腔感染和腹膜透析液引流不畅的药物是

A: 对乙酰氨基酚

B: 阿法骨化醇

C: 铁剂

D: 乳果糖

答案：D

54.Ⅱ期临床试验很难发现“低于1%发生频率”的不良反应，缘于

A: 管理漏洞

B: 观察时间短

C: 考察不全面

D: 病例数目少

答案：D

55.治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

A: 维生素B6

B: 雷尼替丁

C: 昂丹司琼

D: 奥美拉唑

答案：C

56.使用前应用原药进行皮试的药物是

A: 阿奇霉素片

B: 阿莫西林胶囊

C: 左氧氟沙星片

D: 注射用头孢曲松钠

答案：D

57.维生素类适宜

A: 餐后服用

B: 餐前服用

C: 清晨服用

D: 餐中服用

答案：A

58.可了解工作效果、并为之后工作的进一步完善的是

A: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

B: 对问题进行确定并归类

C: 形成答案并以口头形式提供给询问者

D: 随访了解效果，并建立档案

答案：D

59.与左旋多巴合用，可提高疗效的是()

A: 奥美拉唑

B: 苄丝肼

C: 克拉维酸钾

D: 叶酸

答案：B

60.弱酸性药物离子化减少

A：肾小管重吸收增加

B：肾血流量减少

C：肾小球滤过减少

D：肾小管分泌减少

答案：A

61.（2017年真题）慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是（）

A：吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药

B：吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂

C：抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素

D：长效β2受体激动剂+吸入型糖皮质激素

答案：C

62.解热且具有抑制血小板凝集作用、可能增加出血危险的是

A：阿司匹林

B：吲哚美辛

C：布洛芬

D：贝诺酯

答案：A

63.（2016年真题）患者，男，60岁，呈典型的“面具脸”，“慌张步态”及“小字症”表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病的药物是（）。

A：普拉克索

B：司来吉兰

C：多奈哌齐

D：左旋多巴

答案：D

64.患者,女,46岁,因琐事吵架后,服用艾司唑仑100片,可选用的解救药物是()

A: 二巯丙醇

B: 亚甲蓝

C: 纳洛酮

D: 氟马西尼

答案：D

65.与联用药物竞争结合血浆蛋白的是

A: 西沙必利

B: 丙磺舒

C: 阿司匹林

D: 丙胺太林

答案：C

66.（2019年真题）患者，男，9岁，入院诊断为急性淋巴细胞白血病，临床计划鞘内注射药物预防中枢白血病，宜选用的药物是

A: 长春新碱

B: 亚叶酸

C: 维生素B

D: 甲氨蝶呤

答案：D

67.（2017年真题）患者，男，57岁,因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊，经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为H1N1甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是（）

A: 奥司他韦
B: 金刚乙胺
C: 利巴韦林
D: 金刚烷胺
答案：A

68.阿卡波糖可能导致的不良反应是
A: 肌痛、关节痛和高血压
B: 腹胀、肠鸣音亢进
C: 消化道反应、过敏和白细胞减少
D: 心力衰竭和水肿
答案：B

69.患者,女,72岁,有青霉素过敏史。主诉尿痛、尿频,尿常规检查示大量白细胞,尿细菌数105cfu/m,诊断为急性膀胱炎。应选用的药物是
A: 阿奇霉素片
B: 阿莫西林胶囊
C: 莫西沙星片
D: 复方磺胺甲噁唑片
答案：D

70.归属于用药评价的是
A: 主治医师签名
B: 主要实验室检查数据
C: 对药物治疗的建设性意见
D: 同时合并应用的药品
答案：C

71.（2015年真题）治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药是（）。

A: 雷尼替丁

B: 奥美拉唑

C: 昂丹司琼

D: 维生素B6

答案：C

72.脑出血

A: 2～3周

B: 4～5周

C: 1～2周

D: 2～4周

答案：D

73.含右美沙芬制剂的禁用人群是

A: 银屑病患者

B: 青光眼患者

C: 呼吸衰竭患者

D: 孕妇

答案：D

74.热程持续4周以上，体温持续在37.5-38℃间波动，其属于

A: 中低等度热

B: 不明原因发热

C: 长期低热

D: 超高热

答案：C

75.使用年龄折算法，体重折算法，体表面积折算法等计算，是指

A：严格掌握用药剂量

B：密切监护

C：明确诊断

D：严格掌握适应证

答案：A

76.(消化性溃疡并发症)，幽门梗阻

A：突发上腹剧痛，继而至全腹

B：疼痛性质改变，明显消瘦、贫血

C：规律性上腹痛

D：餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物

答案：D

77.有明确的风险，有必要采取措施以降低风险；评判为

A：驳倒

B：确认

C：待验证

D：验证

答案：B

78.禁与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括（）

A：选择性5-羟色胺再摄取抑制剂

B：苯二氮类药物

C：5-HT1A受体部分激动剂

D：三环类药物

答案：B

79.（2016年真题）对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是（）。

A: 地西泮

B: 米氮平

C: 佐匹克隆

D: 雷美尔通

答案：B

80.脑梗死的分期恢复期

A: 1~6个月

B: 1～3个月

C: 1个月内

D: 2周

答案：A

81.用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

A: 利巴韦林可致畸与肿瘤

B: 阿昔洛韦可致急性肾衰竭

C: 地高辛用于肾功不全患者

D: 替加色罗存在心绞痛风险

答案：C

82.患者，男，26岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温37.8℃，脉搏72次/分，白细胞计数3.7×109/L。医生为患者开具的处方如下：

A: 对乙酰氨基酚

B: 氯苯那敏

C: 右美沙芬

D: 伪麻黄碱

答案：A

83.受精后半个月以内

A: 几乎见不到药物的致畸作用

B: 可产生形态或功能的异常而造成畸形

C: 女性生殖系统发育迟缓

D: 中枢神经系统发育迟缓

答案：A

84.患者，女，27岁，确诊慢性乙型肝炎3年。近日化验结果：HBV-DNA2×105copies/ml，ALT122U/L。拟予以抗病毒治疗，首选的药物是

A: 利巴韦林

B: 泛昔洛韦

C: 阿糖腺苷

D: 恩替卡韦

答案：D

85.美国食品药品监督管理局(FDA)根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为A、B、C、D、X五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标

明等级。A～X级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

A: 红霉素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/818141023042007022