2024湖南省江永县《执业药师之西药学专业二》资格考试题库带答案（培优A卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.属于可供静脉注射的胰岛素/胰岛素类似物的是

A：地特胰岛素

B：普通胰岛素

C：预混胰岛素

D：精蛋白锌胰岛素

答案：B

2.利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

A：螺内酯

B：氢氯噻嗪

C：乙酰唑胺

D：呋塞米

答案：C

3.可引起下肢水肿的抗高血压药物是

A：洛伐他汀

B：硝酸甘油

C：硝苯地平

D：普萘洛尔

答案：C

4.关于法莫替丁用药注意事项的说法,错误的是

A：肾功能不全患者需要减少给药剂量或延长给药间隔

B：抑制肝脏细胞色素P450酶的活性，从而影响茶碱、华法林、地西泮等药物的代谢

C：以原形从肾脏排泄，肾功能不全患者易造成药物在体内蓄积

D：与西咪替丁相比，对性激素的影响较轻

答案：B

5.患者，男性，46岁，经常头痛，头晕近8年。2天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压230／120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为202／120mmHg，且气急不能平卧，心率108次／分，早搏3次／分。两肺底有湿啰音。

A：利多卡因静脉滴注

B：普罗帕酮静脉注射

C：硝普钠静脉滴注

D：毛花苷丙静脉注射

答案：C

6.长期大量服用维生素A会出现

A：视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

B：视物模糊、疲乏、乳腺肿大

C：疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

D：低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

答案：C

7.（2016年真题）属于α1受体阻断剂的抗良性前列腺增生症的药品是

A：特拉唑嗪

B：酚妥拉明

C：普适秦

D：度他雄胺

答案：A

8.有关阿莫西林特点的说法正确的是()

A：广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效

B：对耐药金黄色葡萄球菌有效

C：口服吸收差，生物利用度小

D：耐酸、耐酶

答案：A

9.直接影响DNA结构和功能的药物是()

A：氟尿嘧啶

B：多柔比星

C：高三尖杉酯碱

D：顺铂

答案：D

10.下列属于β受体阻断剂的是

A：美托洛尔

B：螺内酯

C：阿利吉仑

D：卡托普利

答案：A

11.容易引起视神经炎的抗结核药物是

A: 异烟肼
B: 乙胺丁醇
C: 链霉素
D: 利福平
答案：B

12.属于单胺氧化酶抑制药的是
A: 溴隐亭
B: 司来吉兰
C: 金刚烷胺
D: 石杉碱甲
答案：B

13.硝酸甘油的药理作用不包括
A: 减少回心血量
B: 增加心率
C: 扩张容量血管
D: 增加心室壁张力
答案：D

14.多柔比星
A: 影响蛋白质合成和功能
B: 干扰核酸生物合成
C: 干扰 RNA 转录
D: 直接破坏 DNA 结构和功能
答案：C

15.对阴道滴虫有很好疗效的是

A：链霉素

B：青蒿素

C：二氯沙奈

D：甲硝唑

答案：D

16.（2021年真题）可致男性胎儿外生殖器发育畸形，妊娠期或备孕期妇女不宜接触其破碎制剂的药物是（）

A：非那雄胺

B：多沙唑嗪

C：赛洛多辛

D：特拉唑嗪

答案：A

17.可用于防治泌尿系统结石的是

A：枸橼酸钾

B：氯化钾

C：氯化钠

D：氯化钙

答案：A

18.可单独用于轻度、早期高血压的是

A：阿米洛利

B：乙酰唑胺

C：氢氯噻嗪

D：呋塞米

答案：C

19.通过阻断血管紧张素Ⅱ受体而逆转心肌肥厚，减轻心力衰竭的药物是

A: 美托洛尔

B: 地高辛

C: 氯沙坦

D: 氨力农

答案：C

20.下列哪项是避免奥沙利铂的剂量依赖性神经系统毒性，避免出现咽喉痉挛等严重后果的措施

A: 禁止接触塑料制品

B: 用生理盐水做溶剂

C: 禁食冷饮冷水、接触凉物

D: 禁食热饮热水

答案：C

21.育龄女性在无防护的性生活或避孕失败72小时内,宜使用的口服紧急避孕药物是（）

A: 复方醋酸环丙孕酮（35μg/2mg）

B: 十一酸睾酮（40mg）

C: 左炔诺孕酮（1

D: 炔雌醇去氧孕烯（30g/150g）

答案：C

22.作用于 γ-氨基丁酸受体的药物是

A: 卡马西平

B: 佐匹克隆

C: 苯妥英钠

D: 苯巴比妥

答案：B

23.与卡比马唑合用应谨慎的是

A: 放射性碘

B: 糖皮质激素

C: 丙硫氧嘧啶

D: 甲状腺素

答案：A

24.哌唑嗪常见的不良反应是

A: 口干、便秘、发热

B: 降压效应减弱

C: 钠水潴留

D: 首剂量低血压反应

答案：D

25.属于阴道局部用药的是

A: 聚甲酚磺醛

B: 阿霉素

C: 环磷酰胺

D: 地屈孕酮

答案：A

26.患者，男，63岁，2型糖尿病病史20年，现服用二甲双胍0．5g，一日3次；阿卡波糖0．1g，一日3次；吡格列酮30mg，一日1次。既往高血压病史5年，冠心病病史5年，心功能Ⅰ级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

A: 高尿酸血症

B: 高钠血症

C: 高钾血症

D: 高镁血症

答案：A

27.维A酸类药物不能用于下述哪种疾病()

A: 光敏性皮肤病

B: 银屑病

C: 角化性皮肤病

D: 扁平疣

答案：A

28.阿托品2mg时，表现出的中毒症状为()

A: 语言不清、烦躁不安、皮肤干燥发热

B: 心悸、显著的口干、瞳孔扩大，有时出现视物模糊

C: 轻微的心率减慢，略有口干及少汗

D: 口干、心率加快、瞳孔轻度散大

答案：B

29.属于平衡型氨基酸制剂的是

A: 赖氨酸注射液

B: 复方氨基酸注射液（18AA）

C: 复方氨基酸注射液（9AA）

D: 复方氨基酸注射液（6AA）

答案：B

30.使用呋塞米时，较少发生耳毒性的情况是

A：快速静脉输注给药

B：口服方式给药

C：频繁静脉输注给药

D：同时使用氨基糖苷类药物

答案：B

31.伐昔洛韦口服后在肝脏水解为

A：喷昔洛韦

B：西多福韦

C：阿昔洛韦

D：更昔洛韦

答案：C

32.下述关于留钾利尿药作用特点的描述，正确的是()

A：对肝硬化者无效

B：具有抑制心肌纤维化的功能

C：利尿作用强，药效持久

D：其利尿作用与体内的醛固酮浓度无关

答案：B

33.抑制骨髓造血功能的是

A：氯霉素

B：四环素

C：庆大霉素

D：红霉素

答案：A

34.干扰核酸生物合成的药物是()

A: 顺铂
B: 高三尖杉酯碱
C: 氟尿嘧啶
D: 多柔比星
答案：C

35.阿司匹林的主要适应证不包括()
A: 预防血栓形成
B: 胃溃疡
C: 不稳定型心绞痛
D: 急性心肌梗死
答案：B

36.可用于对乙酰氨基酚中毒解救，颗粒剂还能加入果汁中服用的祛痰药物是
A: 乙酰半胱氨酸
B: 羧甲司坦
C: 溴己新
D: 氨溴索
答案：A

37.服用后易出现呃逆、腹胀和暖气,甚至引起反跳性胃酸分泌增加的药物是（）
A: 胶体果胶铋
B: 替普瑞酮
C: 复方碳酸钙
D: 奥美拉唑
答案：C

38.有关阿托品的叙述，错误的是

A：存在潜在性青光眼时，使用阿托品有诱发危险

B：妊娠期静脉滴注阿托品可使胎儿心动过速

C：婴幼儿对其毒性不敏感

D：与促胃肠动力药合用时应有间隔时间

答案：C

39.服用华法林过量可用下列哪种药物对抗

A：糜蛋白酶

B：维生素K

C：维生素A

D：鱼精蛋白

答案：B

40.患者，男，55岁，诊断为良性前列腺增生症，服用非那雄胺片治疗，最有可能发生的与用药相关的不良反应是

A：体位性低血压

B：性欲减退

C：心悸

D：脱发

答案：B

41.（2020年真题）患者，女，45岁。诊断为高血压合并甲状腺功能亢进，心率过快，宜选用的抗高血压药是

A：普萘洛尔

B：吲达帕胺

C：氨氯地平

D: 赖诺普利

答案：A

42.属于工类抗心律失常药且能引起金鸡纳反应的是()

A: 胺碘酮

B: 奎尼丁

C: 普萘洛尔

D: 利多卡因

答案：B

43.伴有（）的患者在应用ACEI首剂治疗时可能出现严重低血压

A: 脑水肿

B: 干咳

C: 低钠血症

D: 蛋白尿

答案：C

44.属于广谱抗心律失常药物的是()

A: 地高辛

B: 胺碘酮

C: 苯妥英钠

D: 利多卡因

答案：B

45.属于ⅠB类抗心律失常药

A: 奎尼丁

B: 普萘洛尔

C: 利多卡因

D: 胺碘酮

答案：C

46.容积性泻药()

A: 硫酸镁

B: 地芬诺酯

C: 乳果糖

D: 甘油

答案：A

47.（2017年真题）属于抗雌激素的肿瘤药是（）

A: 阿那曲唑

B: 氟他胺

C: 炔雌醇

D: 他莫昔芬

答案：D

48.异烟肼联用氢氧化铝使

A: 肝毒性增加

B: 月经不规则

C: 疗效减弱

D: 吸收减少

答案：D

49.仅降低发热者体温，不降低正常体温，用于感冒发热的药物是

A: 阿司匹林

B: 氯丙嗪

C: 硫喷妥钠

D: 地西泮

答案：A

50.新生儿出血宜选用

A: 肝素

B: 香豆素类

C: 维生素K1

D: 维生素B12

答案：C

51.属于CYP2C9的诱导剂，可以减少氟伐他汀的生物利用度50%的是

A: 利福平

B: 地高辛

C: 烟酸

D: 红霉素

答案：A

52.需要内因子辅助吸收的维生素是

A: 维生素B6

B: 维生素B12

C: 叶酸

D: 烟酸

答案：B

53.青霉素类用药后发生过敏性休克，属于

A: Ⅰ型变态反应

B: Ⅲ型变态反应

C: Ⅳ型变态反应

D: Ⅱ型变态反应

答案：A

54.宜选用塞来昔布治疗的疾病是

A: 骨关节炎

B: 胃溃疡

C: 痛风

D: 肾绞痛

答案：A

55.对铜绿假单胞菌无效的氟喹诺酮类药是

A: 磺胺嘧啶

B: 氧氟沙星

C: 甲氧苄啶

D: 呋喃唑酮

答案：B

56.烟酸缺乏时发生

A: 成人佝偻病

B: 糙皮病

C: 夜盲症

D: 脚气病

答案：B

57.（2015年真题）患者，男，56岁。有高血压病史4年。体检：血压156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者若长期服用依那普利片，除应监测血压、心、肾功能外。还应监测的指标是（）。

A: 血钙
B: 血钾
C: 血氯
D: 血钠
答案：B

58.糖皮质激素禁用于低血钾患者是因为
A: 抑制蛋白质合成
B: 促进胃酸分泌
C: 抑制免疫功能只抗炎不抗菌
D: 水钠潴留
答案：D

59.属于非麻醉性镇痛药的是
A: 布洛芬
B: 吗啡
C: 美沙酮
D: 可待因
答案：A

60.常在用药1周后出现刺激性干咳的药物是
A: 氨氯地平
B: 哌唑嗪
C: 地高辛
D: 卡托普利
答案：D

61.可减弱吲达帕胺降压作用的是

A：多巴胺

B：考来烯胺

C：拟交感药

D：胺碘酮

答案：C

62.下述药物可引起药物性鼻炎的是

A：硼酸甘油滴耳液

B：酚甘油滴耳液

C：过氧化氢溶液

D：麻黄碱

答案：D

63.老年人对苯二氮（艹卓）类药较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟缓等症状，在临床上称为

A：戒断综合征

B：震颤麻痹综合征

C：“宿醉”现象

D：老年期痴呆

答案：C

64.能使凝血因子Ⅰ降解为纤维蛋白单体的药物是()

A：鱼精蛋白

B：甲萘氢醌

C：蛇毒血凝酶

D：卡巴克络

答案：C

65.哺乳期妇女应用沙丁胺醇时，早产儿会出现

A：头痛

B：暂时性低血糖

C：支气管痉挛

D：耐药性

答案：B

66.典型不良反应除消化道反应，还有耳毒性和肾毒性的药物是

A：多柔比星

B：环磷酰胺

C：顺铂

D：长春碱类

答案：C

67.碳青霉烯类药可使下列哪种抗癫痫药血浆药物浓度降低

A：卡马西平

B：丙戊酸钠

C：拉莫三嗪

D：苯巴比妥

答案：B

68.与胆汁酸结合而降血脂的药物是

A：洛伐他汀

B：氯贝丁酯

C：考来烯胺

D：烟酸

答案：C

69.异甘草酸镁作为保护肝细胞药的作用机制是

A：作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用

B：通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

C：促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞

D：降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平

答案：B

70.抢救糖尿病酮症酸中毒和高血糖高渗性昏迷患者宜选用

A：普通胰岛素

B：格列喹酮

C：二甲双胍

D：低精蛋白锌胰岛素

答案：A

71.有耳毒性的药物是

A：氢氯噻嗪

B：螺内酯

C：乙酰唑胺

D：呋塞米

答案：D

72.以上属于阿片类药物严重戒断症状的是

A：胃痉挛、心动过速、极度疲乏

B：惊厥、震颤、反射加速、发热

C：哈欠、打喷嚏、流涕、出汗

D：神经过敏、失眠、恶心、呕吐

答案：A

73.不易引起严重乳酸血症的双胍类药物是

A：甲苯磺丁脲

B：苯乙双胍

C：阿卡波糖

D：二甲双胍

答案：D

74.属于第四代头孢菌素的药物是()

A：头孢哌酮

B：头孢噻吩

C：头孢噻肟

D：头孢吡肟

答案：D

75.属于促分泌药，通过刺激肠液分泌，促进排便的药物是()

A：多库酯钠

B：欧车前

C：利那洛肽

D：番泻叶

答案：C

76.袢利尿药发挥利尿的作用点是

A：Na^+-Cl^-共转运子

B：磷酸二酯酶

C：Na^+-K^+-$2Cl^-$同向转运子

D：碳酸酐酶

答案：C

77.可引起复视或视觉蓝绿模糊的是()

A：他达拉非

B：坦洛新

C：西地那非

D：度他雄胺

答案：C

78.磺酰脲类药物的不良反应不包括

A：肝炎

B：诱发甲亢

C：粒细胞减少

D：口中金属味

答案：B

79.患者，男，60岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

A：超过常规服药时间的12小时后漏服，应在下次常规服药时间服用加倍剂量

B：在常规服药时间的12小时内漏服，应立即补服一次标准剂量，并按照常规服药时间服用下一次剂量

C：单次负荷量300mg开始，然后以75mg，每日1次连续服药

D：发现氯吡格雷抗血小板作用不足者可进行代谢酶基因型检测

答案：A

80.地高辛的主要适应证不包括

A：慢性室性心律失常

B: 室上性心动过速

C: 急性心力衰竭

D: 慢性心力衰竭

答案：A

81.高钠血症是指

A: 血钠＞145mmol/L

B: 血钠＞135mmol/L

C: 血钠＞130mmol/L

D: 血钠＞140mmol/L

答案：A

82.甲氧苄啶联用环孢素使

A: 肾毒性增加

B: 抗凝作用增强

C: 白细胞减少风险增加

D: 半衰期缩短

答案：A

83.下列哪类药物属于繁殖期杀菌药()

A: 青霉素类

B: 磺胺类

C: 氯霉素类

D: 多黏菌素 B

答案：A

84.可抑制血小板聚集和释放的药物是

A: 华法林

B：肝素

C：尿激酶

D：噻氯匹啶

答案：D

85.可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

A：氢氯噻嗪

B：氨苯蝶啶

C：托拉塞米

D：乙酰唑胺

答案：C

86.2岁以下儿童用药可能会发生致死性肝损害,临床用药需要重点关注的抗癫痫药是()

A：苯巴比妥

B：氯硝西泮

C：丙戊酸钠

D：苯妥英钠

答案：C

87.不得与碱性物质或铁器接触的是

A：苯甲酸苄酯

B：阿达帕林

C：克罗米通

D：林旦霜

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/825203034114012033