

(新) 急救相关知识考试题库

第一部分 单选题(200 题)

- 1、在使用球囊-面罩通气时，可尽量减少空气进入患者胃内的做法是 0
- A、增加通气频率，减少通气量
 - B、减少每分钟通气次数
 - C、尽可能延长每次通气时间
 - D、用尽全力给予最大量的通气
 - E、通气量能使患者胸廓明显隆起即可

【答案】： E

- 2、急性敌百虫中毒禁用 0 溶液洗胃。 0
- A、清水、生理盐水
 - B、1:5000 高锰酸钾溶液
 - C、2%重曹溶液
 - D、牛奶、蛋清水
 - E、活性炭

【答案】： C

- 3、慢性特发性血小板减少性紫癜最常见于 0
- A、婴幼儿
 - B、青少年
 - C、青年女性
 - D、青年男性
 - E、中年人

【答案】： C

4、发生空气栓塞时应使病人采取 0

- A、左侧卧位和头低足高位
- B、端坐位双腿下垂
- C、右侧卧位和头低足高位
- D、右侧卧位和头高足低位
- E、左侧卧位和头高足低位

【答案】： A

5、抢救时胸外心脏按压有效的标志是 0

- A、颈动脉搏动
- B、股动脉搏动
- C、肱动脉搏动
- D、颈、股动脉搏动
- E、颈、肱动脉搏动

【答案】： D

6、心脏骤停首选的治疗措施是 0

- A、心肺复苏
- B、安置起搏器
- C、开通静脉输液
- D、通畅呼吸道
- E、高浓度吸氧

【答案】： A

7、电动吸引器吸痰每次插入导管吸引不超过 0

- A、5s
- B、10s
- C、15s
- D、20s
- E、25s

【答案】： C

8、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为 0

- A、仰头举颏法
- B、双手推举下颌法
- C、托颊法
- D、环状软骨压迫法
- E、托颈法

【答案】： A

9、斜正重症酸中毒时，根据二氧化碳结合力和 FH 值应给予 0

- A、甘露醇
- B、碳酸氢钠
- C、葡萄糖
- D、氯化钠
- E、转化糖

【答案】： B

10、2015 心肺复苏指南继续强调将 0 的重要意义。

- A、迅速开放呼吸道；
- B、迅速判断意识
- C、有效的人工通气；
- D、有效不间断胸外按压
- E、除颤

【答案】： D

11、左下 LL 导连位于哪个位置?0

- A、左锁骨中线与脐水平交汇处
- B、左锁骨中线剑突水平处
- C、胸骨左缘第四肋间
- D、胸骨左缘锁骨中线第一肋间

【答案】： B

12、急救婴儿现场判断意识的方法为 0

- A、呼唤婴儿

B、拍打肩部

C、指压人中

D、摇晃头部

【答案】： C

13、高钾时心电图的变化正确的是 0

- A、S-T 段下降
- B、T 波高尖，PR 间期延长
- C、出现 U 波
- D、QRS 间 缩 短 ，QT 时间延长
- E、T 波宽而低平，重者 T 波倒置

【答案】： B

14、下列不属于院前急救原则的是 0

- A、先施救后排险
- B、先重伤后轻伤
- C、先固定后搬运
- D、急救与呼救并重

【答案】： A

15、患者，女性，35 岁。因头部外伤报诊为”脑挫裂伤”急诊入院。接诊时发现， 患者神志不清，口鼻腔出血且分泌物多，口唇发绀，呼吸困难。该患者目前最确切的首要护理诊断是 0

- A、有窒息的危险
- B、气体交换受损
- C、有受伤的危险
- D、有感染的危险
- E、有脑疝的危险

【答案】： A

16、患者男性，45 岁。护士为其测得的血压值为 145\95mmHg,该患者的血压属于

0

- A、理想血压
- B、正常血压
- C、临界高血压
- D、高血压
- E、单纯收缩期高血压

【答案】： D

17、急性肠梗阻易导致 0

- A、高血钙
- B、低血钙
- C、高血钾
- D、低血钾
- E、高渗性脱水

【答案】： D

18、患者，男性，52 岁。因车祸致胸腹联合伤，左侧多发性肋骨骨折(连枷)伴大量 血气胸；脾破裂伴腹腔内出血。神志清， BP75/46mmHg R38 次/分，心率 126 次/分，

律齐，医护人员到达现场后首先要对患者进行哪一项伤情评估 0

- A、意识状态
- B、气道和呼吸情况
- C、进行化验检查
- D、 循环情况
- E、仔细的胸部检查

【答案】： B

19、心脏骤停后，进行胸外心脏按压时，急救药物 0.1%肾上腺素的给药途径首选

0

- A、心内注射
- B、气管内注射
- C、静脉注射
- D、皮下注射
- E、肌肉注射

【答案】： C

20、腹部检查下列哪项错误 0

- A、振水音见于幽门梗阻
- B、肋下扪及肝脏提示肝大
- C、脾脏正常时不能扪及
- D、肠鸣音消失可见于肠麻痹
- E、腹主动脉搏动正常人可触到

【答案】： B

21、以下均属于致命性心律失常，除外的是 0

- A、心室扑动
- B、室性心动过速
- C、心室颤动
- D、心房颤动
- E、心室率小于 45 次/分的心动过缓

【答案】： D

22、严重创伤性休克后，首先应预防的是 0

- A、感染
- B、输血并发症
- C、急性心力衰竭
- D、肠麻痹
- E、急性呼吸窘迫综合征

【答案】： A

23、现场心肺复苏操作首要步骤是 0

- A、心前区叩击
- B、心脏按压
- C、口对口人工呼吸
- D、按额托项，保持呼吸道通畅
- E、心内注射

【答案】： D

24、以上哪种情况应禁忌洗胃 0

- A、急性有机磷农药中毒
- B、急性安定中毒
- C、飘药中毒
- D、强酸、强碱中毒
- E、食物中毒

【答案】： D

25、医护人员到达现场，可用哪几种颜色对伤员进行分类 0

- A、白、黄、绿、黑
- B、红、黄、绿、黑
- C、红、黄、蓝、黑
- D、红、白、绿、黑

【答案】： B

26、热痉挛时最易发生痉挛的肌肉是 0

- A、腹直肌
- B、胸大肌
- C、肱二头肌
- D、腓肠肌

【答案】： D

27、属于骨折早期并发症的是 0

- A、血管神经损伤
- B、关节僵硬
- C、创伤性关节炎
- D、缺血性肌挛缩
- E、延迟愈合

【答案】： A

28、膀胱刺激征是指 0

- A、尿失禁、尿多
- B、排尿困难、尿滴沥
- C、尿痛、尿急
- D、夜尿增多、尿频
- E、尿频、尿急、尿痛

【答案】： E

29、患者，女性，58岁，慢性支气管炎病史10年，慢阻肺病史5年。护士在夜间查房时发现患者剧烈咳嗽后突感上胸刺痛、胸闷、呼吸困难，不能平卧，查体：左侧胸廓膨隆、呼吸运动减弱、叩诊呈鼓音，听诊左肺呼吸音明显减弱，应考虑为 0

- A、肺梗死
- B、急性心肌梗塞
- C、自发性气胸
- D、支气管哮喘
- E、胸腔积液

【答案】： C

30、抢救口服有机磷农药中毒病人洗胃时最常用的洗胃液是 0

- A、0.9%氯化钠注射液、温开水
- B、热开水
- C、2%碳酸氢钠
- D、1:5000 高锰酸钾溶液
- E、5%葡萄糖注射液

【答案】： A

31、急性有机磷农药中毒机制是 0

- A、抑制酶活性
- B、缺氧
- C、局部腐蚀刺激作用
- D、竞争受体

E、麻醉作用

【答案】： A

32、用于动脉出血的止血方法为 0

- A、加加压包扎止血法
- B、指压止血法
- C、屈肢加垫止血法
- D、填塞止血法

【答案】： B

33、灭火器至少多长时间进行一次全面检查和保养 0

- A、一个月
- B、一个季度
- C、半年
- D、一 年

【答案】： A

34、患者，男性，55 岁。参加 2 小时会议后，到洗手间返回会议室途中突然晕倒，

意识不清。如果有 3 人在现场，其最佳分工是)

- A、1 人拨打“120”电话，第 2 人按压人中，第 3 人高声呼喊患者
- B、1 人判断患者心搏骤停，第 2 人拨打“120”电话，第 3 人立即进行胸外按压
- C、1 人拨打“120”电话，第 2 人判断患者意识，第 3 人置患者于舒适体位
- D、1 人拨打“120”电话，第 2 人判断患者意识，第 3 人给患者人工呼吸
- E、1 人呼喊患者、判断呼吸和脉搏，第 2 人拨打“120”电话，第 3 人呼救

【答案】： B

35、火灾急救处理“三防”是指 0

- A、防休克、防中毒、防窒息
- B、防窒息、防跳楼、防奔跑
- C、防休克、防感染、防中毒
- D、防休克、防窒息、防感染

【答案】： D

36、中心负压故障时，立即停用中心吸引装置，启用备用电动吸痰器进行吸引，必

要时采用 0 与吸痰管连接吸痰

- A、吸痰管
- B、50ml 注射器
- C、甘油注射器
- D、听诊器

【答案】： B

37、患者，男性，70 岁，突发急性广泛心肌梗死，经治疗疼痛有所好转，继而出现

呼吸困难、咳嗽、发绀、咳大量粉红色泡沫痰，其咳嗽病因是 0

- A、急性肺淤血
- B、急性肺不张
- C、急性肺水肿
- D、急性肺炎
- E、急性胸膜炎

【答案】： C

38、下列哪项不是高危药品 0

- A、10%氯化钾
- B、10%葡萄糖酸钙
- C、胰岛素
- D、 肾上腺素

【答案】： B

39、男，12岁，因溺水出现心脏骤停，心电监护示一直线，有双人参与抢救，除如下哪种抢救措施外，其余措施均可采取0

- A、胸外按压
- B、人工呼吸
- C、电除颤
- D、心脏起搏

【答案】： D

40、有关骨折急救处理，下列哪项错误)

- A、首先应止血及包扎伤口
- B、无夹板时，可用树枝、木棍(板)、步枪等作临时固定支架
- C、可将伤员上肢缚于胸壁侧面，下肢两腿绑在一起固定
- D、脊椎骨折患者不可采取手法复位
- E、搬动脊椎骨折患者时，应采取一人抱肩，一人抬腿的方法

【答案】： E

41、抢救溺水病人的第一步是0

- A、倒出呼吸道内及胃内的积水
- B、立即进行口对口人工呼吸
- C、胸外心脏
- D、迅速清除口鼻内泥沙污泥
- E、应用抗生素预防感染

【答案】： D

42、患者，男性，49岁。既往有高血压、脑出血史，现脑出血术后16天出院，突发高热，由家人送至急诊科。患者神志不清，在对患者进行气道及呼吸评估时，患者突然面色青紫。如果你是分诊护士，首先要做的是0

- A、立即将患者送入抢救室
- B、给予人工呼吸
- C、呼叫医生

D、尽快结束初级评估

E、测量血氧饱和度

【答案】： A

43、进行 CPR 的前提条件是 0

- A、无反应、无呼吸
- B、无反应、有呼吸
- C、无意识
- D、无反应

【答案】： A

44、呕吐、头痛、嗜睡、深快呼吸，
呼气可闻烂苹果。患者出现的可能情况是 0

- A、糖尿病酮症酸中毒
- B、呼吸衰竭
- C、颅内压升高
- D、低血糖
- E、脑血管意外

【答案】： A

45、对成人行胸外心脏按压，正确的按压频率为 0

- A、50 次/分
- B、60 次/分
- C、70 次/分
- D、80 次/分
- E、90 次/分

【答案】： B

46、哮喘持续状态是指经一般支气管扩张药治疗后仍有 0

- A、大量黏脓痰
- B、明显发绀
- C、哮喘 24 小时以上
- D、肺不张
- E、浅昏迷

【答案】： G

47、以下影像学检查结果需报告危急值，除外的是 0

- A、 自发性气胸
- B、 外伤性膈疝
- C、 纵隔摆动
- D、 宫外孕破裂大出血
- E、 大量心包积液合并心包填塞

【答案】： A

48、糖尿病昏迷患者使用胰岛素时应注意补充 0

- A、 Na^+
- B、 Cl^-
- C、 Ca^{2+}
- D、 K^+
- E、 Mg^{2+}

【答案】： D

49、口对口人工呼吸的吹气量应达到()

- A、 2400mL 以上
- B、 500mL
- C、 1/3 肺活量
- D、 达到病人肺部
- E、 使病人胸廓抬起

【答案】： E

50、下列哪一项是多发伤的临床特点)

- A、 创伤后全身反应较轻，死亡率不高
- B、 较少发生休克
- C、 低氧血症发生率高
- D、 多发伤等同于多处伤
- E、 不易发生漏诊和误诊

【答案】： C

51、有关脑震荡表现不正确的是 0

- A、逆行性健忘
- B、颅内压增高
- C、血压下降
- D、意识障碍不超过 30 分钟
- E、生理反射迟钝

【答案】： B

52、患者男性，45 岁。炎热夏天在外高空作业 3 小时出现大汗、口渴、头晕、胸闷。该病人可能出现了 0

- A、先兆中暑
- B、轻度中暑
- C、热痉挛
- D、日射病
- E、热射病

【答案】： A

53、急性 CO 中度中毒时，血液 HbCo 浓度为)

- A、10-30%
- B、30-50%
- C、>50%
- D、50-70%
- E、70%以上

【答案】： B

54、无脉性心脏停跳息者两次心跳检查之间应 0

- A、先给预约 5 组(或者约 2 分钟)心肺复苏
- B、行 12 导心电图检查
- C、建立深静脉通道
- D、准备电除颤
- E、持续胸外心脏按压

【答案】： A

55、胸外伤后，出现胸壁软化(连枷胸)的原因是 0

- A、2 根以上肋骨骨折
- B、多根多段肋骨骨折
- C、胸骨骨折
- D、反常呼吸
- E、纵隔摆动

【答案】： B

56、糖尿病酮症酸中毒的表现错误的是 0

- A、酮体生成过多
- B、水肿
- C、治疗前，血钾偏高或正常
- D、携氧功能障碍

【答案】： B

57、休克的临床表现有 0

- A、脉搏细弱
- B、大汗淋漓
- C、口唇发绀
- D、血压下降
- E、以上都是

【答案】： E

58、中度有机磷农药中毒病人的血胆碱酯酶活性为 0

- A、70%~50%

B、50%~30%

C、30%~29%

D、<20%

E、80%~70%

【答案】： B

59、左侧心力衰竭患者的脉象改变 0

- A、奇脉
- B、洪脉
- C、交替脉
- D、水冲脉
- E、细脉

【答案】： C

60、以下患者可以立即转送的是 0

- A、腹腔内出血未控制
- B、休克患者
- C、大腿骨折未固定
- D、急性左心素竭
- E、肠膨出已行腹部包扎

【答案】： E

61、男性，50 岁，车祸后 6 小时入院，神志淡漠，四肢冰冷，血压 9.33/6.67KPa(70/50mmHg) 诊断为 0

- A、轻度低血容量性休克
- B、中度低血容量性休克
- C、重度低血容量性休克
- D、中度感染性休克
- E、重度感染性休克

【答案】： B

62、危重症患者家属病情保障方面的需求，家属最关心的是 0

- A、患者安全
- B、患者饮食
- C、患者舒适
- D、患者心理
- E、患者支持

【答案】： A

63、现场急救中，口对口人工呼吸的吹气频率较适宜的是()

- A、12~14 次/分
- B、14~16 次/分
- C、16~18 次/分
- D、18~20 次/分
- E、20~22 次/分

【答案】： B

64、男，57 岁。2 个月来清晨常出现头痛，癫痫发作 4 次，经检查诊断为颅内占位性

病变、颅内压增高，行开颅手术。颅内压增高的典型表现为(

- A、头痛、呕吐、食欲缺乏
- B、头痛、呕吐、抽搐
- C、头痛、抽搐、呕吐、意识障碍
- D、头痛、呕吐、视盘水肿
- E、头痛、抽搐、血压增高

【答案】： D

65、男性，22 岁，右胸刺伤 2 小时，创口与胸腔相通，患者极度呼吸困难，首要的急救措施是)

- A、迅速封闭胸壁伤口
- B、立即手术
- C、输血，输液

D、胸腔闭式引流

E、给氧，气管插管

【答案】： A

66、用氧安全的重点是做好“四防”，其内容不包括 0

- A、防震
- B、防火
- C、防热
- D、防油
- E、防移动

【答案】： E

67、心绞痛发作的主要原因 0

- A、主动脉狭窄
- B、主动脉关闭不全
- C、全身小动脉痉挛
- D、冠状动脉狭窄或畸形
- E、肺动脉痉挛

【答案】： D

68、中年女性，45 岁。炎热夏天，天气闷热，在外面连续工作 5 小时，由于大量出汗

导致失水、失钠等引起的周围循环灌注不足属于 0

- A、热衰竭
- B、热射病
- C、热痉挛
- D、日射病

【答案】： A

69、气管插管时看到的第一个标记物是 0

- A、声门
- B、会厌
- C、切牙
- D、悬雍垂

【答案】： D

70、短时间内出血量超过()时可出现周围循环衰竭。0

A 、500ml

B

- 、800ml
- C、1200ml
- D、1000ml
- E、2000ml

【答案】： D

71、患者男性，自感心慌、头晕。查体；心率 84 次\分，脉搏 52 次\分，心律不规则，
心率快慢不一，心音强弱不等，该患者可能出现了 0

- A、二联律
- B、三联律
- C、脉搏短绌
- D、心动过缓
- E、脉搏异常

【答案】： C

72、热射病降温通常应在 2 小时内使核心温度降至 0℃左右(

- A、32
- B、35
- C、37.5
- D、38.5
- E、39

【答案】： D

73、休克时正确的补液原则是 0

- A、补液“宁多勿少”
- B、需多少补多少
- C、补充丧失的部分液体和当天继续丧失的液体
- D、失多少补多少
- E、如血压正常不必补液

【答案】： B

74、EC 手法 E

的作用是 0

- A、触摸颈动脉
- B、按压颈部
- C、固定面罩
- D、开放气道

【答案】： D

75、开放性腹部损伤中，致伤物有入口、出口的是 0

- A、贯通伤
- B、盲管伤
- C、挤压伤
- D、穿透伤
- E、扭挫伤

【答案】： B

76、关于呼吸的观察不正确的是 0

- A、成人安静时每分钟 16~20 次
- B、每分钟超过 24 次称呼吸增快，每分钟少于 10 次称呼吸减慢
- C、潮式呼吸和间歇呼吸属于节律异常的呼吸
- D、呼吸困难分为吸气性、呼气性和混合性三类
- E、呼气时发出鼾声是由于喉头痉挛引起

【答案】： E

77、药品冰箱温度应维持在什么范围?0

- A、2-6℃
- B 、2-8℃
- C 、3-8℃
- D、4-6℃

【答案】： B

78、插胃管时，患者出现呛咳、紫绀应 0

A

- 、嘱患者深呼吸
- B、嘱患者作吞咽动作
- C、立即拔出胃管重插
- D、托起患者头部再插管
- E、稍停片刻继续插

【答案】： C

79、急救药品和各种抢救设备做到“五定”不包括 0

- A、定点安置
- B、定人保管
- C、定期消毒灭菌
- D、定期检查维修
- E、定期使用

【答案】： E

80、各种类型休克基本病理变化是 0

- A、血压下降
- B、中心静脉压下降
- C、脉压减小
- D、尿量减少
- E、有效循环血量锐减

【答案】： E

81、患者，男性，49 岁。冠心病史 5 年，以“胸闷、剧烈胸痛半小时，伴大汗”为

主诉来诊，进入抢救室后，心电监护示波显示“RS 波群消失，代之以大小不等、

形态各异的颤动波，频率为 300 次/分”。此时应立即采取的最恰当的急救措施是

)

- A、按压人中，同时立即给予气管插管
- B、应用单相波除颤器连续除颤 3 次

C、应用双相波除颤器进行除颤，能量 150J

D、立即给予气管插管，胸外按压

E、立即建立静脉通路，给予肾上腺素 0.5~1mg 静脉注射

【答案】： C

82、一氧化碳中毒，最先受累的脏器是 0

- A、心脏
- B、骨骼肌
- C、胃肠道
- D、肾脏
- E、脑组织

【答案】： E

83、患者，女性，不慎被毒妒咬伤，小腿伤口红肿疼痛后因伤口渗血性液不止，来院

处理，哪项不正确 0

- A、患肢抬高
- B、伤口湿纱布覆盖
- C、肌注扑尔敏
- D、将伤口初步排毒后冲洗、湿敷
- E、用普鲁卡因加地米伤肢环状阻滞

【答案】： A

84、判断可能存在心跳呼吸骤停患者的呼吸情况时，比较合理、适应多种院前院

内急救情况的方法是 0

- A、使用听诊器听诊病人的双肺呼吸音；
- B、利用棉签、毛发等物体凑近患者鼻孔观察有无气流；
- C、解开患者衣物仔细观察有无胸库起伏；
- D、左耳凑近患者口鼻部，感觉有无气流和呼吸音，同时眼睛观察有无胸康起伏。
- E、以上方法均正确

【答案】： D

85、急性巴比妥类药中毒时最主要的并发症和致死原因是()

- A、呼吸和循环衰竭
- B、中毒性休克
- C、大出血
- D、急性肾衰竭
- E、急性肝衰竭

【答案】： A

86、休克代偿期血压的变化)

- A、收缩压下降，脉压正常
- B、血压无变化
- C、收缩压正常，脉压小
- D、收缩压正常，脉压大
- E、收缩压升高，脉压大

【答案】： C

87、高血压分为几级

- A、1 级
- B、2 级
- C、3 级
- D、4 级

【答案】： C

88、下列各组药物中，可经气管内给予的是

- A、肾上腺素、阿托品、胺碘酮
- B、阿托品、心律平、肾上腺素
- C、利多卡因、异搏定、5%碳酸氢钠
- D、纳洛酮、西地兰、阿托品
- E、肾上腺素、阿托品、利多卡因

【答案】： E

89、细带包扎顺序原则上应为 0

- A、从上向下，从左向右，从远心端向近心端
- B、从下向上，从右向左，从远心端向近心端
- C、从下向上，从左向右，从远心端向近心端
- D、从下向上，从左向右，从近心端向远心端

【答案】： C

90、最容易发生急性肾衰竭的是 0

- A、严重颅脑外伤
- B、严重挤压伤
- C、大面积烧伤
- D、外伤致脾破裂
- E、骨盆骨折

【答案】： B

91、急性镇静安眠药中毒时，可选用)药物促进苏醒，同时还有拮抗呼吸抑制作用。

()

- A、美蓝
- B、VK1
- C、解碘定
- D、阿托品
- E、纳络酮

【答案】： E

92、患者，男性，30 岁。 一小时前 5 米高处坠落，由同事送至医院，根据创伤机制

能量来源分类，海创伤能量成分为 0

- A、热力学能量
- B、电力学能量
- C、机械能量(√)
- D、化学能量

E、放射学能量

【答案】： C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/825220204201011223>