

# 最新卫生资格护理学（执业护士含护士）考试题无忧 资料全 整下载（包过关）1

## 1、A1/A2型题

1、南丁格尔创建世界上第一所正式的护士学校的时间是（ ）。

- A. 1854年
- B. 1860年
- C. 1907年
- D. 1910年
- E. 1912年

2、我国建立第一所护士学校的时间是（ ）。

- A. 1835年
- B. 1860年
- C. 1888年
- D. 1906年
- E. 1912年

3、我国举办的首次全国护士执业考试的时间（ ）。

- A. 1950年
- B. 1966年
- C. 1979年
- D. 1983年
- E. 1995年

4、护理学四个基本概念的核心是（ ）。

- A . 人
- B . 环境
- C . 护理
- D . 预防
- E . 健康

5、有关“健康”的描述正确的是（ ）。

- A. 无躯体疾病或不适
- B. 能正确地评价自己
- C. 保持心理上的平衡

- D. 有完好的生理、心理和社会适应能力
- E. 健康与疾病是对立的，不能相互转化

2、B型题

- A. 临床护理
- B. 护理管理
- C. 护理教育
- D. 社区护理
- E. 护理研究

- 1、护理对象仅限于病人的护理实践范畴指的是（）。
- 2、护理对象既包括个人，又包括家庭的护理实践范畴指的是（）。

## 2

1、A1/A2型题

- 1、下列对不规范坐姿的描述正确的是（）。
  - A. 头正颈直
  - B. 双肩放松
  - C. 下颌微收
  - D. 双膝分开脚后收
  - E. 轻稳地坐于椅面的前2/3
- 2、人际交往中的语言和非语言沟通技巧，各占比例为（）。
  - A. 35%和65%
  - B. 40%和60%
  - C. 45%和55%
  - D. 50%和50%
  - E. 55%和45%
- 3、属于护士日常礼仪用语的是（）。
  - A. 解释操作目的
  - B. 说明配合要求
  - C. 简要讲解方法
  - D. 安慰用语
  - E. 转移患者注意力
- 4、护士与患者讨论术前准备时所采取的合适距离区域是（）。

- A . 亲密区
- B . 熟人区
- C . 社交区
- D . 演讲区
- E . 公众区

5、倾听过程中不妥的做法是 ( )

- A. 集中精力
- B. 保持眼神接触
- C. 使患者处于仰视位
- D. 距离以能看清对方表情为宜
- E. 注意运用点头表示关注

6、李先生，25岁，因患肺炎，需要静脉输液，下列不属于护理操作前解释用语的是 ( )。

- A. 本次操作目的
- B. 病人准备工作
- C. 讲解简要方法
- D. 执行者的承诺
- E. 谢谢病人的合作

## 2、B型题

- A. 较高的慎独修养
- B. 较强的实践技能
- C. 文雅健康的姿态
- D. 具有特殊的科研技能
- E. 护士应与患者的情绪保持一致

1、护士应具备的思想品德素质是 ( )。

2、护士应具备的专业素质是 ( )。

# 3

## 1、A1型题

1、大量咯血是指 ( )。

- A. 一次咯血量小于100ml
- B. 一次咯血量大于100ml
- C. 一次咯血量大于200ml

- D. 一次咯血量大于300ml
  - E. 24小时内咯血量大于300ml
- 2、下列关于咳嗽的描述，不正确的是
- A. 是呼吸系统疾病最常见的症状
  - B. 是一种保护性防御机制
  - C. 可排出呼吸道内的分泌物或异物
  - D. 剧烈咳嗽对机体无不良影响
  - E. 是一种反射动作
- 3、下列血气分析结果符合Ⅱ型呼吸衰竭的是
- A. PaO<sub>2</sub>65mmHg, PaCO<sub>2</sub> 35mmHg
  - B. PaO<sub>2</sub>55mmHg, PaCO<sub>2</sub> 55mmHg
  - C. PaO<sub>2</sub>40mmHg, PaCO<sub>2</sub> 35mmHg
  - D. PaO<sub>2</sub>70mmHg, PaCO<sub>2</sub> 35mmHg
  - E. PaO<sub>2</sub>80mmHg, PaCO<sub>2</sub> 35mmHg
- 4、有关左心衰竭病理生理及临床表现的描述，下列哪项不正确
- A. 病理生理改变为体循环淤血
  - B. 最早出现的是劳力性呼吸困难
  - C. 咳嗽、咳痰呈白色泡沫样
  - D. 如发生急性肺水肿则咳大量粉红色泡沫痰
  - E. 晚期出现端坐呼吸
- 5、心肌梗死的发热一般不超过
- A. 37.5 °C
  - B. 38 °C
  - C. 38.5 °C
  - D. 39 °C
  - E. 40 °C
- 6、按舒张压水平分级，重度高血压是指舒张压
- A. ≥105mmHg
  - B. ≥110mmHg
  - C. ≥115mmHg
  - D. ≥120mmHg
  - E. ≥125mmHg
- 7、在心力衰竭治疗中可以同时减轻心脏前负荷和后负荷的药物是

- A. 氨苯蝶啶
  - B. 氢氯噻嗪
  - C. 呋塞米
  - D. 硝普钠
  - E. 硝酸甘油
- 8、下列哪项不是胃肠黏膜的损害因素
- A. 非苗体类药物
  - B. 吸烟
  - C. 过度精神紧张
  - D. 刺激性饮食
  - E. 前列腺素
- 9、西咪替丁治疗消化险溃疡的机制是
- A . 阻断  $H^+K^+ - ATP$  酶
  - B . 拮抗  $H_2$  受体
  - C . 中和胃酸
  - D . 加速胃排空
  - E . 延缓胃排空
- 10、我国肝硬化的主要病因为
- A . 酒精中毒
  - B . 胆汁淤积
  - C . 慢性充血性心力衰竭
  - D . 病毒性肝炎
  - E . 血吸虫病
- 11、肝硬化患者内分泌功能异常主要是
- A . 雄激素增多
  - B . 雌激素增多
  - C . 肾上腺皮质激素增多
  - D . 雌激素减少
  - E . 甲状腺激素减少
- 12、肾炎性水肿发生的机制为
- A . 肾小球滤过率下降，肾小管重吸收功能下降
  - B . 肾小球滤过率增加，肾小管重吸收功能增加
  - C . 肾小球滤过率基本正常，肾小管重吸收功能增加

- D . 肾小球滤过率下降, 肾小管重吸收功能基本正常
  - E . 肾小球滤过率增加, 肾小管重吸收功能下降
- 13、下列关于肾性高血压的描述不正确的是
- A . 肾性高血压绝大多数是容量依赖性
  - B . 限制水钠摄入可改善肾性高血压
  - C . 肾性高血压可加重肾功能损害
  - D . 肾性高血压具有原发性高血压的一般症状
  - E . 肾性高血压一般不会引起高血压脑病
- 14、下列关于白血病的描述, 哪项不妥
- A . 白血病是一种病因不明的造血系统恶性疾病
  - B . 白血病细胞起源于造血干细胞
  - C . 骨髓象可见幼稚细胞, 外周血中不见幼稚细胞
  - D . 正常造血功能常受到抑制
  - E . 多数患者有肝、脾、淋巴结肿大
- 15、同侧上肢和下肢出现运动功能减低或运动无力, 称为
- A . 单瘫
  - B . 截瘫
  - C . 偏瘫
  - D . 交叉性瘫痪
  - E . 局限性瘫痪
- 16、下列属于深感觉的是
- A . 痛觉
  - B . 触觉
  - C . 热觉
  - D . 冷觉
  - E . 振动觉
- 17、类风湿关节炎关节疼痛的特点为
- A . 固定于少数关节, 剧烈难忍
  - B . 呈游走性
  - C . 关节痛于活动后减轻
  - D . 多呈不对称性
  - E . 发作急骤
- 18、类风湿关节炎关节病变的特点是

- A . 大关节受累
- B . 多数不遗留关节畸形
- C . 游走性疼痛
- D . 主要为累及小关节的对称性多关节炎
- E . 关节肿胀

19、与静脉麻醉相比，吸入麻醉的优点有

- A. 诱导迅速
- B. 操作方便
- C. 药物安全无爆炸性
- D. 对呼吸道刺激小
- E. 容易调节麻醉深度

20、若将体内每日的代谢产物经肾排出，至少需要的尿量为

- A. 100~200ml
- B. 300~400ml
- C. 500~600ml
- D. 800~1000ml
- E. 1000~1500ml

21、细胞外液最主要的阳离子是

- A. K<sup>+</sup>
- B. Na<sup>+</sup>
- C. Mg<sup>+</sup>
- D. H<sup>+</sup>
- E. Ca<sup>2+</sup>

22、各型休克的共同特点是

- A. 血压下降
- B. 中心静脉压下降
- C. 脉压下降
- D. 尿量减少
- E. 微循环灌注不足

23、全脊椎麻醉的主要危险是

- A . 低血压
- B . 剧烈头痛
- C . 麻醉作用持久

- D . 呼吸、心跳骤停
  - E . 损伤脊髓导致截瘫
- 24、以下属于治疗性手术的是
- A . 淋巴结活检术
  - B . 阑尾切除术
  - C . 食管癌的胃造口术
  - D . 重睑手术
  - E . 直肠癌的结肠造口术
- 25、面部“危险三角区”的疔的危险性在于
- A . 引起眼球后感染
  - B . 抗生素治疗无效
  - C . 可并发上颌窦感染
  - D . 容易形成痈
  - E . 引起海绵状静脉窦炎
- 26、乳癌病人皮肤出现“酒窝征”的原因是
- A . 粘连
  - B . 肿物压迫
  - C . 并发炎症
  - D . 癌肿侵及 Cooper 韧带
  - E . 癌细胞堵塞表浅淋巴管
- 27、恶性肿瘤的 TNM 分期法中 N 表示
- A . 预后情况
  - B . 淋巴结
  - C . 恶性程度
  - D . 原发肿瘤
  - E . 远处转移
- 28、乳癌病变发展过程中最常见的转移部位是
- A . 肺
  - B . 肝
  - C . 腋窝淋巴结
  - D . 锁骨下淋巴结
  - E . 胸骨旁淋巴结
- 29、腹外病的发病因素中最重要的是

- A . 妊娠
- B . 长期便秘
- C . 慢性咳嗽
- D . 排尿困难
- E . 腹壁强度降低

30、切口病最主要的发病原因是

- A . 营养不良
- B . 切口感染
- C . 放置引流物时间过长
- D . 术后咳嗽、腹胀
- E . 切口血肿

31、继发性腹膜炎最常见的致病菌是

- A . 溶血性链球菌
- B . 肺炎链球菌
- C . 变形杆菌
- D . 大肠埃希菌
- E . 厌氧类杆菌

32、急性腹膜炎病人发生休克的主要原因是

- A . 发热
- B . 大量呕吐
- C . 剧烈疼痛
- D . 血容量减少及毒素吸收
- E . 细菌毒力强

33、溃疡病最重要的发病因素是

- A. 胃酸分泌过多
- B. 幽门螺杆菌感染
- C. 胃黏膜屏障损害
- D. 遗传因素
- E. 精神神经因素

34、急性阑尾炎易发生坏死、穿孔的主要原因是

- A . 阑尾开口小
- B . 阑尾淋巴丰富
- C . 阑尾蠕动慢而弱

- D . 阑尾动脉为终末动脉
  - E . 阑尾系膜短
- 35、关于肛门周围脓肿的叙述正确的是
- A . 肛周疼痛不剧烈
  - B . 是慢性化脓性感染
  - C . 常自行破溃，形成低位肛瘘
  - D . 在直肠肛管周围脓肿中较少见
  - E . 多有高热、寒战、全身疲乏不适
- 36、门静脉高压症形成后首先出现的病理改变是
- A . 腹水
  - B . 脾肿大
  - C . 肝肿大
  - D . 交通支扩张
  - E . 呕血
- 37、急性梗阻性化脓性胆管炎的最常见的梗阻因素是
- A . 胆道肿瘤
  - B . 胆总管结石
  - C . 胆道蛔虫
  - D . 胆管扭转
  - E . 胆管狭窄
- 38、胰腺癌好发的部位是
- A. 胰体、尾部
  - B. 胰颈、体部
  - C. 全胰腺
  - D. 胰头、颈部
  - E. 胰尾部
- 39、急性胰腺炎的发病原因不包括
- A. 胆总管梗阻
  - B. 酒精中毒
  - C. 暴饮暴食
  - D. 低钙血症
  - F. 病毒感染
- 40、门静脉高压症患者的门一腔静脉交通支开放曲张，其中最具有临床意义的是

- A. 脐旁与腹壁上静脉交通支
- B. 脐旁与腹壁下静脉交通支
- C. 食管下段与胃底静脉交通支
- D. 直肠下段与肛管静脉交通支
- E. 腹膜后静脉交通支

41、老年男性潴留最常见的原因是（ ）。

- A. 尿道狭窄
- B. 膀胱结石
- C. 膀胱肿瘤
- D. 前列腺增生
- E. 膀胱结核

42、反常呼吸运动常见于

- A. 多根多处肋骨骨折
- B. 开放性气胸
- C. 闭合性气胸
- D. 张力性气胸
- E. 血胸

43、子宫肌瘤发病可能的相关因素是

- A. 早婚早育，性生活紊乱
- B. 高血压，糖尿病，肥胖
- C. 体内雌激素水平过高
- D. 饮食因素
- E. 环境因素

44、原发性闭经是指

- A. 年龄已满14岁，第二性征已发育
- B. 无月经来潮者且年龄已满15岁，第二性征已发育且无月经来潮者
- C. 年龄已满16岁，第二性征已发育且无月经来潮者
- D. 年龄已满17岁，第二性征已发育且无月经来潮者
- E. 年龄已满18岁，第二性征已发育且无月经来潮者

45、化疗前需要准确测量病人体重的理由是

- A. 精确计算输入量
- B. 精确计算药物剂量
- C. 精确计算病人饮食需要量

- D. 精确计算补液量
  - E. 确定化疗的疗效
- 46、使用短效口服避孕药的妇女开始服第一片药的时间一般为
- A. 月经来潮前第5天
  - B. 月经来潮的第5天
  - C. 月经来潮的第10天
  - D. 月经干净后第5天
  - E. 性生活前8小时
- 47、正常足月妊娠时，羊水量约为
- A. 350ml
  - B. 500ml
  - C. 1000ml
  - D. 2000ml
  - E. 250ml
- 48、临产观察先露下降程度的标志是
- A. 耻骨弓
  - B. 骶尾关节
  - C. 坐骨结节水平
  - D. 坐骨棘水平
  - E. 骶骨岬
- 49、新生儿期是指
- A. 自出生脐带结扎到1周岁
  - B. 自受孕到出生脐带结扎时
  - C. 自出生脐带结扎开始到满28天
  - D. 自出生后第一天到生后第30天
  - E. 自出生后第一天到生后第40天
- 50、20千克小儿体表面积为
- A.  $0.5\text{m}^2$
  - B.  $0.6\text{m}^2$
  - C.  $0.7\text{m}^2$
  - D.  $0.8\text{m}^2$
  - E.  $0.9\text{m}^2$
- 51、人体维生素 D 的主要来源是

- A . 乳类中的维生素 D
- B . 蛋黄中的维生素 D
- C . 猪肝中的维生素 D
- D . 植物中的维生素
- E . 皮肤中的7-脱氢胆固醇

52、婴儿手足搐搦症的主要死亡原因是

- A . 无热惊厥
- B . 心力衰竭
- C . 喉痉挛
- D . 呼吸衰竭
- E . 手足搐溺

53、急性肾小球肾炎前驱感染最常见的病原体是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 柯萨奇病毒
- E. A 组乙型溶血性链球菌

54、新生儿化脓性脑膜炎最常见的病原菌是

- A . 脑膜炎双球菌
- B . 肺炎链球菌
- C . 流感嗜血杆菌
- D . 大肠埃希菌
- E . 乙型溶血性链球菌

55、先天性心脏病最常见的类型是

- A . 房间隔缺损
- B . 室间隔缺损
- C . 动脉导管未闭
- D . 法洛四联症
- E . 肺动脉狭窄

56、婴儿营养不良的主要原因是

- A. 喂养不当
- B. 患传染病
- C. 双胎早产

- D. 生长发育迅速
  - E. 消化系统结构或功能异常
- 57、秋季腹泻的病原体是
- A. 柯萨奇病毒
  - B. 轮状病毒
  - C. 白色念珠菌
  - D. 致病性大肠埃希菌
  - E. 金黄色葡萄球菌
- 58、新生儿易发生黄疸是由于
- A. 肝功能不成熟
  - B. 体温调节功能差
  - C. 免疫功能不成熟
  - D. 红细胞寿命比成人长
  - E. 肠肝循环减少
- 59、惊厥持续状态是指
- A. 惊厥持续>10分钟
  - B. 惊厥持续>20分钟
  - C. 惊厥持续>30分钟
  - D. 惊厥持续>40分钟
  - E. 惊厥持续>60分钟
- 60、容易造成营养性缺铁性贫血的原因是
- A. 足月儿4个月开始添加富含铁剂的食物
  - B. 早产儿2个月开始添加富含铁剂的食物
  - C. 长期单纯母乳喂养
  - D. 过期产
  - E. 便秘
- 61、下列哪项不是母乳的特点
- A. 矿物质较多
  - B. 消化酶较多
  - C. 乙型乳糖较多
  - D. 乳清蛋白较多
  - E. 不饱和脂肪酸较多
- 62、法洛四联症的畸形不包括下列哪项

- A. 肺动脉狭窄
- B. 室间隔缺损
- C. 房间隔缺损
- D. 主动脉骑跨
- E. 右心室肥厚

63、关于结核病两段疗法的描述，不合适的是

- A . 包括强化治疗和巩固治疗
- B . 包括诱导治疗和维持治疗
- C . 两段疗法是针对重症结核病的
- D . 增强了疗效
- E . 防止和减少了耐药菌株的产生

64、婴幼儿时期最常见惊厥的原因是

- A . 高热
- B . 癫痫
- C . 中毒性脑病
- D . 脑炎和脑膜炎
- E . 低血糖和水、电解质紊乱

65、患者，男性，发热 $38.5^{\circ}\text{C}$ ，全身有小出血点，头晕乏力，经医院查血红蛋白 $80\text{g/L}$ ，红细胞 $3\times 10^{12}/\text{L}$ ，白细胞 $3\times 10^9/\text{l}$ ，血小板 $70\times 10^9/\text{L}$ ，确诊为再生障碍性贫血。其发热的主要原因是

- A . 营养不良
- B . 缺乏成熟中性粒细胞
- C . 缺氧
- D . 出血
- E . 新陈代谢旺盛

66、某消化性溃疡病人，原有疼痛节律消失，变为持续上腹痛，伴频繁呕吐，呕吐物含发酵性宿食。最可能的并发症是

- A. 幽门梗阻
- B. 急性胰腺炎
- C. 穿孔
- D. 胃癌
- E. 上消化道出血

67、患者女性，45岁，有哮喘史5年，近来每当给爱犬洗澡后出现咳嗽、咳痰伴喘息，护士为其宣教时应指出其最可能的过敏原是

- A . 花粉
- B . 尘螨
- C . 动物的毛屑
- D . 病毒感染
- E . 精神因素

68、患者，男，67岁，冠心病心绞痛7年，平日心绞痛发作时舌下含硝酸甘油 2~5分钟缓解，今晨饱餐后，突感心前区剧烈疼痛，服用硝酸甘油半小时未缓解。急诊入院。心电图检查 V1—V<sub>3</sub>从导联 ST 段弓背上抬，血压85/55mmHg，心率98次/分，律齐。入监护室观察治疗，经用药后疼痛缓解。2小时后心电监测示血压 80/50mmHg，心率120次/分，患者烦躁不安，皮肤湿冷，此时责任护士认为病人的病情变化是

- A. 心力衰竭
- B. 心脏破裂
- C. 心源性休克
- D. 心律失常
- E. 脑出血

69、患者，男性，34岁，因腹痛 1 小时急诊。1小时前无明显诱因突然发作剧烈腹痛，呈绞痛，向下腹、大腿内侧及会阴部放射，伴恶心、呕吐，面色苍白，大汗淋漓。尿常规示大量红细胞。该患者表现符合下列何种疾病

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 慢性肾盂肾炎急性发作
- D. 尿路感染
- E. 输尿管结石

70、男性，34岁，计算机工程师，近期感觉久坐后下肢沉重酸胀，容易疲劳。护士指导其在工作期间定时站立，活动下肢，以促进下肢血液循环，其原理是利用

- A. 小腿肌泵收缩功能
- B. 胸腔吸气期负压
- C. 心脏舒张期负压
- D. 静脉瓣膜向心单向开放
- E. 地心对血柱的吸引力

71、男性，45岁，左手被砸伤2小时，左手肿胀，皮肤青紫，压痛明显，X线检查未见骨折，其受伤类型为

- A. 裂伤
- B. 擦伤
- C. 挤压伤

- D. 扭伤
- E. 挫伤

72、某健康妇女，28岁，已婚，未孕，其子宫峡部长度正常情况下约为

- A. 0.5cm
- B. 1.0cm
- C. 1.5cm
- D. 2.0cm
- E. 2.5cm

73、某妇女，50岁，6个月前开始月经紊乱，并且出现潮热潮红，易激动，推测她目前处在其生命中的

- A. 青春期
- B. 生育期
- C. 性成熟期
- D. 围绝经期
- E. 老年期

## 2、A3型题

患者女性，48岁，慢性肾小球肾炎8年，伴高血压3年，近1个月来食欲下降，精神萎靡，疲乏，且常有鼻出血，1天前发现大便颜色黑亮似柏油样，门诊检查，肾功能检查示血肌酐  $790\mu\text{mol/L}$ ，血尿素氮  $8.8\text{mmol/L}$

1、该患者最可能的诊断是

- A. 肾病综合征
- B. 肾功能不全代偿期
- C. 肾功能衰竭期
- D. 肾功能不全尿毒症期
- E. 氮质血症期

2、该患者常有鼻出血，且此次出现大便颜色改变最可能的原因是

- A. 进食了某些食物如血肠所致
- B. 血小板容易被破坏而导致消化道出血
- C. 红细胞寿命缩短
- D. 铁、叶酸缺乏
- E. 某些代谢产物抑制骨髓造血功能

3、下列治疗中可替代失去功能的肾排泄各种毒物的疗法是

- A. 治疗原发病
- B. 饮食治疗

- C . 必需氨基酸的应用
- D . 利尿治疗
- E . 透析治疗

某健康妇女，进行查体，其骨盆形态各径线均属于正常人的平均值。

4、其骨盆入口平面前后径值为

- A. 11cm
- B. 12cm
- C. 13cm
- D. 14cm
- E. 15cm

5、其中骨盆平面前后径值为

- A. 11cm
- B. 11.5cm
- C. 12cm
- D. 12.5cm
- E. 13cm

患儿，女，1岁，生后3个月起青紫渐加重，活动后气急。查体：生长发育明显落后，口唇、鼻尖、耳垂、指趾青紫明显，伴杵状指（趾），胸骨左缘闻及Ⅲ级收缩期杂音，肺动脉瓣区第二心音减弱。

6、该患儿可能的诊断为

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

7、患儿第二天晨起吃奶时出现阵发性呼吸困难，烦躁和青紫加重，出现昏厥，其原因是

- A . 脑膜炎
- B . 脑栓塞
- C . 月亩脓肿
- D . 心力衰竭
- E . 肺动脉漏斗部肌肉痉挛

3、B型题

A. 脓臭痰

- B. 草绿色
- C. 红棕色胶冻状
- D. 灰褐色
- E. 黄色

- 1、肺炎杆菌感染时病人的痰液常为
- 2、肺脓肿病人的痰液常为
- 3、金黄色葡萄球菌病人的痰液常为
- 4、铜绿假单胞菌感染时病人的痰液常为

- A . 抑制血管紧张素 n 生成
- B . 选择性扩张外周血管
- C . 使心肌收缩力降低，外周血管扩张
- D . 抑制钠、水重吸收，减少血容量，降低心排血量
- E . 减慢心率、降低心排血量，抑制肾素释放

- 5、钙离子阻滞剂降压的作用原理是
- 6、ACEI 类药物降压的作用原理是

- A. 限制钠盐摄入
- B. 限制蛋白质摄入
- C. 低糖低脂饮食
- D. 多吃肉汤、鸡汤
- E. 禁食

- 7、肝性脑病应
- 8、肝硬化腹水应

- A. 100ml
- B. 400ml
- C. 750ml
- D. 1000ml
- E. 2000ml

- 9、无尿是指24小时尿量少于
- 10、夜尿增多是指夜尿持续大于

- A . 代谢性酸中毒
- B . 代谢性碱中毒
- C . 呼吸性酸中毒
- D . 呼吸性碱中毒
- E . 高钾血症

- 11、手术后并发肺炎的病人可发生
- 12、胰痿病人可发生

- A. 中心静脉压低，血压低
- B. 中心静脉压高，血压低
- C. 中心静脉压高，血压正常
- D. 中心静脉压低，血压正常
- E. 中心静脉压正常，血压低

13、提示血容量相对不足

14、说明血管过度收缩

- A . 腹壁浅动脉外侧，腹股沟韧带上方
- B . 腹壁浅动脉内侧，腹股沟韧带上方
- C . 陷窝韧带外侧，腹股沟韧带下方
- D . 腹壁下动脉外侧，腹股沟韧带上方
- E . 腹壁下动脉内侧，腹股沟韧带上方

15、腹股沟斜疝的疝囊颈位于

16、股疝的疝囊颈位于

- A. 月经期
- B. 增生期
- C. 分泌期
- D. 月经前期
- E. 月经周期

17、两次月经第一天的间隔时间为

18、月经的第1~4天，称为

19、月经的第5~14天，称为

20、月经的第15~24 天，称为

## 4

### 1、A1型题

1、术后早期出现恶心。呕吐的常见原因为（ ）

- A. 低钾血症
- B. 颅内压增高
- C. 等渗性脱水
- D. 麻醉反应
- E. 麻痹性肠梗阻

2、排列护理诊断优先顺序时应注意（ ）

- A. 对于病人来说，护理诊断的先后顺序是固定不变的
  - B. 现存的护理诊断应排在“有……危险”的护理诊断之前
  - C. 首优的护理诊断解决后再解决中优的护理诊断
  - D. 护士可依据马斯洛的需要层次论进行排序
  - E. 即使与治疗原则相冲突，也应将病人认为重要的问题排在首优
- 3、社区护理应用的理论是（ ）。
- A. 管理学
  - B. 心理学
  - C. 公共卫生学
  - D. 伦理学
  - E. 美学
- 4、属于气体杀菌剂的是（ ）。
- A. 37%~40%甲醛
  - B. 环氧乙烷
  - C. 过氧乙酸
  - D. 戊二醛
  - E. 乙醇
- 5、服用铁剂后出现黑便的常见原因是（ ）。
- A. 引起肠粘膜破溃出血
  - B. 引起消化道出血
  - C. 腐蚀肠壁血管引起出血
  - D. 在肠道细菌作用下生成硫化铁所致
  - E. 腐蚀胃血管引起出血
- 6、注射区域皮肤消毒其乙醇浓度为（ ）
- A. 55%
  - B. 65%
  - C. 75%
  - D. 85%
  - E. 95%
- 7、冠心病病人舌下给药时最宜采取（ ）

- A. 左侧卧位
  - B. 右侧卧位
  - C. 仰卧位
  - D. 半坐位
  - E. 端坐位
- 8、右心衰竭临床表现下列哪项错误（ ）
- A. 食欲缺乏、少尿、肝区胀痛
  - B. 早期在身体疏松部位出现水肿，如眼睑
  - C. 颈静脉怒张
  - D. 肝大、压痛
  - E. 口唇、甲床出现发绀
- 9、下列无菌包保管原则哪项不正确（ ）。
- A. 无菌包和非无菌包应分开放置
  - B. 应放在清洁干燥物品柜内
  - C. 应注明灭菌日期
  - D. 无菌包一经打开，包内物品不可再用
  - E. 无菌包的有效期一般为7天
- 10、低蛋白饮食的成年患者，每天蛋白质的摄入量应低于（ ）。
- A. 20g
  - B. 30g
  - C. 40g
  - D. 50g
  - E. 60g
- 11、为女性患者导尿时，见尿液留出后，尿管再插入（ ）。
- A. 0.5~1cm
  - B. 1~2cm
  - C. 1.5~2.5cm
  - D. 2~2.5cm
  - E. 2.5~3cm
- 12、服用时应避免接触牙齿的药物是（ ）

- A. 扑热息痛
  - B. 抗菌优
  - C. 硝酸甘油
  - D. 洋地黄
  - E. 硫酸亚铁糖浆
- 13、SLE 患者下列哪项护理不正确 ( )
- A. 加强户外锻炼，多晒太阳
  - B. 皮损处用清水冲洗
  - C. 脱发的病人每周温水洗头2次
  - D. 皮肤粘膜有霉菌感染时可用2.5%制霉菌素甘油外涂
  - E. 安置在背阳的病室中
- 14、下列哪项不是导致压疮发生的危险因素? ( )
- A. 局部组织受压
  - B. 肌肉软弱萎缩
  - C. 皮肤经常受潮湿、摩擦刺激
  - D. 使用石膏绷带衬垫不当
- 15、缺血性肌挛缩的创伤是 ( )
- A. 肩关节脱位
  - B. 肱骨髁上骨折
  - C. 肘关节脱位
  - D. 桡骨下端骨折
  - E. 锁骨骨折
- 16、药物保管原则，下列哪项不妥 ( )。
- A. 药柜宜放在光线充足处
  - B. 内服药与外用药应分类保管
  - C. 麻醉药应加锁
  - D. 瓶签模糊的药物需认真核对
- 17、患者女性，67岁。胰腺癌晚期，自感不久于人世，常常一人呆坐，泪流满面，十分悲哀。相应的护理措施为 ( )
- A. 维持患者希望
  - B. 鼓励患者增强信心
  - C. 加强与患者的沟通
  - D. 尽量不让患者流露失落、悲哀的情绪
  - E. 允许家属陪伴

18、伤寒病人发热常见的热型是（ ）

- A. 波浪热
- B. 稽留热
- C. 弛张热
- D. 间歇热
- E. 不规则热

19、因静脉痉挛导致输液滴速不畅，此时护士应（ ）

- A. 抬高输液瓶
- B. 减慢滴速
- C. 调整肢体位置
- D. 加压输液
- E. 注射局部血管进行热敷

20、有关化学消毒剂作用原理的叙述，不确切的是（ ）。

- A. 使菌体蛋白凝固变性
- B. 干扰细菌酶的活性
- C. 利用潜热使菌体蛋白及酶变性
- D. 抑制细菌代谢和生长
- E. 损害细胞膜的结构，改变其渗透性

## 2、A2型题

1、病人，于某，男，50岁因在全麻下做剖腹探查术，在未回病房前，护士铺麻醉床时操作错误的是（ ）。

- A. 床旁桌放置麻醉盘
- B. 盖被扇形折叠于床尾
- C. 枕立于床头
- D. 根据需要橡胶单及中单铺于床头
- E. 手术部位铺中单及橡胶单

2、丁红，女，扁桃体摘除术后，采取半卧位的主要目的是（ ）

- A. 改善呼吸
- B. 利于伤口愈合
- C. 减轻疼痛
- D. 减轻局部出血
- E. 利于恢复体质

3、张女士，停经40天，阴道出血1天，量如月经，下腹部坠痛。检查：子宫增大如孕40天大小，宫颈口已扩张，见有胚囊堵塞于子宫颈内口。首先考虑为（ ）

- A. 宫外孕
  - B. 先兆流产
  - C. 难免流产
  - D. 感染性流产
  - E. 稽留流产
- 4、患者女性，60岁。因尿失禁留置导尿管，引流通畅但尿色黄、浑浊，医嘱为抗感染治疗。护理方面应注意（ ）
- A. 热敷下腹部
  - B. 定时更换卧位
  - C. 经常清洗尿道口
  - D. 鼓励多饮水并进行膀胱冲洗
  - E. 立即拔出导尿管
- 5、接触传染病患者后刷手顺序正确的是（ ）
- A. 指甲、手指、指缝、腕部、手背、手掌、前臂
  - B. 指甲、指缝、手掌、手指、腕部、手背、前臂
  - C. 指缝、指甲、腕部、手指、手背、手掌、前臂
  - D. 前臂、腕部、手指、指缝、指甲、手背、手掌
  - E. 前臂、腕部、手背、手掌、手指、指缝、指甲
- 6、某尿失禁病人，护理措施中哪项是错误的（ ）
- A. 指导病人行盆底肌锻炼
  - B. 可采用橡胶接尿器
  - C. 对长期尿失禁病人可采取留置导尿管
  - D. 嘱病人少饮水，以减少排尿
  - E. 多用温水清洗会阴部
- 7、住在儿科的小朋友刘杰，看到护士总是腼腆地咬自己的指甲不作答，根据弗洛伊德的性心理发展理论，你判断他的问题可能源自于（ ）
- A. 口欲期
  - B. 肛门期
  - C. 性蕾期
  - D. 潜伏期
  - E. 生殖期
- 8、护士小李主动为新入院的陈先生介绍病室环境和生活设施、起居作息时间，她满足了对方的（ ）

- A. 生理需要
  - B. 安全需要
  - C. 爱与归属的需要
  - D. 自尊的需要
  - E. 自我实现的需要
- 9、患者女性，64岁、因头晕、头痛3天就医，查体：血压165/105mmHg，可考虑为（ ）
- A. 正常高限
  - B. 临界高血压
  - C. I级高血压
  - D. II级高血压
  - E. III级高血压
- 10、患者，高热5d，可疑败血症，医嘱做血培养，其目的是（ ）
- A. 查血中白细胞数量
  - B. 查血中红细胞数量
  - C. 测转氨酶活性
  - D. 查心肌酶活性
  - E. 找致病菌
- 11、病人李某，胃大部切除术后采取半卧位的目的是（ ）
- A. 减少静脉回流量
  - B. 利于腹腔引流，使炎症局限
  - C. 减少术后出血
  - D. 防止呕吐
  - E. 减轻伤口缝合处的张力
- 12、某病人患尿毒症，留置导尿后每小时引流出尿液 15ml，该病人属于（ ）
- A. 正常
  - B. 无尿
  - C. 少尿
  - D. 尿量偏少
  - E. 尿潴留
- 13、患者男性，65岁。入院诊断脑梗死，经治疗后现需转康复科进行康复治疗。该病人的床单应进行的消毒处理是（ ）
- A. 预防性消毒
  - B. 疫源地消毒
  - C. 终末消毒

- D. 随时消毒
- E. 擦拭消毒

14、患者女性，75岁。原有冠心病病史，近两日突发气紧，夜间为重且不能平卧，今E1咯粉红色泡沫样痰。若给病人吸氧，应选用的乙醇浓度为（ ）

- A. 5%
- B. 15%
- C. 25%
- D. 75%
- E. 95%

15、韩女士，60岁。跌倒致右股骨颈骨折，现给予持续皮牵引处理。该患者最易发生的并发症是（ ）。

- A. 休克
- B. 髋关节创伤性关节炎
- C. 骨化性肌炎
- D. 右坐骨神经损伤
- E. 右股骨头缺血坏死

16、一尿毒症病人，病情逐渐加重，发生代谢性酸中毒，呼吸深而急促，这种呼吸称为（ ）

- A. 潮式呼吸
- B. 毕奥式呼吸
- C. 叹气式呼吸
- D. 鼾声呼吸
- E. 深度呼吸

17、患者男性，64岁、突感心前区憋闷，有、严重窒息感，伴恶心、呕吐及出冷汗，休息及含服硝酸甘油不能缓解，最大可能是（ ）

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性胃炎
- D. 急性心肌梗死
- E. 心肌炎

18、患者方某所住的病室室温30℃，相对湿度70%，此时对患者的影响是（ ）。

- A. 水分蒸发快，散热增加
- B. 水分蒸发慢，散热增加
- C. 闷热难受

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/825310202143011222>