

一、单选题

- 1 .国内推荐新生儿乙肝疫苗免疫程序是“0、1、6”程序，第一剂和第二剂间隔应（C）天，第二剂和第三剂间隔应（C）天。 C.三 28 三 60
- 2 .当前江苏省下发新生儿乙肝疫苗（酿酒酵母）接种剂量为（B）。 B. 10ug
- 3 .乙型肝炎可以采用下列哪种生物制品人工被动免疫（D）。 D.特异性高效价免疫球蛋白
- 4 .卡介苗 PPD 实验采用是（A）。 A.皮内注射
- 5 .AEFI 中，重度发热原则为腋窝温度不不大于或等于多少℃（B） B. 38.6
- 6 .EPI 是指（D）。 D.扩大免疫规划
- 7 .当前国内可防止脊髓灰质炎重要有脊髓灰质炎减毒活疫苗（OPV）和脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV），其中 IPV 为（A）注射，OPV 为口服。 A.肌肉
- 8 .江苏省扩大免疫程序规定，无细胞百白破疫苗免疫程序为（C） C. 3, 4, 5 月龄各一针，18 月龄加强一针
- 9,如下哪项能作为初期诊断麻疹标志（D） D. 口颊粘膜浮现灰白色柯氏斑
- 10 .麻疹潜伏期为（D） D. 7~21d, 平均 10d
- 11 .下列人群可以接种麻腮风疫苗是（C） C.对鸡蛋轻度过敏
- 12 .下列属于当前免疫程序规定一类疫苗是（C） C,麻腮风、麻风、白破、流脑 A 群
- 13 .需要肌肉注射疫苗是（C） C.无细胞百白破和乙肝疫苗
- 14 . A 群流脑疫苗基本免疫 2 齐打应间隔（B） B, 3 个月
- 15 .接种哪种疫苗前需特殊检查，查看小朋友有无肛周脓肿。（A） A.脊髓灰质炎减毒活疫苗
- 16 .乙脑减毒活疫苗免疫程序为 2 齐打其中第 1 剂起始月龄为（D）。 D. 8 月龄
- 17 .冷藏疫苗收货、入库普通应在一分钟内完毕，冷冻疫苗普通应在一分钟内完毕。（C） C. 30 15
- 18 .当前纳入国家免疫规划疫苗有（）种，可防止（）种疾病。（D） D. 14 15
- 19 .原则上，接种脊灰减毒活疫苗后多长时间方可接种麻疹疫苗？（C） C. 28 天
- 20 .关于防止接种初种时间，哪些是对的？（A） A. 2 月龄开始接种脊髓灰质炎疫苗
- 21 .当前江苏省免疫程序规定疫苗中属于多人份疫苗有如下哪些？（B） B.卡介苗，A 群流脑疫苗
- 22 .脑膜炎球菌重要传染源是（D） B.带菌者 C.患者 D. B 和 C
- 23 .关于脊髓灰质炎减毒活疫苗、脊髓灰质炎灭活疫苗，下列说法错误是（A） A.脊髓灰质炎灭活疫苗优势是粘膜免疫、安全性高。

- 24 .急性乙肝潜伏期为 (B) B. 60~150 天 (平均 90d)
- 25 .下列说法对的是 (A) A.卡介苗接种剂量是 0.1ml
- 26 .小朋友出生后正常状况下在接产医院接种疫苗是 (C) C.乙肝疫苗和卡介苗
- 27 .人类历史上第一种使用疫苗消灭传染病是 (A) A.天花
- 28 .接种乙型肝炎病毒疫苗后, 获得免疫力指标是 (B) B.抗 HBs
- 29 .下列接种程序错误是 (B) B.乙脑疫苗 8 月龄、1.5 周岁各接种 1 次
- 30 .接种麻腮风疫苗可以防止 (B) 疾病? B.麻疹风疹 病毒性腮腺炎
- 31 .HIB 侵袭性疾病最易动人群年龄 (D) D. 2 岁如下
- 32 .当前接种 HIB 疫苗种类为 PRP-T, 故下列哪类人群不能接种此疫苗 (B) B.对破伤风类毒素过敏者
- 33 .23 价肺炎球菌多糖疫苗接种人群为 (C) C. 2 岁以上高危人群和老年人
- 34 .国内生产鼠疫减毒活疫苗接种办法是 (D) D.皮上划痕
- 35 .国内当前使用兰州生物生产口服轮状病毒疫苗重要防止哪种血清群轮状病毒导致感染? (A)
- A. A 群
- 36 .在咱们使用最为广泛流感疫苗是如下哪一种? (B) B.流感病毒裂解疫苗
- 37 .流行性感属属于哪类法定传染病? (C) C.丙类
- 38 .哪种疫苗普通用于暴露后免疫? (B) B.狂犬疫苗
- 39 .小明 12 月 20 日被狗咬伤全程接种了狂犬疫苗, 9 月 15 日又再次被咬伤, 应当如何处置? (B) B.伤口冲洗和消毒, 于 0 和 3 天各接种一剂狂犬疫苗
- 40 .WHO 和国内均按照暴露性质和严重限度将狂犬病暴露分为几级? (C) C.三级
- 41 .关于水痘, 下面哪项是错误? (D) D.与带状疱疹接触不会引起水痘
- 42 .重组戊肝疫苗重要用于哪个年龄组人群? (D) D.三 16 岁
- 43 .当前上市使用黄热病疫苗是下列哪种? (A) A. 17D
- 44 .仅次于疟疾重要热带传染病是哪种疾病? (B) B.登革热
- 45 .手足口病好发于几岁年龄组小朋友? (C) C. W5 岁
- 46 .国内自主研发手足口病疫苗重要防止哪种病原体感染? (D) D. EV71
- 47 .国内兰州生物生产口服轮状病毒疫苗 (LLR) 免疫程序为 (C) C. 2 月龄-3 岁健康婴幼儿每年口服 1 次

- 48 .关于肺炎链球菌及肺炎疫苗，如下说法错误是（C） C. 2岁如下小朋友接种 PPV23 后能产生足够抗体
- 49 .下列接种办法对的有（B） B. 口服脊灰糖丸
- 50 .关于甲肝，如下说法对的有（C） C.分为显性感染、亚临床感染和隐性感染
- 51 .疫苗按性质分类，可分为（B） B.灭活疫苗、减毒活疫苗、亚单位疫苗、核酸疫苗
- 52 .依照当前免疫程序，下列属于二类代替疫苗是：（D） D. A+C 群流脑结合疫苗、乙脑灭活疫苗、五联疫苗
- 53 .灭活疫苗超过（B）时间未用完，应将疫苗废弃。 B. 1小时
- 54 .哪种疫苗需皮下注射（D） D.流脑疫苗
- 55 .百白破疫苗涉及（A） A.百日咳灭活菌苗、白喉类毒素和破伤风类毒素
- 56 .下列属于减毒活疫苗是（A） A.卡介苗
- 57 .当前，（D）疾病当前尚无疫苗可防止。 D.丙肝
- 58 .疫苗领发用登记簿保存至超过疫苗有效期（B）年 B. 2
- 59 .人类历史上第一支疫苗为（B） B.牛痘疫苗
- 60 .接种减毒活疫苗后多久才干使用免疫球蛋白（B） B. 2周
- 61 .下列说法错误是（C） C.卡介苗和乙肝疫苗首针及时都是指出生后一种月内接种
- 62 .如下哪种疫苗是减毒活疫苗（A） A.麻疹
- 63 .一类疫苗需要在最小外包装明显位置标明“免费”字样以及“__”专用标记。（C） C.免疫规划
- 64 .关于疫苗外观质量，下列说法对的是：（D） D.无标签或标签不清时不得使用
- 65 .领取或分发疫苗时要遵循如下哪种原则？（A） A. “先短效期、后长效期”，以及先产先出、先进先出、近效期先出原则，有筹划地分发
- 66 .关于疫苗储存与运送基本规定，如下哪项描述是错误（B）。 B.疫苗收货、验收、在库检查等记录应保存至超过疫苗有效期 1 年备查
- 67 .如下不属于国家扩大免疫规划规定对重点地区重点人群应急接种一类疫苗是（D） D.鼠疫疫苗
- 68 .江苏省扩大小朋友免疫规划疫苗一共____种疫苗防止____种疾病。（A） A. 11 12
- 69 .两减毒活疫苗之间间隔至少一天。（B） B. 28
- 70 .当针对流脑疫情开展应急接种时，选取何种流脑疫苗？（D） D.应依照引起疫情菌群和流行病学特性，选取相应种类流脑疫苗
- 71 .《国家免疫规划疫苗小朋友免疫程序及阐明（）》规定，注射免疫球蛋白后至少需间隔一月才干接种含麻疹成分减毒活疫苗，接种含麻疹成分减毒活疫苗一周后才干使用免疫球蛋白。（C） C.3

- 72 .确有多余疫苗，应在失效前提前 ___ 个月向上级部门报告，以便调剂使用。（C） C. 3
- 73 .《疫苗流通和防止接种管理条例》最新修订并于何时发布？（ D ） D. 4月 23 日
- 74 .国内于一年将乙肝疫苗纳入免疫规划。（C） C.
- 75 .如下说法对的是（C） C.注射疫苗是积极免疫
- 76 .疫苗免疫成功率是指（B） B.接种某疫苗后血清抗体阳性人数或三 4 倍增长人数占接种该苗人数比例
- 77 .冰箱内储存疫苗要摆放整洁，疫苗与箱壁、疫苗与疫苗之间要留有 cm 间隙，并按照一和 摆
放。（B） B. 1-2 品名和有效期
- 78 .关于疫苗储存与运送基本规定，如下哪项描述是对的（C）。C.应采用自动温度记录仪对普通冷库、
低温冷库进行温度记录
- 79 .冷链是免疫规划工作重要内容，如下关于冰箱使用，哪项是不对的（B）。B.每周检查冷冻室结霜状
况，如霜厚三 0.4cm, 应及时化霜。
- 80 .每（B）检查冷冻室结霜状况，如霜厚三 0.4cm 及时化霜。 B.周
- 81 .关于疫苗冷藏保存描述错误是（D） D.条件容许时尽量更低温度
- 82 .防止和控制麻疹最有效手段是（B）。B.接种麻疹类疫苗
- 83 .高温导致一，使其构造变化，导致浮现汇集及脱酰胺基作用，分解后因其构造受到损害，减少药效。
（D） D.蛋白质降解
- 84 .疫苗在保存、运送和使用各个环节需要持续保冷，这一保冷系统称为（D） D.疫苗冷链系统
- 85 .贮藏温度为-20℃疫苗为？（ B ） B.脊髓灰质炎减毒活疫苗
- 86 .存储疫苗冰箱每日（涉及节假日）应测温（D）次 D.上、下午各一次，间隔 6 小时
- 87 .下列各项，哪一项不是冷链构成某些？（ A ） A.人员
- 88 .冷链设备涉及如下哪些？（ D ） D.冷藏车、冷库、冰箱、冷藏箱、冷藏包、冰排
- 89 .使用冰衬冰箱储存疫苗时，注意应将卡介苗、脊灰疫苗和麻疹疫苗存储在，并将百白破疫苗、白破 疫
苗和乙肝疫苗放在接近冰箱一，不可将冷藏保存疫苗放在距冰箱底部 15cm 内地方，以免冻结。（C）
C.底部顶部
- 90 .疫苗稀释液使用时温度应为多少？（ D ） D. 2-8℃
- 91 .应采用温度计对冰箱（涉及普通冰箱、冰衬冰箱、低温冰箱）进行温度监测。温度计应放置在普通冰
箱 冷藏室及冷冻室（B）位置。B.中间
- 92 .检查百白破疫苗、乙肝疫苗与否冻结办法为：将被检和对照正常疫苗安甌同步摇匀后静止竖立，如被
检 疫苗在短时间（C）分钟内与对照疫苗相比浮现分层现象，且上层液体较清，即可判断被检疫苗冻结。

C. 5 ~10

93 .具备冷藏条件乡级疫苗储藏普通不超过多长时间？（ A ） A. 1 个月

94 .关于疫苗冷藏保存描述对的是（ B ） B.类毒素疫苗不能冷冻，因其冷冻后疫苗中类毒素解离成毒素，增长疫苗接种反映

95 .冰箱贮存疫苗最大容量普通应为冰箱容积多少？（ A ） A. 1/2

96 .在室温下储存稀释液，应先置于 2-8℃冷藏（ D ）小时后再使用。 D. 4 小时

97 .使用冷藏箱和冷藏包应注意，错误是：（ C ） C.对冷冻敏感疫苗可以使用纸板或纸隔开冰排。

98 .乙肝疫苗不主张臀部注射，重要因素是：（ D ） D.臀部脂肪丰富，妨碍疫苗吸取。

99 .对局部红肿较重防止接种普通反映，可用清洁毛巾热敷，但如下哪种疫苗接种除外？

（ C ） C.卡介苗

100 .卡介苗淋巴结反映最佳发部位是（ A ） A.接种同侧腋下淋巴结

101 .关于卡介苗接种下述哪项是对的（ B ） B.使人产生免疫力同步也产生变态反映

102 .小朋友出生后超过 3 月龄需做有关皮试才干接种疫苗是（ C ） C.卡介苗

103 .小明 4 月 5 日出生，出生当天接种第一剂乙肝疫苗，当年 9 月 10 日接种第二剂乙肝疫苗，下列接种第三剂乙肝疫苗最适当日期是：（ C ） C. 11 月 10 日

104 .乙肝疫苗免疫成功阳性鉴定原则为（ A ） A.抗-HBsN10mIU/ml

105 .乙肝疫苗免疫程序” 0， 1， 6” 方案中，“ 0” 是指新生儿出生后（ B ） B. 24 小时内

106 .卡介苗接种部位、途径和剂量是（ B ） B.上臂三角肌中部皮内注射 0.1 毫升

107 .接种乙肝疫苗错误是（ D ） D.可以接种臀部。

108 .皮内注射疫苗是：（ ） A.卡介苗

109 .乙肝免疫球蛋白重要阻断母婴传播中哪一种环节（ B ） B.产程传播

110 .防止乙肝最有效办法（ C ） C.接种乙肝疫苗

111 .江苏省小朋友免疫接种程序规定，卡介苗应当在：（ A ） A.小朋友出生时接种

112 .脊髓灰质炎普通感染（ C ） 如下小儿？ C. 5 岁

113 .接种率可靠性评价惯用办法涉及？（ D ）

A.图表法

B.差值（ D ）评价法

C.比值（ R ）评价法

D.以上都是

114 .防止接种前医生应询问孩子身体健康状况及既往免疫状况，其中不涉及（ B ） B.孩子与否上学；

115 .受种者在接种后应当留在接种现场观测（ D ）分钟，如浮现防止接种异常反映，及时解决和报告。 D. 30

分钟

116 .在传染病防止工作中，国家实行制度是（C） C.有筹划防止接种

117 .接种麻疹疫苗后产生对麻疹抵抗力，这反映了（人）A.抗原特异性

118 .属于普通反映中度反映是（A）？ A.局部反映红肿直径大小 1.5~3.0cm, 发热（腋温）37.6~38.4。

119 .类毒素是（C） C.与外毒素具备相似抗原性但没有毒性

120 .下列那种是被动免疫生物制品（D） D,破伤风抗毒素

121 .下列哪种接种方式有误（A） A.第二针百白破疫苗接种与第一针百白破疫苗接种时间间隔 14 天

122 .下列接种办法错误是（B） B. A+C 群流脑多糖疫苗肌肉注射

123 .下列说法错误是（A） A.接种疫苗后浮现过敏性皮疹属于普通反映。

124 .接种率监测涉及（D） A.被动监测——报告接种率，积极监测——调查接种率 C.接种率评价

D. A+C

125 .对于防止接种证使用，下列说法错误是（B） B.如果小朋友接种时没有携带接种证，可以采用先接种、后补记录便民办法。

126 .如下哪种疫苗针对传染病疑似或确诊病例，需实行积极检测和“零”报病例报告制度？（B） B.

AFP

127 .AFP 汇集性临床符合病例是指（A） A.同一县（区）或相邻县（区）发现 2 例或 2 例以上临床符合病例，发病时间间隔不满 2 个月。

128 .在同一学校、幼儿园、自然村寨、社区、建筑工地、厂矿等集体单位 J 天内发生一例及以上麻疹病例，属于麻疹暴发疫情。（B） B. 102

129 .评价常规报告接种率可靠性时，惯用比值（R）评价法中，R 值不可信是指（D） D. R<0.90

130 .各级各类医疗机构发现流脑疑似病例后，尽快采集病人脑脊液、血液标本，并及时转送。对样品转送过程中温度规定是（D） D. 20-36℃

131 .盛放医疗废弃物容器不应当装得太满，只可以达到总容量（B） B. 2/3

132 .下列属防止接种普通反映强反映是？（B） B.红肿范畴三 3cm/体温 N38.6C

133 .关于疑似防止接种异常反映报告内容描述对的为？（D） D.怀疑与防止接种关于不明因素死亡、群体性反映、公众高度关注事件需要 2 小时内逐级上报

134 .江苏省现行规定 AEFI 报告率是多少？（C） C. 0.05%

135 .如下哪种情形属于防止接种异常反映（A）

禁忌等状况，接种后受种者原有疾病急性复发和影响生理过程

C.是指受种者原患有慢性疾病，在防止接种后及时引起加重或急性复发

D.以上都是

152 .如下哪种情形属于防止接种异常反映：（D）

D.血管性水肿

153 .因接种第二类疫苗引起防止接种异常反映需要对受种者予以补偿，补偿费用由哪方承担。（A）

A.有关疫苗生产厂家

154 .因接种第一类疫苗引起防止接种异常反映需要对受种者予以补偿，补偿费用（C）部门来承担。

C.省级人民政府财政部门在防止接种工作经费中安排

155 .防止接种异常反映里 Arthus 反映属于如下哪种超敏反映？（C）

C. 111 型

156 .对调查诊断结论有争议时，哪些单位可申请鉴定启动异常反映鉴定程序？（D）

A. 受种方

B . 接种单位

C 疫苗生产公司

D. 以上都是

157 .一名小朋友接种 A 群流脑疫苗后第二天接种部位浮现红肿瘙痒，有灼热感，局部皮肤呈淡红色，紧张发亮，压之不痛，无其他明显不适。初步判断为下面哪种反映（C）

C.血管神经性水肿

158 .某接种单位记录本辖区某疫苗常规接种率，1 月份应种 100 人次，实种 85 人次；2 月份应种 110 人次，实种 100 人次；3 月份应种 105 人次，实种 100 人次。请问该接种单位 1-3 月份此疫苗合计接种率计算公式 对的是？（B）

B. $(85+100+100) / (85+100+105) * 100\%$

159 .评价人群疫苗接种效果最核心指标是下列哪项？（B）

B.保护率

160 .典型麻疹最先浮现皮疹部位是？（C）

C.耳后、发际

161 .麻疹病人密切接触者应医学观察为多少天？①

D. 21

162.小朋友口服脊髓灰质炎减毒活疫苗后（B）时间内不能喂母乳

B. 30 分钟

163.小朋友免疫规划疫苗基本免疫规定在（C）月龄内完毕。

C. 12

164.防止接种时，取 75%乙醇棉球或用无菌棉签蘸 75%乙醇，对接种部位皮肤进行消毒，涂擦直径须不不大于等于（C）cm, 待凉干后及时接种。

C. 5

165.麻疹疫苗安瓿启动后，超过（B）时间未用完则废弃。

B. 30 分钟

166 .婴幼儿在口服脊髓灰质炎疫苗前，工作人员需特别注意孩子有无如下哪种症状？（D）

D.肛周脓肿

167 .接种前严格执行“三查七对”制度，其中七对是指（A）

A.核对受种者姓名、年龄（出生日期）、疫苗品种、规格、剂量、接种部位、接种途径。

168 .自毁型注射器使用环节，如下哪项是对的？（D）

D.检查、取针、吸液、排气、注射、毁型。

169 .关于防止接种前准备工作顺序，下列说法对的是（B）

B.拟定接种对象、告知接种对象、领取准备疫苗、准备接种器材、准备药物器械、接种场合准备。

170 .防止接种服务分类涉及哪些？（D）

D.常规接种、暂时接种、群体性防止接种、应急接种

171 .下列说法对的是（C）

C.接受免疫规划疫苗时应查看与否则有“免费”字样以及“免疫规划”专用标记

172 .防止接种场合规定公示内容不涉及：（D）

D.接种单位资质证明

173 .免疫接种皮肤消毒方式为（B）

A.上下涂擦 B.螺旋式由内向外 C.螺旋式由外向内

D.不规则涂擦

174 .下列说法错误是（D）

D.第二类疫苗采供实行市场化运作，疫苗厂商可直接向各级疾病预防控制机构或接种点销售疫苗

175 .下列哪个也许属于防止接种异常反映？（D）

D.接种甲肝灭活疫苗后浮现过敏性皮疹

176 .下列属于皮下注射疫苗有哪些？（C）

C.麻风、减毒乙脑

177 .下列属于肌肉注射疫苗有哪些？（D）

D.甲肝灭活、白破疫苗

178 .当前使用脊髓灰质炎减毒活疫苗（液体）规格是（D）

D. 10 人份/支

179 .江苏省免疫程序规定，满 18 月龄需优先补种什么疫苗？（A）

A.麻腮风

180 .当前在我省可以接种宫颈癌疫苗可以防止哪些型别人乳头瘤病毒感染？（B）

B.16， 18

二、多选题

1.如下哪些是乙肝疫苗接种禁忌症（AB）。

A.对疫苗组分有严重变态反映或此前接种后发生严重变态反映者

B.中-重度急性疾病者尚未恢复

2 .如下哪些是接种乙肝疫苗后也许发生反映（ABC），普通不需特殊解决。

A.接种部位红肿热痛

B.低热

C.疲乏

3 .关于卡介苗防止接种，下列说法对的是（AC）。

A.接种 BCG 注射器应专用，禁止用作其他注射

C. BCG 应避光冷藏保存

4 .发现疑似麻疹病人，下列说法对的是（ACD）

A.及时向上级部门报告

C.对患者居住地附近开展麻疹疫苗应急接种

D.对患者居住地社区开展宣教

5 .关于江苏省规范化防止接种门诊设立规定，如下说法对的有哪些？（ACD）

A.防止接种门诊每个接种工作日门诊总量不超过 200 针次或每个接种人员半日接种量不超过 40 针次。

C.门诊日时需配备询问诊筛查专职医生和异常反映处置医生。

D.需经县级卫生行政部门审核认定。

6 .如下不属于当前江苏省扩大免疫规划使用一类疫苗范畴是 (BD)

B. HIB 疫苗

D.水痘减毒活疫苗

7 .麻疹常用并发症有 (ACD)

A.肺炎

C.脑炎

D.中耳炎

8 .流行性乙型脑炎临床特性有 (ABCD)

A.头痛、恶心、呕吐 B.高热 C.呼吸衰竭 D.抽搐

9 .关于卡介苗，下列说法对的是 (BD)

B.卡介苗可防止粟粒性肺结核和结核性脑膜炎

D.卡介苗应当皮内注射

10 .下列关于疫苗免疫程序说法对的是 (ABD)

A.百白破 3、4、5 月龄和 18 月龄

B.麻腮风 18 月龄

D.麻疹风疹疫苗紧缺时可用麻疹疫苗代替

11 .下列关于脊髓灰质炎说法对的是 (AB)

A.当前，江苏省脊灰免疫程序中首剂脊灰疫苗为灭活疫苗

B.患有肛周脓肿疾病小朋友禁忌服用 OPV

12 .我省免疫程序规定满 18 月龄才干接种疫苗有： (AB)

A.麻腮风疫苗

B.甲肝疫苗

13 .接种卡介苗时应做到如下哪些规定？ (ABC)

A.卡介苗保存应有专人负责，不能与其他疫苗、药物混放

B.卡介苗注射器和针头应专用，皮内接种剂量要精确，避免注射过深至皮下或肌肉

C.冻干卡介苗稀释时应注意使之完全溶化，使用时需摇匀，吸入注射器后亦应注意随时摇匀

14 .关于麻疹疫苗对的描述有： (ACD)

A.麻疹疫苗是减毒活疫苗

C.在上臂三角肌处附着皮肤用 75%乙醇消毒，待晾干后及时皮下注射 0.5ml

D.采用皮下注射方式，当注射器针头进入皮下时，回抽无血后方可注入疫苗

15 .下列哪项是麻疹疫苗设定在 8 月龄接种因素 (ABD)

- A. 8月龄前婴儿体内保存有相称数量母体麻疹抗体，可以保护小朋友
- B. 8月龄前婴儿免疫系统不成熟，对麻疹疫苗免疫反映性差
- D. 8月龄前婴儿如果接种麻疹疫苗，疫苗抗原易被母传抗体中和，失去疫苗作用

16 .如下哪些疫苗是纳入国家免疫规划疫苗（AD）

A.卡介苗和乙肝

D.百白破和甲肝

17 .一位刚满1周岁小朋友，已接种过脊灰苗3次、流脑苗2次、百白破3次、卡介苗1次、乙肝疫苗2次，接种人员应予以接种什么疫苗？（AC）

A.麻苗、乙脑疫苗 C.乙肝疫苗

18 .当前江苏省免疫规划程序规定流脑疫苗为（AC）

A. A 群流脑疫苗

C. A+C 群流脑多糖疫苗

19.如下

哪些疫苗应存储在 2~8℃ 储存环境（ABD）

A.甲肝疫苗

B.乙肝疫苗

D.无细胞百白破疫苗

20 .关于麻疹病例监测，如下说法对的有哪些？（ABC）

A.麻疹疑似病例为具备发热、出疹，并伴有咳嗽、卡她性鼻炎或结膜炎症状之一者。

B.近一种月未接种含麻疹类疫苗而血清中监测到 IgM 阳性麻疹疑似病例为实验室诊断病例。

C.麻疹疑似病例血标本检测麻疹 IgM 抗体阴性、风疹 IgM 抗体阳性，或经实验室确诊为其他发热出疹性疾病者为排除病例。

21 .水痘突破病例涉及哪些方面？（ACD）

A.有水痘疫苗接种史

C.血清抗体阳转

D.在接种疫苗 >42 天发生野生型水痘

22 .关于新修订《疫苗流通和防止接种管理条例》，如下说法对的有（ABCD）

A.国家勉励建立通过商业保险等形式对防止接种异常反映受种者予以补偿机制。

B.疫苗储存、运送全过程应当始终处在规定温度环境，不得脱离冷链，并定期监测、记录温度。

C.采购二类疫苗，应当通过省级公共资源交易平台进行。

D.接种单位接受第一类疫苗或者购进第二类疫苗，应当索要疫苗储存、运送全过程温度监测记录。

23 .当前，国家扩大免疫规划程序规定重点地区重点人群使用疫苗有哪几种？（ABD）

A.钩体疫苗

B.炭疽疫苗

D.出血热疫苗

24 .霍乱弧菌有 200 各种血清群，仅有哪几种血清群可引起流行？（AC）

A. O1 群

C. O139 群

25 .当前国内使用 FS 疫苗可防止什么型别菌痢导致感染？（BD）

B.福氏志贺菌

D.宋内志贺菌

26 .可选取大腿前外侧肌接种疫苗有哪些？（ABC）

A.五联疫苗

B.脊灰灭活疫苗

C. HIB 疫苗

27 .狂犬病发病呈现如下哪“三多”现象？（ABD）

A.农村地区发病多 B.男性发病多

D. 15 岁如下小朋友和 50 岁以上人群发病多

28 .戊肝传播途径有哪些？（ABCD）

A.粪-口传播 B.动物源性传播

C.血液传播 D.垂直传播

29 .HPV（人乳头瘤病毒）有 150 各种亚型，在鳞状细胞宫颈癌中，最常用基因型是哪几型？（ABCD）

A. 16 型 B. 18 型 C. 45 型 D. 56 型

30 .当前国际市场上销售 HPV（人乳头瘤病毒）疫苗均具有 HPV 哪两种型别？（CD）

C. HPV16 D. HPV18

31 .人体感染 Hib 后可浮现哪几类临床体现（ABCD）

A.无症状携带 B.呼吸道黏膜感染

C.侵袭性疾病 D.上呼吸道寄居

32 .登革热重要传播媒介是（BC）

B.埃及伊蚊 C.白蚊伊蚊

33 .登革热流行特性是（ABCD）

A.输入性 B.地方性

C.周期性 D.季节性

34 .引起手足口病最常用病原体为（BD）

B. EV71 D. Cox16

35 .当前世界范畴内正在进行研究癌症疫苗重要涉及哪些？（ABCD）

A.膀胱癌疫苗 B.宫颈癌疫苗 C.结肠癌疫苗 D.黑色素瘤疫苗

36 .关于 OPV 和 IPV，下列说法错误是（BC）

B.当前江苏省脊灰免疫程序为 IPV+IPV+OPV+OPV

C.患急性传染病、免疫缺陷症、接受免疫抑制剂治疗小朋友可以接种 OPV

37.急性弛缓性麻痹病例涉及哪些（ABC）

A.神经丛炎

B.肉毒中毒

C.肌病（涉及全身型重症肌无力、中毒性、因素不明性肌病）

38 .关于灭活疫苗，下列说法对的是（AC）

A.疫苗启动后应立即使用，如需放置，应置 2~8℃于 1h 内用完

C.乙肝疫苗冻结后禁止使用

39 .关于乙型脑炎细胞培养减毒活疫苗（JEV-L）说法对的是（ABC）

A. JEV-L 与其他灭活疫苗可以同步接种

B. JEV-L 与其他减毒活疫苗可以在同一天接种

C. JEV-L 与其他减毒活疫苗如未在同一天接种，必要间隔 28d

40 .甲型病毒性肝炎（HAV）常用传播途径有（ABC）

A.粪-口途径传播

B.经水传播

C.接触传播

41 .减毒活疫苗特点（ABCD）

A.在机体内可以复制增殖，免疫作用时间长

B.可以形成局部和全身免疫

C.在体内有毒力返祖潜在危险

D.免疫缺陷患者可以引起严重或致命反映

42 .关于流行性乙型脑炎说法对的是（BD）

B.重要经蚊虫传播

D.乙脑减毒活疫苗应于 8 月龄接种第一针次，24 月龄接种第二针次

43 .下列说法对的是：（BD）

B.接种百白破疫苗防止百日咳、白喉、破伤风

D.疫苗，是指为了防止、控制传染病发生、流行，用于机体防止接种疫苗类防止性生物制品

44 .下列哪些因素会影响疫苗接种效果？（ABCD）

A.免疫起始月龄 B.接种间隔

C.接种剂量 D.接种途径

45 .下列哪些疫苗已经在全球范畴内获准上市？（ACD）

A.黄热病疫苗 C.伤寒疫苗 D.带状疱疹疫苗

46 .关于流感疫苗、b 型流感嗜血杆菌疫苗，下列说法对的是（ABD）

- A. b 型流感嗜血杆菌最初被误以为是引起流感病原体。
- B.流感需每年接种因素是流感病毒血凝素和神经氨酸酶抗原性会发生变异。
- D.有卵清蛋白过敏史人不应当接种鸡胚来源流感疫苗。

47 .关于肌肉注射疫苗，下面技术操作对的是？（ABD）

- A.用于百白破疫苗、白破疫苗、乙肝疫苗、甲肝灭活
- B.接种部位为上臂外侧三角肌中部
- D.注射完毕，迅速后迅速拔出针头，局部可用消毒干棉球稍加按压针眼部位

48 .如下疫苗接种途径属于皮下注射有哪些（BC）

8. A+C 群流脑多糖疫苗

C.麻腮风疫苗

49 .如下关于疫苗规格，论述对的是（BD）

- B.卡介苗每次接种剂量为 0.1ml
- D. A 群流脑多糖疫苗每次接种 0.5ml

50.下列属于不安全接种操作是？（ABCD）

- A. 一次性注射器使用后将针头帽盖上
- B. 1 个接种室共用 1 个盛放医疗废弃物防刺容器
- C.盛放医疗废弃物容器装到容量 3/4
- D.拿着使用后注射器在接种室内走动

51 .接种单位有下列情形之一，由所在地县级人民政府卫生主管部门责令改正，予以警告。（ABCD）

- A.未依照规定建立并保存真实、完整疫苗接受或者购进记录
- B.未在其接种场合明显位置公示第一类疫苗品种和接种办法
- C.医疗卫生人员在接种前，未依照本条例规定告知、询问受种者或者其监护人关于状况
- D.接受或者购进疫苗时未依照规定索要温度监测记录，接受、购进不符合规定疫苗，或者未依照规定报告

52 .下列哪些疫苗对冷冻敏感？（ABD）

- A.百白破疫苗 B.白破疫苗 D.乙肝疫苗

53 .在使用冷藏箱（包）运送疫苗时，下列哪些疫苗应放置在冷藏箱底层（AB）

- A.麻疹疫苗 B.脊灰疫苗

54 .《防止接种工作规范》疫苗使用规定，未完毕基本免疫 14 岁小朋友应尽

早进行补种。在补种时掌握如下原则：（ACD）

A.未接种国家免疫规划疫苗小朋友，按照免疫程序进行补种。

C.未完毕百白破疫苗免疫程序 3 月龄~5 岁小朋友使用百白破疫苗；6~11 岁小朋友使用白破疫苗；12 岁及以上小朋友使用成人及青少年用白破疫苗。

D.未完毕 2 剂次含麻疹成分疫苗接种（含强化免疫等）小朋友，应补种完毕 2 剂次

55 .关于小朋友防止接种证、信息保管，对的是？（ABD）

A.小朋友接种证由小朋友监护人保管

B.小朋友防止接种信息由接种单位保管

D.小朋友防止接种证遗失应到接种单位办理补证

56 .接种后剩余疫苗解决，对的是？（BD）

B.废弃已启动安甌疫苗

D.对未启动合格剩余疫苗，于有效期内下次接种时一方面使用

57 .疫苗储存、运送管理规范由 制定。（CD）

C.国务院卫生主管部门

D.国务院药物监督管理部门

58 .关于肺炎球菌疾病，如下说法对的有（ABD）

A.侵入性肺炎球菌疾病较常用于幼童及老年人

B. 13 价肺炎链球菌疫苗是当前保护率较高婴幼儿肺炎球菌疫苗

D.接种肺炎球菌疫苗是防止肺炎球菌疾病最有效办法之一

59.第一类疫苗涉及。（ABD）

A.国家免疫规划拟定疫苗

B.省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增长疫苗

D.县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织应急接种或者群体性防止接种所使用疫苗

60 .如下属于江苏省扩大免疫规划使用一类疫苗是（ABC）

A.麻风减毒活疫苗

B. A+C 群流脑多糖疫苗

C.无细胞百白破疫苗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/826133243121010104>