

2024年安徽黄山市歙县人民医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、男孩，1岁，确诊为先天性甲状腺功能减低症，应用L-甲状腺素钠治疗，剂量为每日50 μ g。近几天患儿烦躁不安、多汗、腹泻，此时应（ ）。

- A. 先密切观察不作特殊处理
- B. 改用甲状腺干粉片
- C. 立即停药
- D. 减少剂量
- E. 增加剂量

【正确答案】

D

【答案解析】

先天性甲低治疗过程中，烦躁不安、多汗、消瘦、腹痛和腹泻均提示甲状腺素用量过大，应予减少剂量。

2、人体内五类免疫球蛋白不包括（ ）。

- A. 免疫球蛋白A
- B. 免疫球蛋白C
- C. 免疫球蛋白G
- D. 免疫球蛋白M
- E. 免疫球蛋白E

【正确答案】

B

【答案解析】

具有抗体活性的免疫球蛋白，由B淋巴细胞产生，分别为免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白A（IgA）、免疫球蛋白M（IgM）、免疫球蛋白D（IgD）及免疫球蛋白E（IgE）五类。代表了体内的体液免疫系统。

3、关于子宫脱垂的描述，以下哪项错误？（ ）

- A. 一旦诊断子宫脱垂均应手术治疗
- B. 子宫脱垂常合并阴道前后壁膨出
- C. 子宫颈脱在阴道口以外，但子宫体在阴道内者为子宫脱垂II度轻
- D. 子宫脱垂应与子宫内翻、黏膜下肌瘤等鉴别
- E. 产后禁止参加重体力劳动是预防子宫脱垂的关键

【正确答案】

A

【答案解析】

子宫脱垂应与子宫内翻、黏膜下肌瘤、膀胱膨出、阴道壁囊肿等鉴别。避免滞产和第二产程延长，产后禁止参加重体力劳动是预防子宫脱垂的关键。子宫脱垂的治疗包括支持疗法和手术治疗，II度以上的脱垂应手术治疗。

4、下列哪项不支持急性肾小球肾炎的诊断？（ ）

- A. 呈急性肾炎综合征
- B. 肾功能急剧转坏
- C. 早期出现少尿性急性肾衰竭
- D. 数周内进展至尿毒症
- E. 肾小球基底膜出现“双轨征”改变

『正确答案』

E

『答案解析』

急性肾小球肾炎临床是在急性肾炎综合征（血尿、蛋白尿、水肿、高血压）基础上，在短期内出现少尿、无尿、肾功能急剧恶化，短期内达到尿毒症（血Cr>707 μ mol/L）的临床综合征。病理特征为>50%的肾小球新月体形成。E项，基底膜“双轨征”改变见于系膜毛细血管性肾小球肾炎。

5、小儿体重前半年每月平均增长（ ）。

- A. 300~400g
- B. 200~300g
- C. 400~500g
- D. 500~600g
- E. 600~800g

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

6、只有在骨肉瘤X线片中可见的现象是（ ）。

- A. 发生于骨端
- B. 有完整囊壁
- C. 与正常组织界限清楚
- D. 可见膨胀性生长
- E. 可见“日光照射”现象

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

7、关于临终关怀符合伦理学的原因，说法错误的是（ ）。

- A. 可以减轻家庭的经济负担
- B. 提高病人的生命质量
- C. 可以缩短病人的痛苦的生命时限
- D. 客观上可以节约卫生资源
- E. 为了人类文明的进步

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

8、注射大剂量Ag形成免疫耐受是因为（ ）。

- A. Ab过剩，多余的Ag中和了抗体
- B. Ab形成速度慢，而代谢速度过快所致
- C. 产生无功能抗体
- D. 浆细胞麻痹
- E. B细胞分化增殖受到抑制

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

9、胆汁溶菌试验可用来鉴别（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/826225045235010052>