

医路通行教育护资 护士执业资格证考试 A1 题型

1、在某急诊大厅，有很多候诊的患者。分诊护士需要安排提前就诊的患者是——[单选题]

- A 大出血休克患者
- B 腹部剧痛患者
- C 呼吸困难患者
- D 高热患者
- E 以上全是

正确答案：E

2、下列输血的不良反应中，处理不妥的一项是——[单选题]

- A 发热反应：给予抗过敏药物或肾上腺皮质激素
- B 过敏反应：给予 0.1%盐酸肾上腺素或异丙嗪
- C 溶血反应：口服或静脉注射氢氧化钠
- D 枸橼酸钠中毒：给予 10%葡萄糖酸钙或氯化钙 10ml 静脉注射
- E 急性肺水肿：给予扩血管药、强心剂、利尿剂及乙醇湿化吸氧

正确答案：C

3、低钾血症者补钾应遵循的原则，描述正确的是——[单选题]

- A 尽量口服 10%氯化钾溶液，不能口服者可静脉推注
- B 补钾量为氯化钾 6~8g/d
- C 补钾速度不宜超过 40mmol/h
- D 尿量超过 40ml/h 方可补钾
- E 补液中钾浓度不宜超过 20mmol/L

正确答案：D

4、肥厚型心肌病的主要病理改变是——[单选题]

- A 心肌显著肥厚、心腔缩小
- B 非特异性心肌细胞肥大
- C 心肌纤维化
- D 心腔扩张
- E 心腔室壁变薄

正确答案：A

5、心脏骤停最容易发生不可逆转损害的器官是——[单选题]

- A 肺
- B 凝血系统
- C 胃肠道

D 脑

E 脾

正确答案：D

6、医院的种类划分中，不属于按所有制划分的一项是——[单选题]

A 全民所有制医院

B 个体所有制医院

C 军队医院

D 中日合资医院

E 股份制医院

正确答案：C

7、护士对某高热病人给予冰帽降温，是利用散热方式中的——[单选题]

A 传导

B 辐射

C 对流

D 蒸发

E 转移

正确答案：A

8、心律失常患者应用利多卡因静脉注射不可过快，以下不良反应不包括——[单选题]

A 传导阻滞

B 低血压

C 抽搐

D 心脏停搏

E 呼吸深快

正确答案：E

9、梗阻性肥厚型心肌病病人禁用——[单选题]

A 抗心律失常药

B 钙拮抗剂

C β 受体阻滞剂

D 硝酸酯类药

E 手术治疗

正确答案：D

10、肝性脑病患者以下哪种情况应慎用谷氨酸钾——[单选题]

A 腹水

- B 肝性脑病晚期
- C 功能性肾衰竭
- D 伴继发感染
- E 稀释性低钠血症

正确答案：C

11、直肠肛管周围脓肿病人的确诊检查是——[单选题]

- A 直肠指检
- B 血常规
- C B超
- D 诊断性穿刺
- E 免疫学检查

正确答案：D

12、引起上消化道出血常见的疾病除外——[单选题]

- A 胃癌
- B 胃溃疡
- C 十二指肠溃疡
- D 急性糜烂性胃炎
- E 急性胰腺炎

正确答案：E

13、适用于肉芽水肿创面湿敷的溶液是——[单选题]

- A 碘伏
- B 0.02%~0.01%高锰酸钾
- C 优琐（含氯石灰硼酸溶液）
- D 0.02%~0.05%氯己定
- E 3%~5%氯化钠

正确答案：E

14、导致产后出血的原因最常见的是——[单选题]

- A 胎盘粘连
- B 宫缩乏力
- C 软产道损伤
- D 胎盘剥离不全
- E 凝血功能障碍

正确答案：B

15、新生儿黄疸最主要的护理问题——[单选题]

- A 营养失调
- B 胆红素脑病
- C 持续性高热
- D 活动无耐力
- E 发热

正确答案：B

16、炎症性病变所致的急腹症一般不会出现——[单选题]

- A 持续性腹痛
- B 体温升高、白细胞计数升高
- C 恶心、呕吐
- D 固定压痛点
- E 肠鸣音亢进

正确答案：E

17、艾滋病的主要传播途径为——[单选题]

- A 性接触传播
- B 针头注射
- C 血源途径
- D 母婴传播
- E 人工授精

正确答案：A

18、急性蜂窝炎发生于口底，颌下或颈部可并发——[单选题]

- A 休克
- B 脓毒症
- C 海绵状静脉窦炎
- D 喉头水肿
- E 附近淋巴结炎

正确答案：D

19、前置胎盘病人的辅助检查中不主张应用的是——[单选题]

- A 产科检查
- B 超声波检查
- C 阴道检查
- D 腹部检查
- E 胎心检查

正确答案：C

20、新生儿暂时性低血糖的病因是下列哪项——[单选题]

- A 胰岛素瘤
- B 先天性垂体功能不全
- C 遗传代谢病
- D 新生儿败血症
- E 以上都不正确

正确答案：D

21、支气管扩张症的手术治疗指征是——[单选题]

- A 大出血不止
- B 大量脓痰
- C 全身情况较差，不能行体位引流
- D 病灶局限，内科治疗无效
- E 病灶广泛，内科治疗无效

正确答案：D

22、预防、医疗、保健机构发现艾滋病病毒感染者时，以下措施不正确的是——[单选题]

- A 身体约束
- B 留观
- C 给予宣教
- D 医学观察
- E 定期和不定期访视

正确答案：A

23、脓性指头炎切开引流最佳切口——[单选题]

- A 侧面横切口
- B 侧面纵切口
- C 掌面横切口
- D 掌面纵切口
- E 鱼口形切口

正确答案：B

24、对产褥期妇女进行护理时，哪种情况应特别注意无菌操作——[单选题]

- A 产后剖宫产，监测生命体征时
- B 产妇喂奶时
- C 产妇会阴无切口进行会阴冲洗时

D 产妇会阴切口水肿，硫酸镁湿热敷时

E 产后淋浴时

正确答案：D

25、关于急性肾小球肾炎的叙述，正确的是——[单选题]

A 女性多见

B 蛋白尿多见

C 镜下血尿少见

D 血压明显升高

E 常发生于感染的1周

正确答案：B

26、呼吸衰竭病人最早、最突出的表现是——[单选题]

A 发绀

B 呼吸困难

C 心率加快

D 血压下降

E 肝、肾功能损害

正确答案：B

27、流行性感动的确诊的主要依据是——[单选题]

A 发病季节

B 呼吸道症状轻微而全身中毒症状重

C 病毒分离

D 血凝抑制试验

E 影像学检查

正确答案：C

28、子宫内膜异位症病人使用达那唑治疗过程中，护士应向患者特别强调——[单选题]

A 清淡饮食

B 规范用药

C 卧床休息

D 多运动

E 监测血压

正确答案：B

29、下列关于嗜睡症治疗原则错误的是——[单选题]

A 消除诱发因素

- B 适当给予中枢兴奋药
- C 对症治疗
- D 白天安排工间短时小睡
- E 给予镇静催眠类药物

正确答案：E

30、骨盆骨折牵引通常最合适的时间为——[单选题]

- A 2~3 周
- B 4~5 周
- C 6~8 周
- D 9~10 周
- E 11~12 周

正确答案：C

31、导致肺心病发生的最根本原因是——[单选题]

- A 肺动脉高压
- B 缺氧
- C 二氧化碳潴留
- D 肺血管重构
- E 肺血管痉挛

正确答案：A

32、厌氧菌感染的脓液特点是——[单选题]

- A 灰白，无臭
- B 有特殊恶臭
- C 脓液稠厚，黄色无臭
- D 稀薄，淡红色
- E 绿色，有霉腥味

正确答案：B

33、双头位双胎，第一个胎儿娩出后的正确处理是——[单选题]

- A 应立即娩出胎盘
- B 肌注催产素防止产后出血
- C 第一个胎儿娩出后，立即断脐
- D 行内倒转立即牵出第二个胎儿
- E 立即行人工破膜

正确答案：C

34、护理新生儿颅内出血时正确的是——[单选题]

- A 不断吸痰以保持呼吸道通畅
- B 给高浓度吸氧以纠正缺氧
- C 保持安静避免声、光等刺激
- D 快速大量静脉输入新鲜血
- E 将患儿置于稍凉的环境中

正确答案：C

35、精神分裂症最多见的幻觉是——[单选题]

- A 视幻觉
- B 听幻觉
- C 触幻觉
- D 嗅幻觉
- E 本体幻觉

正确答案：B

36、护理质量管理的自我监控中最关键的层次是——[单选题]

- A 病区护士长层次
- B 总护士长层次
- C 护理部层次
- D 护士层次
- E 护士组长层次

正确答案：D

37、中医“五行”学说的基本概念是指——[单选题]

- A 风、寒、暑、湿、燥
- B 脑、髓、骨、脉、胆
- C 金、木、水、火、土
- D 心、肝、脾、肺、肾
- E 阴、阳、精、气、血

正确答案：C

38、学龄前期最长见的心理行为问题是——[单选题]

- A 违拗、发脾气
- B 吮拇指
- C 手淫、攻击性行为
- D 自杀
- E 上学的焦虑、恐惧

正确答案：C

39、围绝经期保健的主要目的是——[单选题]

- A 维护和促进围绝经期妇女的健康
- B 保护围绝经期妇女的合法权益
- C 提高围绝经期妇女的自我保健意识和生活质量
- D 促进我国卫生事业的发展
- E 提高围绝经期妇女的身体素质

正确答案：C

40、关于急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病脑脊液检查的特征，正确的是——[单选题]

- A 细胞数增高，糖降低
- B 蛋白增高，细胞数正常
- C 蛋白降低，细胞数增高
- D 细胞数增高，糖含量正常
- E 红细胞数减少，细菌培养阴性

正确答案：B

41、护士面部表情应根据不同的环境和需要而不同，下面讲述不妥的是——[单选题]

- A 面对临终患者，表情凝重
- B 面对新产妇，要对其表示祝贺
- C 对疼痛的患者应该微笑，以示鼓励
- D 对疾病缠身的患者表现出安慰
- E 在面对患者时表现真诚和友好

正确答案：C

42、在护理质量管理 PDCA 循环法中 C 代表——[单选题]

- A 计划
- B 检查
- C 循环
- D 实施
- E 处理

正确答案：B

43、下列关于五行相生与相克的说法错误的是——[单选题]

- A 木为水之子
- B 水为金之子
- C 金为木之所胜

土为水之所不胜
E 金为水之母
正确答案：C

44、预防接种中度反应是——[单选题]

- A 局部反应红肿直径的大小 2.6~5.0cm，发热（腋温）37.5~38.5℃
- B 局部反应红肿直径的大小 2.6~5.0cm，发热（腋温）37.0~38.5℃
- C 局部反应红肿直径的大小 1.6~5.0cm，发热（腋温）37.6~38.5℃
- D 局部反应红肿直径的大小 1.5~5.0cm，发热（腋温）37.0~38.5℃
- E 局部反应红肿直径的大小 2.6~5.0cm，发热（腋温）38.6℃以上

正确答案：A

45、诊断震颤麻痹最重要的依据是——[单选题]

- A 确切的病史及体征
- B 脑脊液检查
- C 血常规检查
- D 头部 MRI
- E 脑电图

正确答案：A

46、指导肺气肿患者作腹式呼吸锻炼时，下列哪项不正确——[单选题]

- A 取立位，吸气时尽力挺腹，胸部不动
- B 呼气时腹肌收缩，腹壁下陷，尽量将气呼出
- C 吸与呼时间比例为 2:1 或 3:1
- D 用鼻吸气，用口呼气，要求深吸缓呼，不可用力
- E 每日进行 2~3 次，每次 10~20 分钟，每分钟呼吸保持在 7~8 次

正确答案：C

47、急性乳腺炎最常见的病因是——[单选题]

- A 乳汁淤积
- B 雌激素分泌增加
- C 雄激素分泌增加
- D 卵巢内分泌功能失调
- E 性激素的改变与紊乱

正确答案：A

48、小儿长期应用泼尼松的副作用是——[单选题]

- A 药物依赖

- 体重不增
C 可抑制骨骼生长
D 过敏性增强
E 慢性出血
正确答案：C

49、类风湿关节炎缓解期最重要的护理措施是——[单选题]

- A 预防感染
B 避免疲劳
C 避免精神刺激
D 避免寒冷、潮湿
E 指导医疗体育锻炼
正确答案：E

50、最常见的恶性原发性骨肿瘤——[单选题]

- A 软骨肉瘤
B 骨肉瘤
C 纤维肉瘤
D 尤文肉瘤
E 骨髓瘤
正确答案：B

51、持续性枕后位的主要原因是——[单选题]

- A 中骨盆狭窄
B 胎头俯屈不良
C 胎儿相对过大
D 子宫收缩过弱
E 单纯扁平骨盆
正确答案：A

52、患者诊断为痢时，最可能出现下列哪项血常规检查结果——[单选题]

- A 嗜酸粒细胞增加
B 淋巴细胞计数增加
C 网织红细胞计数增加
D 中幼粒细胞计数增加
E 中性粒细胞比例增加
正确答案：E

、下列不是子宫脱垂病人的临床特点的是——[单选题]

- A 自觉外阴有块状物脱出
- B 尿潴留，常伴有张力性尿失禁
- C 腰骶部酸痛和下坠感
- D 常伴有月经失调
- E 不影响妊娠，可经阴道分娩

正确答案：D

54、类风湿关节炎常选用的治疗药物是——[单选题]

- A 泼尼松
- B 糖皮质激素
- C 阿司匹林
- D 紫杉醇
- E 环磷酰胺

正确答案：C

55、婴儿上呼吸道感染早期突发高热最易引起——[单选题]

- A 惊厥
- B 癫痫
- C 肺炎
- D 扁桃体炎
- E 病毒性脑炎

正确答案：A

56、慢性支气管炎急性发作的最常见原因是——[单选题]

- A 吸烟
- B 感染
- C 大气污染
- D 气温下降
- E 过敏

正确答案：B

57、晚期低钙血症最常见于——[单选题]

- A 母乳喂养小儿
- B 混合喂养小儿
- C 人工牛乳喂养足月儿
- D 早产儿
- E 小样儿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/827006011066006046>