

护理学(医学高级)-多器官功能障碍综合征

1、患者误输异型血后无尿 3 天，无休克，下列最有效的治疗是（ ）

- A. 输注地塞米松
- B. 输注速尿
- C. 输注碳酸氢钠
- D. 输注甘露醇
- E. 血液透析

2、ARDS 晚期表现中不正确的是（ ）

- A. 明显发绀
- B. 呼吸短促
- C. 血液 pH 增高
- D. 休克
- E. 动脉 PaCO₂ 增高

3、引起肾前性肾功能衰竭的病因是（ ）

- A. 挤压伤综合征
- B. 感染性休克
- C. 严重缺水
- D. 毒蛇咬伤
- E. 手术误扎双侧输尿管

4、患者男性，25岁，因严重挤压伤住院，第3天感头痛、头晕、全身水肿、呕吐，尿量每小时10ml，呈茶色，考虑为（ ）

- A. ARDS
- B. 急性肾衰竭
- C. 肺水肿
- D. MSOF
- E. 肺水肿

5、患者女性，25岁，体重50kg。因产后大出血而致急性肾衰竭，前一天尿量为300ml，呕吐量250ml，体温39℃。估计今天的补液量为（ ）

- A. 2000ml
- B. 1500ml
- C. 1250ml
- D. 1100ml
- E. 180ml

6、患者女性，38岁，因骨盆骨折，肝破裂，失血性休克入院。治疗中出现呼吸加快，呼吸窘迫，口唇发绀，双肺闻及湿啰音， $\text{PaO}_2 < 8.0 \text{kPa}$ 。有效处理为（ ）

- A. 高浓度口罩吸氧

B. 呼气终末负压通气

C. 人工呼吸

D. 使用呼吸兴奋剂

E. 呼气终末正压通气

7、患者男性，胸部损伤经治疗反而出现进行性呼吸困难，怀疑发生了急性呼吸窘迫综合征，下列对确诊无意义的检查是（ ）

A. 血常规

B. 动脉血氧分压

C. 呼吸功能监测

D. X 线胸片

E. 动脉 PaCO₂

8、患者男性，创伤后休克 25 小时，经抢救后血压恢复正常，但一直未排尿液，膀胱不充盈，导尿导出尿液 100ml。为确定是否为急性肾衰竭，可行下列哪一项检查（ ）

A. 中心静脉压测定

B. PSP 试验

C. 血常规

D. 尿钠测定

E. 血细胞比容

9、患者男性，40岁，矿工，因在坑道工作时塌方，被埋6小时后获救，双股部及臀部明显肿胀，血清钾5.5mmol/L，诊断为挤压伤。为观察有无肾脏并发症，下列哪一项最有意义（ ）

- A. 血压、脉率
- B. 出血、感染
- C. 中心静脉压
- D. 尿量、尿钠
- E. 瞳孔、神志

10、出血性休克患者，经手术止血并补充血容量纠正休克，伤后24小时一直无尿，使用速尿无效。以后补液方案应是（ ）

- A. 随意口服液体
- B. 每天经静脉途径给予2000~2500ml液体
- C. 4天内不补充液体
- D. 不补液，仅口服山梨醇导泻
- E. 按“显性失水+不显性失水-内生水”公式补液

11、预防多系统器官功能衰竭(MSOF)的重要措施是（ ）

- A. 处理各种急症时均应有整体观念
- B. 重视患者的循环和呼吸功能
- C. 防治感染
- D. 尽可能改善全身情况

E. 及早治疗首先发生的器官衰竭

12、患者男性，急性胰腺炎并发肾功能衰竭，欲行血液透析，下列属于血液透析禁忌证的是（ ）

A. 血清尿素氮(BUN) >30mmol/L

B. 血清钾>6. 5mmol/L

C. 血清肌酐>908 μ mol/L

D. 严重酸中毒或碱中毒

E. 休克

13、急性肾衰竭时危险性最大的是（ ）

A. 低血钙

B. 低钠

C. 高镁

D. 高钾

E. 高磷

14、对弥散性血管内凝血抗凝疗法的叙述错误的是（ ）

A. 抗凝疗法不宜早期进行

B. 应用前后测凝血时间

C. 常用药物有肝素

D. 注意过敏反应

E. 用药过量可用鱼精蛋白拮抗

15、急性肾功能衰竭少尿期，叙述不正确的是（ ）

A. 尿钠浓度 $>40\text{mmol/L}$

B. 尿比重 >1.010

C. 肾小管上皮细胞管型

D. 血钾浓度直线上升

E. 补液后尿量不增加

16、预防和治疗术后肺不张的措施中，下列哪一项不恰当（ ）

A. 鼓励咳痰

B. 吹气球训练

C. 术前锻炼深呼吸

D. 术后胸、腹部切口应紧紧固定或绑扎

E. 减少肺泡和支气管内分泌物，如术前 2 周应禁烟

17、水中毒患者出现肺水肿时，可表现出下列哪个症状（ ）

A. 全身水肿

B. 头痛，呕吐，昏迷

C. 尿少

D. 呼吸急促，咳出血性泡沫样痰

E. 全身水肿

18、低效性呼吸状态与下列哪一项有关（ ）

- A. 全身抵抗力下降
- B. 肺不张，支气管分泌物增多，肺水肿
- C. 尿量减少，全身水肿
- D. 肺泡毛细血管内膜损伤，透明膜形成
- E. 中心静脉压升高

19、急性肾衰竭患者的饮食护理，哪一项是错误的（ ）

- A. 高蛋白
- B. 高热量
- C. 充足维生素
- D. 忌含钾丰富的食物
- E. 控制入水量

20、ARDS 患者早期易发生的症状为（ ）

- A. 肺部阴影
- B. 动脉氧分压下降
- C. 明显的发绀
- D. 肺部啰音
- E. 呼吸慢而深

21、在急性弥散性血管内凝血高凝期应及时使用（ ）

- A. 肝素
- B. 止血芳酸
- C. 6-氨基己酸
- D. 鱼精蛋白
- E. 维生素 K

22、关于 ARDS 的护理叙述错误的是（ ）

- A. 单纯吸氧基本无效
- B. 主要应用呼气末正压通气
- C. 维持血容量，快速补液
- D. 应用有效的抗生素
- E. 营养支持

23、急性肾衰竭患者，发病后 15 天，每天尿量达 5000ml，每天补液量应是（ ）

- A. 相当于每天排出水分量的 1/3~1/2
- B. 等于每天排出水分量加生理需要量
- C. 相当于每天排出水分量的 2 倍
- D. 每天补液量为 2500~3500ml
- E. 不补液、仅随意口服液体

24、急性肾衰竭少尿期尿比重一般在（ ）

A. 1.010~1.014

B. 1.010~1.020

C. 1.020~1.030

D. 1.010~1.040

E. 1.010~1.030

25、关于急性肾衰竭多尿期的描述，下列不正确的是（ ）

A. 每天尿量超过400ml

B. 肾小球滤过率增加

C. 患者尚未脱离危险

D. 肾小管重吸收功能已经恢复

E. 历时2周左右

26、急性肾衰竭进入多尿期的标志是（ ）

A. 神志清楚

B. 每天尿量超过400ml

C. 发病1周以后

D. 尿量开始增加

E. 每天尿量超过2000ml

27、弥散性血管内凝血高凝期的特点是（ ）

- A. 注射部位大片出血
- B. 血液不易抽出、易凝固
- C. 大量咯血
- D. 严重的便血
- E. 凝血时间延长

28、急性肾衰竭少尿期行血液透析疗法时，透析液中成分不含（ ）

- A. 氯化钠
- B. 氯化钙
- C. 葡萄糖
- D. 氯化钾
- E. 肝素

29、患者，男性，20岁，失血性休克30小时，经抢救血压恢复正常，发病以来尿量仅为400ml，为确诊是否肾衰竭，最适宜的检查是（ ）

- A. 血液pH测定
- B. 电解质检查
- C. 尿液检查
- D. 肾盂造影
- E. 补液试验

30、对急性肾衰竭诊断价值较高的尿液检查结果是（ ）

- A. 大量红细胞
- B. 嗜酸性细胞
- C. 颗粒管型
- D. 肾小管上皮细胞
- E. 宽大棕色管型

31、急性肾衰竭少尿期电解质紊乱，下列哪一项是正确的（ ）

- A. 高钾血症、高磷血症、高镁血症、低钠血症、低钙血症
- B. 高钾血症、高钠血症、高镁血症、低磷血症、低钙血症
- C. 低钾血症、高磷血症、高镁血症、低钠血症、低钙血症
- D. 高钾血症、高磷血症、低镁血症、低钠血症、低钙血症
- E. 高钾血症、低镁血症、高钠血症、低磷血症、低钙血症

32、急性肾衰竭少尿期的护理诊断、下列哪一项不正确（ ）

- A. 体液过多
- B. 排尿异常
- C. 焦虑或悲哀
- D. 有体液不足的危险
- E. 有感染的危险

33、急性肾衰竭(ARF)少尿期一般持续时间为（ ）

- A. 4~7 天

- B. 7~14 天
- C. 14~20 天
- D. 21~26 天
- E. 30~37 天

34、肾前性肾衰竭的功能性不全阶段与器质性损害阶段最主要的区别是（ ）

- A. 病因不同
- B. 临床表现不同
- C. 肾小球滤过率不同
- D. 有无肾小管上皮细胞的变性和坏死
- E. 有无肾小球坏死

35、属于肾前性肾衰竭的病因是（ ）。

- A. 严重休克
- B. 应用氨基糖苷类药物
- C. 盆腔肿瘤压迫输尿管
- D. 毒蛇咬伤
- E. 肾小球肾炎

36、MSOF 时常先受损的器官是（ ）

- A. 肾

B. 肝

C. 脑

D. 心

E. 肺

37、叙述 MSOF 的正确概念的是（ ）

A. 在急性疾病的过程中，序贯性地发生 2 个以上器官功能不全

B. 在急性疾病过程中，同时或相继发生一个以上系统和(或)器官的急性衰竭

C. 长期慢性病理过程中引起多个器官的功能损害

D. 同时有多个器官和(或)系统损害

E. 在疾病过程中有 3 个以上器官先后衰竭

38、容易发生急性肾功能衰竭的损伤是（ ）

A. 冻伤

B. 撕脱伤

C. 小面积烧伤

D. 多处刺伤

E. 严重挤压伤

39、少尿是指 24 小时尿量（ ）

A. <400ml

B. <250ml

C. <100ml

D. <50ml

E. <10ml

40、急性肾衰竭患者并发肺部感染，首选抗生素（ ）

A. 氯霉素

B. 青霉素

C. 头孢噻吩(先锋霉素 I)

D. 磺胺类

E. 氨基糖苷类

41、引起急性肾衰竭少尿期主要的死亡原因是（ ）

A. 水中毒、高钾血症

B. 氮质血症

C. 低钠血症

D. 低钾血症

E. 酸中毒

42、急性肾衰竭少尿期患者的饮食护理，下列不正确的是（ ）

A. 高蛋白

B. 高糖

- C. 高维生素
- D. 适宜的脂肪
- E. 避免含钾丰富的食物

43、腹膜透析的患者宜采取的体位是（ ）

- A. 仰卧中凹位
- B. 平卧位
- C. 半卧位
- D. 左侧卧位
- E. 俯卧位

44、腹膜透析液使用前应加温至（ ）

- A. 24~25℃
- B. 25~26℃
- C. 30~31℃
- D. 32~33℃
- E. 37~38℃

45、预防急性肾衰竭的措施中，下列不恰当的是（ ）

- A. 对血容量不足的患者及时扩充血容量
- B. 发现误输异型血后，应用甘露醇利尿
- C. 禁用易产生低血压和缺氧的麻醉

D. 对严重挤压伤患者，给予碱性药物

E. 对休克患者应尽早给予血管收缩药

46、急性肾衰竭少尿期的治疗原则是（ ）

A. 扩充血容量

B. 限制水摄入量

C. 注意补钾

D. 增加胶体渗透压

E. 纠正低钠血症

47、诊断 ARDS 最重要的指征是（ ）

A. X 线胸片有点片状阴影

B. 双肺湿啰音

C. 代谢性酸中毒

D. 点头样呼吸

E. 进行性低氧血症

48、在严重疾病过程中，当呼吸增加至下列哪一项，应警惕 ARDS（ ）

A. 18 次/分

B. 25 次/分

C. 30 次/分

D. 40 次/分

E. 50 次/分

49、急性肾衰竭时，尿液检查结果不正确的是（ ）

- A. 尿液呈碱性
- B. 管型
- C. 尿比重低且固定
- D. 镜下红细胞
- E. 尿蛋白阳性

50、弥散性血管内凝血最早的临床表现是（ ）

- A. 取血时不易抽出、血易凝
- B. 皮肤粘膜下出血
- C. 注射部位易出血
- D. 伤口易出血
- E. 咯血

51、急性肾衰竭少尿或无尿期患者的血液中电解质下列哪项变化不可能（ ）

- A. 高钾血症
- B. 高镁血症
- C. 低钾血症
- D. 高钠血症

E. 高钙血症

52、成人呼吸窘迫综合征(ARDS)血气分析结果，氧分压通常低于下列哪一水平（ ）

A. 8.0kPa

B. 10.7kPa

C. 11.0kPa

D. 11.3kPa

E. 13.3kPa

53、ARDS 患者的护理问题包括（ ）

A. 气体交换受损

B. 清除呼吸道无效

C. 体液过多

D. 体液不足

E. 有感染的可能

54、急性呼吸窘迫综合征的主要表现是（ ）

A. 进行性呼吸困难

B. 一般吸氧不能纠正缺氧

C. 进展期出现发绀

D. 血氧正常

E. 早期肺部无啰音

55、急性呼吸窘迫综合征早期的表现是（ ）

- A. 呼吸加快
- B. 一般吸氧不能缓解症状
- C. $\text{PaCO}_2 > 5.3 \text{kPa} (40 \text{mmHg})$
- D. 肺部点、片状阴影
- E. $\text{PaO}_2 < 8.0 \text{kPa} (60 \text{mmHg})$

56、引起急性呼吸窘迫综合征的病因有（ ）

- A. 严重感染
- B. 大手术
- C. 输液过多
- D. 休克
- E. 严重创伤

57、急性肾功能衰竭多尿期的护理措施包括（ ）

- A. 加强营养支持
- B. 纠正贫血
- C. 纠正电解质紊乱
- D. 补液量应出入平衡
- E. 合理使用抗生素

58、急性呼吸窘迫综合征的病理生理变化包括（ ）

- A. 肺泡水肿
- B. 肺出血
- C. 肺泡过度扩张
- D. 通气/血流(V/Q)比值正常
- E. 肺泡透明膜形成

59、预防急性呼吸窘迫综合征发生的措施包括（ ）

- A. 及早处理原发疾病
- B. 避免输入库血
- C. 术后鼓励深呼吸和排痰
- D. 吸入高浓度氧
- E. 大手术前检查肺功能

60、呼气终末正压通气的危害在于（ ）

- A. 不能保障有效通气
- B. 导致肺气压伤
- C. 肺部感染
- D. 导致心脏负担加重
- E. 肺不张

61、ARF 少尿期补液比较恰当的指标是（ ）

- A. 体重每天下降 0.5kg
- B. 血清钠超过 150mmol/L
- C. 无脑水肿
- D. 中心静脉压正常
- E. 无肺水肿

62、发现误输异型血以后采取的措施包括（ ）

- A. 纠正低血压
- B. 给予 20% 甘露醇
- C. 给予 5% 碳酸氢钠
- D. 给予 0.9% 生理盐水
- E. 给予血管扩张药

63、透析过程中的护理要点有（ ）

- A. 患者取半卧位
- B. 严禁患者翻身咳嗽
- C. 遵守无菌原则
- D. 更换透析瓶时不能使正常运作中断
- E. 准确记录出入量

64、急性肾功能衰竭少尿期或无尿期主要临床表现为（ ）。

A. 水电解质酸碱平衡失调

B. 尿毒症

C. 尿比重低

D. 全身感染

E. 尿比重高、尿量少

65、对肾脏有损害的药物是（ ）

A. 磺胺类

B. 卡那霉素

C. 多粘菌素 B

D. 新霉素

E. 庆大霉素

66、急性呼吸衰竭的预防措施包括（ ）。

A. 控制输液量及速度

B. 不要长时间持续吸氧

C. 术前注意检查肺功能

D. 术后防治肺部感染

E. 不要吸入高浓度氧

67、ARDS 早期特点有（ ）

A. 动脉血二氧化碳分压增高

- B. 呼吸加快
- C. 无明显肺部体征
- D. 动脉血氧分压下降
- E. 呼吸窘迫感

68、对于 ARF 少尿期患者的护理，下列不正确的是（ ）

- A. 可输库存血
- B. 严格禁食蛋白质
- C. 因血钠低，故应增加钠盐摄入
- D. 热量以糖为主，适量脂肪
- E. 增加含磷食物的摄入

69、血容量不足引起的少尿，下列叙述正确的是（ ）

- A. 补液后尿量不增加
- B. 血细胞比容下降
- C. 血钾浓度直线上升
- D. 尿比重 >1.020
- E. 尿钠浓度 $<20\text{mmol/L}$

70、急性肾功能衰竭多尿期最主要的并发症是（ ）。

- A. 低钾血症
- B. 消化道出血

- C. 感染
- D. 低钙血症
- E. 低钠血症

71、急性肾功能衰竭少尿期水电解质酸碱平衡的类型有（ ）

- A. 水中毒
- B. 高血钾
- C. 低血钠
- D. 代谢性酸中毒
- E. 低血磷

72、弥散性血管内凝血可由下面原因引起（ ）

- A. 严重感染
- B. 严重创伤
- C. 休克
- D. 恶性肿瘤
- E. 产科意外

73、弥散性血管内凝血继发性纤溶期的特点是（ ）

- A. 凝血时间缩短
- B. 血小板计数明显下降
- C. 纤溶酶原减少

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/827034060026010003>