

# 120 急救中心业务知识考核

## 一、选择题

1.心脏病病人用力排便可能引起的严重意外是（） [单选题] \*

- A. 肛裂
- B. 心搏骤停 ✓
- C. 直肠曲张
- D. 便血
- E. 血压升高

2.书写危重病人交班报告时，要用红笔在“诊断”的下一行居中标记（） [单选题] \*

- A. “#”
- B. “△”
- C. “○”
- D. “”
- E. “※” ✓

3.下列哪项不是急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病的症状（） [单选题] \*

- A. 运动障碍
- B. 感觉障碍
- C. 癫痫发作 ✓
- D. 呼吸障碍
- E. 心肌损害

4. 接触传染病病人后，关于手消毒错误的叙述是（） [单选题] \*

- A. 双手浸泡于消毒液中，并相互揉搓 2 分钟
- B. 双手浸于消毒液中，并用刷子每只手刷 1 分钟 ✓
- C. 用肥皂水、流动水洗两遍
- D. 烘干或擦干双手
- E. 消毒液应每天更换

5. 乙醇拭浴时头部置冰袋的目的是（） [单选题] \*

- A. 防止感冒
- B. 防止腹泻
- C. 防止血管扩张引起出血
- D. 防止表皮血管收缩、头部充血 ✓
- E. 预防血压下降

6. 清洁口腔、预防感染应选择的漱口液是（） [单选题] \*

- A. 2%~3% 硼酸溶液 ✓
- B. 1%~3% 过氧化氢溶液
- C. 0.1% 醋酸溶液
- D. 1%~4% 碳酸氢钠溶液
- E. 复方硼砂溶液

7. 药物的血浆半衰期是指（） [单选题] \*

- A. 药物作用强度减弱一半所需的时间
- B. 血浆药物浓度下降一半所需的时间 ✓
- C. 药物从血浆中消失所需时间的一半

D. 50% 药物生物转化所需的时间

E. 50% 药物从体内排出所需的时间

8. 测量呼吸时，护士的手仍放在诊脉部位是为了（） [单选题] \*

A. 表示对病人的关心

B. 看表计时

C. 转移病人注意力 ✓

D. 脉率与呼吸作对照

E. 测脉率估计呼吸频率

9. 张某，妊娠 32 周，产前检查发现为臀先露胎位，护士应指导其采取（） [单选题] \*

A. 头低脚高位

B. 截石位

C. 侧卧位

D. 胸膝卧位 ✓

E. 俯卧位

10. 病人手指并拢一手掌面积为体表总面积的（） [单选题] \*

A. 0.5%

B. 0.75%

C. 1.0% ✓

D. 1.25%

E. 1.5%

11. 休克早期血压及脉搏的变化是（） [单选题] \*

A. 收缩压下降，舒张压下降，脉搏细速

- B.收缩压正常，舒张压下降，脉搏细速
- C.收缩压正常，舒张压升高，脉搏缓慢
- D.收缩压正常，舒张压升高，脉搏细速 ✓
- E.收缩压升高，舒张压正常，脉搏细速

12.防止烧伤休克的主要措施是（） [单选题] \*

- A.保暖
- B.镇痛、镇静
- C.创面处
- D.补液治疗 ✓
- E.多饮水

13.关于小儿生长发育，下述哪项是错误的（） [单选题] \*

- A.生长发育是连续的过程，各年龄阶段发育的速度不同
- B.神经系统发育最早，3岁时神经细胞分化已基本完成
- C.淋巴系统发育于学龄期达成人水平 D.生长发育存在个体差异 ✓
- E.生后头3个月体重增长最快

14.过敏性紫癜与血小板减少性紫癜的主要区别是（） [单选题] \*

- A.毛细血管脆性试验阳性
- B.紫癜呈对称分布
- C.血小板正常 ✓
- D.下肢皮肤有紫癜
- E.有过敏史

15.胆道T型引流管冲洗后注入33%硫酸镁15~20mL的目的是（） [单选题] \*

A. 松弛括约肌，以利引流 ✓

B. 镇静、解痉

C. 降低血压

D. 导泻

E. 消炎、止痛

16. 临床拟诊为肝管结石，下列哪种成像技术为首选（） [单选题] \*

A. CT ✓

B. MRI

C. CTA

D. DSA

E. MRA

17. 下列各类病人无须鼻饲法进食的是（） [单选题] \*

A. 昏迷病人

B. 口腔手术后病人

C. 早产儿

D. 破伤风病人

E. 休克病人 ✓

18. 确诊新型隐球菌性脑膜炎的主要实验室检查是（） [单选题] \*

A. 脑脊液涂片墨汁染色 ✓

B. 脑脊液细胞学检查

C. 脑脊液生化检查

D. 血液细菌培养

E.脑脊液荧光素钠试验

19.对缺氧和二氧化碳潴留同时并存者应（）[单选题] \*

A.高浓度给氧为宜

B.大流量给氧为宜

C.低浓度持续给氧为宜 ✓

D.低流量间断给氧为宜

E.高浓度间断给氧为宜

20.躯体石膏固定病人最严重的并发症是（）[单选题] \*

A.喷射性呕吐

B.剧烈疼痛

C.石膏综合征 ✓

D.寒战

E.末梢血运差

21.细菌耐药最常见的机制是（）[单选题] \*

A.产生抗生素灭活酶 ✓

B.抗菌药物作用靶位改变

C.细菌改变代谢途径

D.细菌细胞膜渗透性改变，使抗菌药物不易进入细菌细胞

E.细菌细胞将抗菌药物排除细菌

22.下列消毒剂中属中效消毒剂的是（）[单选题] \*

A.戊二醛

B.过氧乙酸

C. 氯己定

D. 臭氧

E. 碘伏喉气管 ✓

23. 异物最严重的并发症是 ( ) [单选题] \*

A. 声嘶

B. 喉痛

C. 喉头梗阻 ✓

D. 急性喉炎

E. 肺部感染

24. 颅内动脉瘤出血的诱因不包括 ( ) [单选题] \*

A. 卧床休息 ✓

B. 情绪激动

C. 便秘

D. 高血压

E. 进食过量

25. 大量饮水后尿量增多，主要是由于 ( ) [单选题] \*

A. 肾小球滤过率增高

B. 抗利尿激素分泌减少 ✓

C. 血浆胶体渗透压降低

D. 囊内压降低

E. 醛固酮分泌减少

26. 匹罗卡品在眼病中的作用，下列哪项不正确 ( ) [单选题] \*

A. 用于治疗青光眼

B. 使瞳孔缩小

C. 开放前房角

D. 降低眼压

E. 解除眼肌痉挛 ✓

27. 放射治疗价值不大的肿瘤为 ( ) [单选题] \*

A. 恶性淋巴瘤

B. 神经母细胞瘤

C. 鼻咽癌

D. 宫颈癌

E. 脂肪肉瘤 ✓

28. 三大营养物质在体内氧化时所释放的能量用来维持体温的能量占总量的 ( ) [单选题] \*

A. 30%

B. 40%

C. 50% ✓

D. 60%

E. 70%

29. 糖尿病膳食治疗的目的中, 下列哪项是错误的 ( ) [单选题] \*

A. 调整膳食中糖的供给量 ✓

B. 减轻胰岛细胞的负担

C. 纠正糖代谢紊乱

D. 降低血糖



E.消除症状

30.破伤风最早发生强直性痉挛的肌群是（）[单选题] \*

A.咽肌

B.面肌

C.咀嚼肌 ✓

D.颈背肌

E.腹肌

31.颅内最常见的恶性肿瘤为（）[单选题] \*

A.脑膜瘤

B.血管网状细胞瘤

C.转移癌

D.神经胶质瘤 ✓

E.先天性肿瘤

32.杀灭物体上所有的微生物的方法称为（）[单选题] \*

A.防腐

B.无菌

C.消毒

D.无菌操作

E.灭菌 ✓

33.唇裂整复术的最佳年龄为（）[单选题] \*

A.6~12 个月 ✓

B.18~24 个月

C. 3 岁

D. >4 岁

E. >5 岁

34. 灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的灭菌方法是 ( ) [单选题] \*

A. 环氧乙烷灭菌法

B. 戊二醛浸泡灭菌法

C. 辐射灭菌法

D. 过氧乙酸浸泡灭菌法

E. 压力蒸气灭菌法 ✓

35. 静脉输液过程中病人感觉胸部不适, 随即发生呼吸困难、严重发绀, 心前区听诊闻及持续响亮的“水泡音”。你认为是 ( ) [单选题] \*

A. 急性肺水肿

B. 空气栓塞 ✓

C. 超敏反应

D. 发热反应

E. 溶血反应

36. 给婴幼儿用热水袋保暖时, 水温应不超过 ( ) [单选题] \*

A. 70℃

B. 60℃

C. 50℃ ✓

D. 40℃

E. 30℃

37. 大量不保留灌肠时灌肠筒的液面应高于肛门（） [单选题] \*

A. 10~20cm

B. 20~30cm

C. 30~40cm

D. 40~60cm ✓

E. 65~80cm

38. 诊治伤害现象的划分应不包括（） [单选题] \*

A. 故意伤害

B. 可知伤害

C. 免责伤害 ✓

D. 责任伤害

E. 可控伤害

39. 关于干扰素的描述，错误的是（） [单选题] \*

A. 可由病毒及其他干扰素诱生剂诱生

B. 产生后对邻近的细胞可发生作用

C. 不能由病毒寄生的宿主细胞产生 ✓

D. 其作用发生早于抗体

E. 是一组具有高活性的多功能糖蛋白

40. 在输血前后和在两瓶血输入之间应输入少量（） [单选题] \*

A. 5% 葡萄糖溶液

B. 4% 碳酸氢钠溶液

C. 5% 葡萄糖生理盐水

D. 0.9% 氯化钠溶液 ✓

E. 复方氯化钠溶液

41. 关于颅骨的发育，下述哪项错误（） [单选题] \*

A. 颅缝闭合时间为生后 6~8 周 ✓

B. 后囟在出生时已很小或已闭合

C. 前囟在 1~1.5 岁时闭合

D. 前囟早闭见于小头畸形

E. 面部骨骼发育较颅骨晚

42. 一病人青霉素皮试为阴性，静脉滴注青霉素溶液约 10 分钟后出现胸闷、气促、面色苍白、血压下降。下列哪项护理措施是错误的（） [单选题] \*

A. 停止滴注青霉素，立即皮下注射 0.1% 的盐酸肾上腺素

B. 病人平卧就地抢救

C. 给予氧气吸入

D. 遵医嘱给予升压药

E. 立即将病人搬入抢救室进行抢救 ✓

43. 肾结核最常见的症状是（） [单选题] \*

A. 肾积水

B. 尿频 ✓

C. 肾区疼痛

D. 潮热、盗汗

E. 贫血

44. 哪一类水、电解质紊乱最容易发生低血容量性休克（） [单选题] \*

A. 低渗性脱水 ✓

B. 高渗性脱水

C. 等渗性脱水

D. 水中毒

E. 低钾血症

45. 下列哪项不是近距离后装治疗宫颈癌病人的护理措施 ( ) [单选题] \*

A. 1:1000 苯扎溴铵冲洗阴道

B. 有疼痛者不宜立即处理 ✓

C. 清洁会阴部

D. 宫颈癌出血者，用无菌纱布填塞

E. 留观 1~2 小时，观察不良反应

46. 由瓶内倒取无菌溶液时，标签应 ( ) [单选题] \*

A. 清楚

B. 向下

C. 贴紧掌心 ✓

D. 醒目

E. 避开掌心

47. 糖尿病病人的饮食治疗要求中，下列哪项正确 ( ) [单选题] \*

A. 不控制总热量

B. 限制糖类进食量

C. 糖类提供总热量的 50%~60%

D. 蛋白质、脂肪各占 20%~25%

E.少量多餐 ✓

48. ABO 血型不合引起的新生儿溶血病最常见于 ( ) [单选题] \*

A. 母亲血型为 “A”，新生儿血型为 “B”

B. 母亲血型为 “B”，新生儿血型为 “A”

C. 母亲血型为 “O”，新生儿血型为 “A” 或 “B” ✓

D. 母亲血型为 “AB”，新生儿血型为 “A” 或 “B”

E. 母亲血型为 “A”，新生儿血型为 “A”

49. 给长期卧床病人进行按摩，错误的是 ( D ) [单选题] \*

A. 每次翻身时应按摩病人骨隆突处，以促进血液循环 ✓

B. 先从臀部上方开始沿脊柱两旁向上按摩，至肩部时转向下至臀部

C. 力量要足够刺激肌肉组织 D. 如软组织已有损伤者应加大按摩的力度，以促进组织康复

E. 再用拇指指腹由骶尾部开始沿脊柱按摩至第 7 颈椎处

50. X 线照片上所指的关节间隙，代表解剖学上的 ( ) [单选题] \*

A. 关节腔

B. 关节囊

C. 关节软骨

D. 关节囊和关节腔

E. 关节腔和关节软骨 ✓

51. 肾损伤病人绝对卧床时间为 ( ) [单选题] \*

A. 2 周

B. 尿液转清后

C. 1 个月

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/827123033026010003>