

2024 年广东省始兴县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题完整题库附答案（考试直接用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，身高 180cm，体重 90kg，腰围 100cm，其体重指数(BMI)是()

- A: 30.2
- B: 20
- C: 18
- D: 27.8

答案：D

2. 服药时饮酒可引起低血糖的是

- A: 格列本脲
- B: 硫酸亚铁
- C: 维生素 A
- D: 西咪替丁

答案：A

3. 患者手术后，给予肠外营养液 10%GS500ml，50%GS250ml，20%脂肪乳 250ml，8.5%复方氨基酸 750ml，水溶性维生素 10ml，脂溶性维生素 10ml，微量元素 10ml，10%氯化钠注射液 40ml，10%氯化钾注射液 30ml。营养液中脂肪如提供的能量是()

- A: 200kcal
- B: 700kcal

C: 1150kcal

D: 450kcal

答案：D

4. 患者，男，62 岁，糖尿病病史 7 年，长期使用胰岛素、二甲双胍治疗，近期为控制血压加服治疗药物，该患者不宜应用的药物是

A: 普萘洛尔

B: 卡托普利

C: 洛伐他汀

D: 氢氯噻嗪

答案：A

5. 患者女，56 岁，既往有高血压、高脂血症病史，长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周，伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛，服用布洛芬，疼痛未缓解，自行加用萘普生。胃镜检查显示：胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡，幽门螺杆菌（Hp）阳性。肾功能未见异常

A: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）+枸橼酸铋钾+阿莫西林+甲硝唑

B: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）+枸橼酸铋钾+阿莫西林+克拉霉素

C: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）+阿莫西林+克拉霉素

D: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）+枸橼酸铋钾+克拉霉素+左氧氟沙星 A

答案：A

6. 一般情况下，老年人应该控制总胆固醇测定值低于

A: 5.2mmol / L

B: 5.1mmol / L

C: 6.2mmol / L

D: 6.1mmol / L

答案：A

7. 对沙眼衣原体有强大的抑制作用的药物是

- A: 硫酸锌滴眼液？
- B: 泼尼松龙？
- C: 酞丁安滴眼液？
- D: 米诺环素？

答案：C

8. 脂肪或酪蛋白消化不良（儿童）可呈现

- A: 鲜血便
- B: 白陶土便
- C: 乳凝块便
- D: 柏油黑便

答案：C

9. 患者，男，75 岁，有高血压，长期服用厄贝沙坦氢氯噻嗪片（150mg/12.5mg）1 片 qd，血压控制平稳。因排尿困难、尿频和尿不尽感就诊，诊断为良性前列腺增生。给予非那雄胺片 5mgqd，特拉唑嗪片 5mgqd。患者用药后出现头晕，前来咨询。

- A: 非那雄胺可增强降压药的降压效果，建议更换降压药
- B: 头晕可能与患者焦虑有关，继续用药会逐渐缓解
- C: 非那雄胺可引起直立性低血压，头晕可能与此相关
- D: 建议睡前服用特拉唑嗪，有助于缓解头晕症状

答案：D

10. 患者，女，46 岁，高血压病史 3 年，2 年前出现关节晨僵、手关节及膝关节疼痛，诊断为类风湿关节炎。半年前症状加重，采用了联合用药方案：患者用药如下：

- A：双氯芬酸钠缓释片
- B：甲氨蝶呤片
- C：羟氯喹片
- D：氨氯地平片

答案：C

11. 可引起体位性低血压，服用后，患者由卧而坐起或由坐而站起等从低位向高位的转换动作时均应缓慢，动作不能突然的药物是

- A：左氧氟沙星
- B：卡马西平
- C：特拉唑嗪
- D：头孢哌酮

答案：C

12. 评判为不规范处方的是

- A：二甲双胍用于糖尿病人
- B：无适应证用药
- C：黄连素用于细菌性腹泻
- D：单张门诊处方超过 5 种药品

答案：D

13. 感冒伴随咳嗽的临床表现是

- A：可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰
- B：有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血

C: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达 2~3 个月

D: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛

答案：D

14. 目前唯一被批准用于治疗类风湿关节炎的 IL-1 拮抗剂类生物制剂为

A: 阿那白滞素

B: 阿达木单抗

C: 英夫利昔单抗

D: 阿巴西普

答案：A

15. 患者，男，40 岁，体重 70kg，因咳痰伴发热入院，诊断为肺炎，欲给予左氧氟沙星片实施治疗。该药说明书提示：肌酐清除率低于 50ml/min 时需要调整给药方案。该患者入院时行肾功能检查：血肌酐 (Cr) 130 $\mu\text{mol/L}$ 。医师给出的治疗方案是

A: 经验剂量的 1/2

B: 经验剂量的 3/4

C: 不需要调整给药方案

D: 延长给药间隔时间

答案：C

16. 提高药效、减少人体吸收的是

A: 氨基糖苷类

B: 阿苯达唑

C: 抗忧郁药

D: 利尿药

答案：B

17. 静脉滴注阿昔洛韦的适宜溶媒是

A: 0.9%氯化钠注射液

B: 复方氯化钠注射液

C: 50%葡萄糖注射液

D: 5%葡萄糖注射液

答案：A

18. (2019 年真题) 患者，女，35 岁，复杂部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊，患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

A: 阿卡波糖

B: 卡马西平

C: 丙戊酸钠

D: 二甲双胍

答案：B

19. I 类手术切口应用第三代头孢菌素，属于

A: 过度治疗用药

B: 超适应证用药

C: 不合理联合用药

D: 无适应证用药

答案：D

20. 药师应具备的素质中，贯穿于药学服务全过程的是()。

- A: 高尚的职业道德
- B: 良好的教育背景
- C: 药历制订、修改
- D: 交流沟通能力

答案：C

21. 患者李某，男，45 岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为 160 / 100mmHg。

- A: ACEI
- B: AR
- C: 利尿剂
- D: β 受体阻断剂

答案：A

22. 毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效的解毒药，但救治原则基本相同。

- A: 硫喷妥钠
- B: 巴比妥
- C: 异戊巴比妥
- D: 苯巴比妥

答案：C

23. 以下所列病症中，依据"血淀粉酶超过正常值"可以诊断的是

- A: 急性胰腺炎
- B: 肾病综合征
- C: 高血压

D: 高脂血症

答案：A

24. $30\text{g/L} \leq \text{Hb 量} < 60\text{g/L}$ 可诊断为

A: 重度贫血

B: 轻度贫血

C: 基本正常

D: 中度贫血

答案：A

25. 在考虑患者意愿、偏好和生命质量的基础上，比较不同治疗方案的经济合理性，应选用的药物经济学研究方法是

A: 成本-效益分析

B: 成本-效果分析

C: 成本-效用分析

D: 最小成本分析

答案：C

26. 抗类风湿关节炎药物中，至少服用 6 个月才能宣布无效，可导致失明的是

A: 柳氮磺吡啶

B: 来氟米特

C: 青霉胺

D: 氯喹

答案：D

27. 蛋白酶抑制剂 ()

A: PIs

B: FIs

C: NNRTIs

D: NRTIs

答案：A

28. 不能发现"长时间应用才能发生或停药后迟发"的药品不良反应，缘于

A: 病例数目少

B: 管理漏洞

C: 考察不全面

D: 观察时间短

答案：D

29. 归属公共网络资源的是

A: www.googl

B: www.cmt.tom.cn

C: www.merck.com

D: www.ashp.org

答案：A

30. (2019 年真题) 配制下列化疗药时，只能选择葡萄糖注射液做溶媒的是

A: 奥沙利铂

B: 环磷酰胺

C: 依托泊苷

D: 博来霉素

答案：A

31. (有关物质中毒的特效解毒剂)，有机氟中毒的特效解毒剂是

- A: 氯解磷定
- B: 维生素 K
- C: 烯丙吗啡
- D: 乙酰胺

答案：D

32. 以下所列药物中，一般不会导致蛋白尿的是

- A: 青霉素
- B: 多黏菌素
- C: 庆大霉素
- D: 甲氨蝶呤

答案：A

33. (2016 年真题) 医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握和解释

- A: 左眼
- B: 立即
- C: 右眼
- D: 适量

答案：C

34. 下列药物中服用后不影响驾驶行为的是 ()

- A: 阿米洛利片
- B: 东莨菪碱片
- C: 左甲状腺素钠片
- D: 氟桂利嗪胶囊

答案：C

35. 药物不良反应报告的描述项目

A: 患者疾病发病时间

B: 采取措施干预不良反应的时间

C: 患者用药记录

D: 药品不良反应动态变化的相关症状体征、检查及干预措施结果

答案: D

36. (2015 年真题) 解救有机磷中毒过程中，如阿托品应用过量，应立刻给予 ()。

A: 麻黄碱

B: 毛果芸香碱

C: 山莨菪碱

D: 东莨菪碱

答案: B

37. 患者，男，68 岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天”入院。查体：体温 39.1℃，血压 138 / 80mmHg，心率 102 次 / 分，呼吸 32 次 / 分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 x 线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A: 支原体

B: 肺炎链球菌

C: 铜绿假单胞菌

D: 衣原体

答案: C

38. “美国心脏病学院与美国心脏协会 2014 年颁布了(2013 版成人降胆固醇治疗降低动脉粥样硬化性心血管疾病风险指南》，强调他汀类药物在降低急性冠脉综合征风险方面的获益”表明循证医学实践能够

- A: 改变降脂治疗观念
- B: 有助于个体化给药
- C: 有利于诊断特殊疾患
- D: 列为医药卫生行政决策的依据

答案：A

39. I 期新药临床试验样本数要求查看材料

- A: 20~30 例
- B: ≥ 300 例
- C: 常见病 ≥ 12000 例
- D: 主要病种 ≥ 300 例

答案：A

40. 具有末梢神经炎毒性，必要时需补充 B 族维生素和神经营养剂的药物是

- A: 环磷酰胺
- B: 甲氨蝶呤
- C: 阿糖胞苷
- D: 长春新碱

答案：D

41. 治疗幽门螺杆菌感染的一线方案，其典型组方中不包括的药物是

- A: 克拉霉素
- B: 甲硝唑
- C: 胶体果胶铋

D: 西咪替丁

答案: D

42. 患者,男,80 岁,因发热、咳嗽、咳痰 2 天就诊诊断为社区获得性肺炎,给予左氧氟沙星、甘草合剂、氨溴索、对乙酰氨基酚、维生素 C 等治疗。患者用药 3 天后出现失眠、烦躁不安等症状最可能引起该症状的药物是()

A: 氨溴索

B: 对乙酰氨基酚

C: 左氧氟沙星

D: 甘草合剂

答案: C

43. 患者,男,53 岁。因心前区疼痛 6 年,加重伴呼吸困难 10 小时入院。入院前 6 年感心前区疼痛,痛系膨胀性或压迫感,多于劳累、饭后发作,每次持续 3~5min,休息后减轻。入院检查:体温 37.8℃,心率 130 次/分,血压 80/40mmHg。呼吸急促,颈静脉稍充盈,双肺底部可闻有湿鸣音,心界向左扩大,心音弱,入院诊断为冠心病。

A: ACEI、AR

B: β 受体阻断药、钙拮抗剂、ACEI

C: 利尿药、长效二氢吡啶类钙通道阻滞药、ACEI

D: 硝普钠、利尿药、ACEI

答案: B

44. 患者,女,51 岁,临床诊断为“胃食管反流病”,CrCl: 45ml/min,以下哪种药物需要调整给药剂量

A: 硫糖铝

B: 法莫替丁

C: 多潘立酮

D: 兰索拉唑

答案: B

45. 应用高剂量时可导致脑病的抗菌药物是

A: 头孢哌酮

B: 美罗培南

C: 头孢唑林

D: 青霉素

答案: C

46. 表现为"牛肉样舌"的疾病为

A: 再生障碍性贫血

B: 巨幼细胞性贫血

C: 淋巴瘤

D: 缺铁性贫血

答案: B

47. 长期、大量使用可对肝脏造成不可逆性损伤的药物是

A: 塞来昔布

B: 阿司匹林

C: 对乙酰氨基酚

D: 布洛芬

答案: C

48. 应将该药倒入 50ml 温水中充分稀释，摇匀服用，可用于 IBS 患者止泻的药物是

A: 环孢素 A

B: 地芬诺酯

C: 匹维溴铵

D: 蒙脱石散

答案: D

49. 适用于阿司匹林哮喘伴有过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

A: 异丙托溴铵气雾剂

B: 沙丁胺醇气雾剂

C: 孟鲁司特钠咀嚼片

D: 茶碱片

答案: C

50. (2017 年真题) 抗结核联合治疗方案中, 可引起球后视神经炎不良反应的药物是 ()

A: 乙胺丁醇

B: 利福平

C: 左氧氟沙星

D: 吡嗪酰胺

答案: A

51. 柔道运动员使用后, 可在短时间内急速降低体重, 因此按兴奋剂管理的药物是

A: 依那普利

B: 氢氯噻嗪

C: 阿替洛尔

D: 利血平

答案: B

52. 博来霉素的主要毒副作用是 ()

- A: 溶血性尿毒症
- B: 肺纤维化
- C: 心脏毒性
- D: 出血性膀胱炎

答案: B

53. 下列药物中，解救氰化物中毒的特效药是

- A: 维生素 C
- B: 亚甲蓝
- C: 氟马西尼
- D: 维生素 K

答案: B

54. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L、甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考区间 0.56~1.70mmol / L)、总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考区间 <5.2mmol / L)、低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L(正常参考区间 2.1~3.1mmol / L)、高密度脂蛋白胆固醇 1.2mmol / L(正常参考区间 1.2~1.65mmol / L)、血肌酐 50 μ mol / L(正常参考区间 45~84 μ mol / L)、尿蛋白(++)。临床诊断：高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 控制体重
- B: 不必限盐
- C: 适当运动
- D: 减少脂肪摄入

答案: B

55. 老年人用氨基糖苷类药物时应谨慎，主要是因为老年人()。

- A: 血浆蛋白含量降低，使游离性药物增加
- B: 消化腺分泌减少，药物吸收增加
- C: 对药物处于高敏状态，影响中枢神经系统的功能
- D: 肾功能降低，药物半衰期延长，耳、肾毒性增加

答案：D

56. 患者，男性，30 岁，确诊为支气管哮喘，入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生嘱咐了一些用药注意事项。

- A: 特布他林气雾剂
- B: 二丙酸倍氯米松气雾剂
- C: 异丙托溴铵气雾剂
- D: 酮替酚

答案：B

57. 年人应用下列药物可引起何种不良反应，抗心力衰竭药物如地高辛等可引起

- A: 嗜睡及头晕
- B: 室性期前收缩、房室传导阻滞及低钾血症
- C: 脱水、低钾血症
- D: 青光眼，甚至致盲

答案：B

58. 无吞噬功能，但细胞颗粒中含有许多生物活性物质如肝素、组胺、慢反应物质等的细胞为

- A: 嗜碱性粒细胞
- B: 淋巴细胞
- C: 中性粒细胞

D: 嗜酸性粒细胞

答案：A

59. 患者男,34 岁因糖尿病酮症酸中毒入院,需静脉给予胰岛素或胰岛素类似物,应选用的药物是 ()

A: 普通胰岛素

B: 低精蛋白锌胰岛素

C: 门冬胰岛素

D: 精蛋白锌胰岛素

答案：A

60. 阿卡波糖片的适宜服药时间是

A: 餐后

B: 餐中

C: 清晨

D: 餐前

答案：B

61. 洋地黄中毒的特征性表现为

A: 快速房性心律失常伴传导阻滞

B: 视力模糊

C: 恶心

D: 黄视、绿视

答案：A

62. 引起药源性肾病的药物,含马兜铃酸的中药可导致

A: 直接肾毒性

B: 前列腺素合成障碍

C: 肾间质纤维化

D: 肾小管阻塞

答案: C

63. 由细菌引起的急性卡他结膜炎可选用

A: 0.1%羟苄唑滴眼剂

B: 2%色甘酸钠滴眼剂

C: 0.1%碘苷滴眼剂

D: 四环素眼膏

答案: D

64. 患儿，女，4岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液？

B: 应给予少量、多次、清淡饮食？

C: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止？

D: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星？

答案: D

65. 可用于香豆素类杀鼠药中毒药物是

A: 亚硝酸钠

B: 维生素 K1

C: 碘解磷定

D: 乙酰胺

答案：B

66. 患者，男，58 岁，因心前区疼痛 5 年，加重伴呼吸困难入院。入院前 6 年常感心前区疼痛，疼痛性质系紧缩性或压迫感，多于劳累、餐后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg；呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻及湿啰音，心界向左侧扩大，心音减弱。入院诊断为冠心病。

A: 阿司匹林是常用药物，主要不良反应为胃肠道出血或对阿司匹林过敏

B: 严重主动脉瓣狭窄或肥厚型梗阻性心肌病的心绞痛患者优先使用硝酸酯类药物

C: 稳定型心绞痛患者合并高血压、糖尿病、心力衰竭可选用卡托普利、依那普利等药物

D: 发作时可舌下含服作用较快的硝酸酯类制剂

答案：B

67. 由服用利尿药所引起的尿失禁属于

A: 真性尿失禁

B: 急迫性尿失禁

C: 压力性尿失禁

D: 急性、可逆性/暂时性尿失禁

答案：D

68. 下列高血压的降压目标普通高血压患者

A: <140/90mmHg

B: <150/80mmHg

C: <120/80mmHg

D: <130/80mmHg

答案：A

69. 药师在指导患者合理用药时应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是()

- A: 异烟肼与牛奶同服
- B: 左甲状腺素与钙剂同服
- C: 硫酸亚铁与维生素 C 同服
- D: 华法林与人参同服

答案：C

70. 属于胃黏膜保护剂的是（）

- A: 铝碳酸镁
- B: 法莫替丁
- C: 埃索美拉唑
- D: 多潘立酮

答案：A

71. 阿司匹林可导致药源性肾病的机制是

- A: 不可逆性肾小管坏死
- B: 结晶沉积
- C: 前列腺素合成障碍
- D: 肾小球滤过率下降

答案：C

72. 高胆固醇血症，首选的治疗药物是

- A: 烟酸类
- B: ω -3 脂肪酸制剂

C: 他汀类

D: 贝特类

答案: C

73. (2017 年真题) 用于评价肝功能不全严重程度的是 ()

A: 数字评分法

B: APACHE 评分系统

C: CTP 评分标准

D: Cochrane 证据分级

答案: C

74. 患者，男，43 岁。误服过量工业碘，可中和碘，用于碘中毒的洗胃液是

A: 牛奶与水等量混合

B: 3%~5%鞣酸溶液

C: 淀粉溶液

D: 活性炭混悬液

答案: C

75. 轻症、慢性疾病适宜选用的给药途径是

A: 腔道给药

B: 肌肉注射

C: 外用给药

D: 口服给药

答案: D

76. 滴虫性阴道炎宜选用

A: 制霉菌素

B: 林可霉素

C: 甲硝唑

D: 庆大霉素

答案: C

77. 根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别属于妊娠毒性 B 级的药物是

A: 万古霉素

B: 阿莫西林

C: 葡萄糖

D: 沙利度胺

答案: B

78. 应用华法林抗凝治疗时，INR 的安全有效范围在我国通常为

A: 2.0~2.5

B: 2.0~3.0

C: >3.0

D: <2.0

答案: B

79. 已知 1%(g/ml) 枸橼酸钠溶液的冰点降低值为 0.185℃，计算其等渗溶液的浓度是

A: 2.4(%g/ml)

B: 3.0(%g/ml)

C: 2.8(%g/ml)

D: 2.6(%g/ml)

答案: C

80. (2015 年真题) 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160/105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol/L (参考范围 <7.8mmol/L)，甘油三酯 1.52mmol/L (参考范围 0.56~1.70mmol/L)，总胆固醇 6.26mmol/L (参考范围 <5.2mmol/L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol/L (参考范围 2.1~3.1mmol/L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol/L (参考范围 1.2~1.65mmol/L)，肌酐 $60 \mu\text{mol/L}$ (参考范围 $45 \sim 84 \mu\text{mol/L}$)，蛋白尿：++。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 不必限盐
- B: 控制体重
- C: 减少脂肪摄入
- D: 适当运动

答案：A

81. 在一定范围内，其水平与动脉粥样硬化和冠心病的发生、发展呈负相关的指标是 ()

- A: HDL-C
- B: TG
- C: HbA1c
- D: LDL-C

答案：A

82. 成人末梢血白细胞的参考范围是

- A: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$
- B: $(4.0 \sim 5.5) \times 10$
- C: $(15.0 \sim 20.0) \times 10$
- D: $(3.5 \sim 10.0) \times 10$

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/827144200052010024>