

2024 年广东省专升本考试大学医学综合测试卷

一、单选题

1、女，62 岁。诊断为胃癌。查体：血压：150/100mmHg，消瘦，重度贫血。下列术前准备中，不必要的项目是()

- (A)纠正贫血
- (B)血压降至正常
- (C)检测肝功能
- (D)改善营养状态

2、参与骨盆构成的骨有（）

- (A)尾骨
- (B)耻骨
- (C)坐骨
- (D)骶骨
- (E)髌骨

3、有助于鉴别肾前性和肾后性急性肾衰竭的检查是（）

- (A)肾穿刺活检
- (B)血常规
- (C)血尿素氮和肌酐
- (D)磁共振水成像
- (E)每小时尿量

4、肾窦内含有的结构有（）

- (A)肾静脉的属支
- (B)肾大盏

(C)肾小盏

(D)肾动脉的分支

(E)肾盂

5、男，50岁。体重70kg。该患者体内的细胞外液量约为（）

(A)16000mL

(B)12000mL

(C)14000mL

(D)20000mL

(E)18000mL

6、可做向前和向后运动的关节是（）

(A)踝关节

(B)肘关节

(C)桡腕关节

(D)肩关节

(E)颞下颌关节

7、增加冠脉血流量最主要的因素是（）

(A)交感神经兴奋

(B)迷走神经兴奋

(C)血管紧张素II分泌增多

(D)心肌代谢增强

(E)血管升压素分泌增多

8、衡量细胞兴奋性大小的常用指标是()

(A)静息电位大小

- (B)阈强度大小
- (C)动作电位幅度
- (D)动作电位宽度

9、不属于机体内环境的体液是（）

- (A)淋巴液
- (B)组织液
- (C)血浆
- (D)脑脊液
- (E)细胞内液

10、交感缩血管神经节后纤维释放的神经递质是（）

- (A)5-羟色胺
- (B)肾上腺素
- (C)P 物质
- (D)乙酰胆碱
- (E)去甲肾上腺素

11、引起等渗性缺水的原因是【】

- （A）摄入水量不足
- （B）水分丧失过多
- （C）补充等渗盐水过多
- （D）胃肠道消化液急性丧失
- （E）补充高渗葡萄糖液过多

12、输血的目的不包括（）

- (A)杀灭细菌，抗感染

(B)纠正贫血

(C)改善凝血功能

(D)对出血患者补充血容量

(E)提高血浆蛋白

13、汇合形成上腔静脉的是()

(A)颈内静脉与锁骨下静脉

(B)左、右头臂静脉

(C)颈内静脉与奇静脉

(D)颈外静脉与锁骨下静脉

14、与组织液中含量基本相同的血浆成分是（）

(A)球蛋白

(B)纤维蛋白原

(C)清蛋白

(D)透明质酸

(E)电解质

15、烧伤患者早期抗休克应先补充（）

(A)电解质溶液

(B)血浆

(C)5%葡萄糖溶液

(D)10%葡萄糖溶液

(E)全血

16、呼吸的全过程不包括（）

(A)肺牵张反射

- (B)细胞内氧化代谢
- (C)组织换气
- (D)肺通气和肺换气
- (E)气体在血液中的运输

17、两侧同时收缩，使脊柱后伸的肌是（）

- (A)背阔肌
- (B)竖脊肌
- (C)胸大肌
- (D)斜方肌
- (E)腹直肌

18、最常见于老年人额头部的灰黑色斑块是（）

- (A)乳头状疣
- (B)黑色素瘤
- (C)老年斑
- (D)黑痣
- (E)皮肤癌

19、二尖瓣关闭不全典型的体征是（）

- (A)心尖部闻及收缩期吹风样高调杂音
- (B)胸骨左缘第2肋间闻及 GrahamStell 杂音
- (C)心尖部闻及舒张中期杂音
- (D)胸骨左缘第3肋间闻及收缩期粗糙杂音
- (E)胸骨左缘第2肋间闻及连续性杂音

20、女，30岁。寒战、发热4天。查体：右侧肋脊点、肋腰点压痛阳性。首选的辅助检查是（）

(A)肾功能

(B)腹部B超

(C)粪便常规

(D)尿常规

(E)结肠镜

21、属于腹膜内位的器官是【】

（A）肝

（B）胆囊

（C）胃

（D）胰

（E）子宫

22、根据烧伤早期补液的原则，第一个8小时内，应该输入第一天总液体量的【】

（A）1 / 6

（B）1 / 3

（C）1 / 4

（D）1 / 5

（E）1 / 2

23、提高心肌传导性的因素是（）

(A)静息电位减小

(B)钠电流被阻断

(C)钠通道数量减少

(D)动作电位除极化速度增大

(E)阈电位水平抬高

24、组织液与血液各种成分的主要区别是【】

(A) 大分子蛋白质

(B) 有机酸

(C) 钠离子

(D) 钾离子

(E) 钙离子

25、阻塞性通气功能障碍患者肺功能改变的特点是（）

(A)一秒率降低

(B)通气/血流比例失调

(C)气速指数 >1.0

(D)残气量减少

(E)肺活量增加

26、小儿头颈部烧伤所占体表面积百分比是【】

(A) 9%

(B) $[9+(12-\text{年龄})]\%$

(C) 12%

(D) $9\%\times 2$

(E) $(9+\text{年龄})\%$

27、动脉血压升高时心动周期主要的变化是【】

(A) 等容收缩期延长

(B) 房缩期延长

- (C) 快速射血期延长
- (D) 减慢射血期延长
- (E) 心室舒张期延长

28、男，45岁。因突发上腹痛并迅速向全腹蔓延3小时就诊。查体：T38.8℃。全腹压痛及反跳痛阳性，肝浊音界消失。最可能的诊断是（）

- (A) 急性胃穿孔
- (B) 急性胃肠炎
- (C) 急性肠梗阻
- (D) 急性胰腺炎
- (E) 急性胆管炎

29、支配小腿后群肌的神经是【】

- (A) 胫神经
- (B) 股神经
- (C) 腓浅神经
- (D) 闭孔神经
- (E) 腓深神经

30、肠外营养所致的并发症有（）

- (A) 腹胀
- (B) 腹泻
- (C) 低血糖
- (D) 高脂血症
- (E) 高血糖

31、自主神经节前纤维释放的递质是（）

- (A)多巴胺
- (B)腺苷
- (C)谷氨酸
- (D)甘氨酸
- (E)乙酰胆碱

32、引起肝颈静脉回流征阳性的常见病症是（）

- (A)右心衰竭
- (B)下腔静脉阻塞
- (C)门脉高压症
- (D)左侧胸腔积液
- (E)肝功能衰竭

33、下列描述中属于症状的是()

- (A)脾大
- (B)心脏杂音
- (C)肺部啰音
- (D)心悸

34、男，70 岁。近 1 周间断排黑便，近期体重下降 4kg。为明确诊断应首选的检查方法是

【】

- (A) 腹部 B 超
- (B) 胃镜+活组织病理
- (C) 消化道钡剂造影
- (D) 粪便常规
- (E) 腹部 CT

35、调节产热活动最重要的体液因素是()

- (A)甲状腺激素
- (B)甲状旁腺激素
- (C)胰岛素
- (D)生长激素

36、初期心肺复苏的任务和步骤归纳为“CAB”，其“B”的含义是【】

- (A) 保持呼吸道顺畅
- (B) 有效的人工通气
- (C) 建立紧急医疗服务系统
- (D) 早期识别
- (E) 建立有效的人工循环

37、脊髓前角 α 神经元兴奋，可引起变化是【】

- (A) 腱器官传入冲动减少
- (B) 梭内肌收缩
- (C) γ 传出冲动增加
- (D) 梭外肌收缩
- (E) 肌梭传入冲动增加

38、下列监测值中不正确的是（）

- (A)CVP 的正常值为 5~12cmH₂O
- (B)心排血量的正常值为 4~6L/min
- (C)PCWP 的正常值为 6~15cmH₂O
- (D)动脉血乳酸盐的正常值为 1~15mmol/L

(E)血 pH 的正常范围为 7.35~7.45

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/828014006124006050>