
2020 年度传染病预防知识试题

传染病试题库

一、选择题

1. 伤寒的玫瑰疹常出现在病程的

- A、1~6 天
- B、7~13 天**
- C、14~20 天
- D、21~28 天
- E、28 天以后

答案：139、B

2. 伤寒慢性带菌者哪个器官隐藏的细菌最多

- A、肝
- B、胆**
- C、脾
- D、肾
- E、肠道淋巴结

答案：145、B

3. 辐射消毒法不包括

- A、紫外线
- B、红外线
- C、高能电子束
- D、β 射线**
- E、γ 射线

答案：120、D

4. 下列出疹性传染病，按出疹出现的先后排列，依次为

- A、猩红热、天花、水痘、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- B、猩红热、风疹、水痘、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- C、天花、水痘、猩红热、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- D、水痘、天花、猩红热、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- E、水痘、猩红热、天花、麻疹、斑疹伤寒、伤寒**

答案：128、E

5. 提高人群免疫力起关键作用的是

- A、改善营养

B、锻炼身体

C、预防接种

D、防止感染

E、预防服药

答案：130、C

6. 下列哪项不属于传染源

A、病人

B、病原携带者

C、隐性感染者

D、易感者

E、受感染的动物

答案：131、D

7. 男，35岁，反复乏力、食欲不振4年，腹胀、尿少1周，发热1天，查：T36、5℃，腹部压痛及反跳痛，移动性浊音阳性。需立即进行哪项检查

A、腹部B超

B、X线摄片

C、血培养

D、腹水生化检查

E、腹水常规+腹水培养

答案：26、E

8. 男，18岁。急起腹泻呕吐24小时，大便30余次，米泔水样，体查：BP：70 / 50mmHg，皮肤弹性差，眼窝凹陷，诊断为“霍乱”。目前首先要采取的治疗方法是

A、口服环丙沙星

B、静脉注射青霉素G

C、静脉补液

D、血管活性药物

E、口服磺胺嘧啶

答案：22、C

9. 肝性脑病时，为减少肠道有毒物质的产生，首选哪种抗菌药物

A、青霉素大剂量静脉输入

B、氯霉素

C、红霉素

D、磺胺嘧啶

E、新霉素或阿米卡星口服

答案：20、E

10. 中毒性菌痢的临床表现是

- A、体温正常
- B、剧烈腹痛
- C、尿频尿痛
- D、血压下降**
- E、里急后重明显

答案：100、D

11. 霍乱在我国的流行特点为

- A、空气传播
- B、接触传播
- C、水传播
- D、食物传播**
- E、苍蝇传播

答案：110、C

12. 典型霍乱在吐泻期的表现应无

- A、无痛性剧烈腹泻
- B、里急后重**
- C、大便每天数次至数十次，甚至无数次
- D、米泔水样或洗肉水样便
- E、先腹泻后呕吐，成人一般无发热

答案：115、B

13. 慢性菌痢是指菌痢的病程超过

- A、1个月
- B、2个月**
- C、3个月
- D、4个月
- E、6个月

答案：89、B

14. 菌痢的主要传染源是

- A、带菌的人**
- B、猪
- C、重型菌痢病人
- D、狗
- E、蔬菜

答案：96、A

15. 我国预防血吸虫病的重点措施是：C

A、灭螺B、普治C、灭螺和普治D、粪便和水源管理E、保护易感人群

16. 关于传染病的基本特征哪项是错的E

A、有病原体B、有传染性C、有流行性D、某些传染病有地方性和季节性
E、病后均有巩固免疫力

17. 预防乙肝最主要的措施是：A

A、接种乙肝疫苗B、隔离治疗病人C、消灭苍蝇蟑螂
D、加强医院内消毒和献血员筛检E、接种丙种球蛋白

18. 下列哪项是脑膜炎球菌的正确特性D

属奈瑟菌属，革兰染色阳性B、能产生毒力较强的外毒素
C、在脑脊液及瘀点涂片中，该菌多在中性粒细胞外，少数在细胞内
D、抵抗力弱，在体外能产生自溶酶而易于自溶E、在含胆汁的培养基上生长良好

19. 下列哪项不为传染源C

A、显性感染B、隐性感染C、潜伏性感染D、病原携带状态E、受感染的动物

20. 确诊疟疾最简便而迅速的方法是：A

A、血涂片B、血培养C、骨髓培养D、骨髓涂片E、酶联免疫吸附试验

21. 下列哪项不属于传染病流行病学资料内容E

A、年龄、性别B、卫生习惯C、预防接种史D、发病季节E、热型

22. 治疗血吸虫病的首选药物是：E

A、酒石酸锑钾B、血防 846C、硝硫氰胺D、呋喃丙胺E、吡喹酮

23. 血清中出现表示体内有乙肝病毒活跃复制的是

答案：31、C

32~34 题

A、病毒量少，毒力弱，部分肝细胞受损
B、病毒持续繁殖，肝细胞几乎无损伤
C、病毒不能彻底清除，肝细胞不断受损
D、病毒量多，毒力强，较多肝细胞受损
E、大量肝细胞坏死

24. 麻疹应实行

答案：40、E

25. 下列措施中有助于防止细菌耐药性的是：（ABCDE）

- A、院内严格执行消毒隔离措施，防止耐药菌交叉感染
- B、对细菌耐药性监测，并将监测资料提供给临床参考
- C、临床医师严格掌握抗微生物药物的适应证
- D、临床医师在临床工作中要按要求洗手
- E、寻找和开发新的抗微生物药物

26. 喹诺酮类抗微生物药物的特点包括：（ABCDE）

- A、新品种对革兰阳性菌和革兰阴性菌、厌氧菌均具有较强的抗菌活性
- B、口服吸收好，体内分布广，细胞内浓度高，对胞内细菌作用好
- C、半衰期长，多经肾脏排泄，尿中浓度高
- D、孕妇和小儿发育不良者慎用，大剂量静脉注射可致抽搐
- E、作用于DNA旋转酶，是杀菌剂

27. HIV不会通过的途径传播是：（B）

- A、输血
- B、握手
- C、母婴
- D、共用注射器注射
- E、性接触

28. 病毒性肝炎应实行

答案：41、B

29. 脑膜炎双球菌感染首选：（A）

- A、大剂量青霉素
- B、小剂量青霉素
- C、四环素
- D、磺胺药
- E、氯霉素

30. 当细菌入侵艾滋病患者后下列哪项病理变化是错误的

- A、全身淋巴结可肿大
- B、炎症反应强烈
- C、炎症反应低下
- D、病原体不易被消灭
- E、胸腺退变及萎缩改变

答案：B

31. 人体被病原体侵袭后不出现或仅表现轻微症状但通过免疫学的检测可发现入侵者的抗体称为

- A、轻型病例
- B、隐性感染
- C、恢复期病人

D、潜在性感染

E、健康携带者

答案：B

32. 下列哪项是胆道蛔虫症的特点

A、上腹钻顶样痛及反跳痛

B、上腹钻顶样痛但体征轻微

C、起病后呈持续性疼痛，阵发性加剧

D、起病缓慢，多在进油腻食物后发作

E、疼痛，高热，黄疸是其重要表现

答案：B

33. 4岁男孩，病程半月，先低热6天，3天后出现肢体疼痛，继而出现左侧肢体运动障碍。查体，左下肢膝腱反射消失，肌力III级。脑脊液生化常规蛋白阳性，细胞数为12个。其诊断应考虑

A、病毒性脑炎

B、结核性脑炎

C、化脓性脑膜炎

D、脊髓灰质炎

E、吉兰-巴雷综合征

答案：D

34. 被甲类传染病病原体污染的污水、污物、粪便、有关单位和个人必须按照以下规定进行处理

A、在卫生防疫机构的指导监督下进行严密消毒后处理

B、在卫生防疫机构指导下进行消毒处理

C、自行进行严密消毒后处理

D、由卫生防疫机构进行消毒处理

E、在医疗机构的指导监督下进行消毒处理

答案：A

35. 下列哪项不是脑囊虫病的临床型

A、脑室型

B、脑实质型

C、软脑膜型

D、脊髓型

E、末梢神经型

答案：E

36. 地方性斑疹伤寒与流行性斑疹伤寒最重要的鉴别点是

- A、临床症状轻重不一
- B、流行与散发不同
- C、皮疹多少不一
- D、外斐反应
- E、接种后豚鼠阴囊反应不一样

答案：E

37. 肝炎肝硬化主要阻塞部位

- A、肝静脉
- B、窦前
- C、窦后
- D、门静脉
- E、上腔静脉

答案：B

38. 能代表病毒体的是病毒的

- A、核酸
- B、衣壳
- C、核衣壳
- D、包膜
- E、刺突

答案：C

39. 下列哪项检测可作为SARS的确诊依据

- A、外周血白细胞计数降低
- B、淋巴细胞计数减少
- C、CD3 ↑+、CD4 ↑+、CD8 ↑+T淋巴细胞显著减少
- D、IFA和ELISA法检测SARS病人血清特异性抗体，恢复期抗体滴度比急性期升高4倍以上
- E、胸部X线检查肺部有片状、斑片状阴影或网状改变

答案：66、D

40. SARS的潜伏期是

- A、2周
- B、1个月
- C、2个月
- D、3个月
- E、半年

答案：61、A

41. 下列哪项对急性重症肝炎的诊断价值最小

- A、肝性脑病
- B、深度黄疸
- C、SGPT>500U
- D、 γ -球蛋白
- E、PTA<40%

答案：15、D

42. 丙型肝炎病毒下列哪项叙述不正确

- A、为单股正链RNA病毒
- B、可应用血源疫苗免疫以预防感染
- C、血清中检测出anti-HCV提示有感染
- D、血清中可检测病毒RNA
- E、绝大多数为血源传播

答案：B

43. 对慢性乙型肝炎（中度）的治疗除哪项外可有以下原则

- A、禁酒、避免劳累、适当休息
- B、可用保肝、降酶、退黄药物
- C、应用免疫调节药物
- D、抗病毒治疗
- E、注射乙肝疫苗

答案：E

44. 下列疾病中除外哪项均为肠道传染病

- A甲肝B流脑C伤寒D霍乱E菌痢

答案B

45. 男，32岁，10天来腹痛、腹泻，每日大便4~6次，呈暗红色果酱样。体检右下腹压痛。粪便镜检红细胞（），白细胞（）。白细胞为 $9.1 \times 10^9/L$ ，红细胞 $3.7 \times 10^9/L$ 、对本例诊断最有参考价值的实验室检查是

- A、粪便涂片检菌
- B、粪便培养致病菌
- C、粪便镜检寄生虫卵
- D、粪便镜检溶组织内阿米巴包囊
- E、粪便镜检溶组织内阿米巴滋养体

答案：E

46. 男，22岁，民工，4天来发热、头晕、头痛、食欲减退。体检皮肤有少量散在淡红色斑丘疹，脾于侧位肋下1cm，外斐反应变形杆菌OX19凝集试验阳性。本例的诊断为

A、伤寒

B、地方性斑疹伤寒

C、感冒

D、流行性出血热

E、猩红热

答案：B

47. 男，29岁，地质控矿工作，有野外宿营史，近日高热39℃，畏寒，头痛，身痛乏力，体检：面红，结膜充血，右腹股沟处见一椭圆形焦痂，黑焦色，周围有红晕，右腹股沟淋巴结肿大，血白细胞计数未见升高，皮肤有暗红色斑丘疹。患者应首先考虑下列哪项诊断

A、恙虫病

B、地方性斑疹伤寒

C、流行性出血热

D、钩体病

E、败血症

答案：A

48. 男性，38岁，患肝硬化3年。一周来畏寒发热，体温38℃左右，全腹痛，腹部明显膨隆，尿量500ml/日。住院后经检查有以下体征，对目前病情判断最有意义的是

A、蜘蛛痣及肝掌

B、腹壁静脉曲张呈海蛇头样

C、脾肿大

D、全腹压痛及反跳痛

E、腹部移动性浊音阳性

答案：D

49. 男，28岁，3年来反复乏力、纳差、肝区隐痛，血清转氨酶反复升高，血清球蛋白升高，类风湿因子阳性。查体：可见肝掌及蜘蛛痣，肝右肋下未及，脾肋下1、5cm、化验：肝功ALT340U/L，T-Bil71μmol/L，HBV标志物为HB-sAg、anti-HBe、anti-HBc阳性。

对此病例的诊断应为

A、慢性乙型肝炎

B、慢性迁延性肝炎

C、慢性重型肝炎

D、类风湿性关节炎

E、胆道感染

答案：A

50. 10岁男孩，近7天来食欲不振、恶心、呕吐，伴乏力、尿黄来医院就诊。病前两周曾注射过丙种球蛋白1支。检查：巩膜黄染，肝肋下1、5cm，有轻度触痛，脾肋下未触及。化验：肝功ALT680U/L，AST460U/L、T-Bil76、5 μ mol/L，anti-HAV-IgM阳性，anti-HAV-IgG阳性，HBsAg阳性，HBeAg阳性，anti-HBc-IgM阳性。应诊断为

- A、急性乙型肝炎，甲型肝炎病毒携带者
- B、急性甲型肝炎，慢性乙型肝炎
- C、急性乙型肝炎，既往感染过甲型肝炎
- D、被动获得甲型肝炎抗体，急性甲型肝炎，乙型肝炎病毒携带
- E、被动获得甲型肝炎抗体，急性乙型肝炎

答案：C

51. 男，45岁，湖南打工人员，因反复腹泻两年，有时粪便带粘液脓血。查体：心肺无异常，肝剑下3cm，质中，脾肋下3、5cm，质硬。化验：血常规WBC7、6乘以十的九次方/L，中性

62%，嗜酸性10%，大便常规为粘液脓血便，镜检RBC/HP，WBC/HP、
该患者的第一诊断应考虑

- A、慢性细菌性痢疾
- B、慢性血吸虫病
- C、丝虫病
- D、溃疡性结肠炎
- E、疟疾

答案：B

应做进一步检查不包括

- A、肝脾B超检查或腹部CT检查
- B、血清血吸虫抗体检查
- C、结肠镜活检
- D、粪便检查虫卵或孵育毛蚴
- E、骨髓穿刺，检查骨髓象

答案：E

应选用哪种治疗方法

- A、氯喹，第1天1000mg、第2、3天各750mg
- B、吡喹酮，总剂量为40mg/kg，分1~2次，1日服用
- C、吡喹酮，总剂量为60mg/kg，分2日，4~6次服用
- D、乙胺嗪0、2g/d，3/d，连服7天
- E、吡喹酮，总剂量为120mg/kg，4~6天，每日剂量分3次服

答案：C

52. 下列描述流行性出血热哪项不正确

- A、由汉坦病毒引起

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/828031064076006036>