泌尿外科学(医学高级)：泌尿外科诊断学基础题试题及答案一

1、单选　肝硬化病人可出现腹水的血清白蛋白至少低于（）

A.20g／L

B.20g／L

C.30g／L

D.40g／L

E.25g／L

正确答案：C

2、单选（江南博哥）　前侧壁心肌梗死出现特征性 ECG 改变的导联是（）

A.V1、V2、V3

B.Ⅱ、Ⅲ、aVF

C.V3、V4、V5

D.Ⅰ、aVL、V4、V5

E.Ⅰ、aVL

正确答案：D

3、多选　完全性左束支传导阻滞的心电图诊断包括（）

A.V5、V6 导联出现 R 峰时间>0.06s

B.ST-T 方向与 QItS 主波方向相反

C.Ⅰ、V5、V6 导联 q 波一般消失

D.S 时限≥0.12s

E.V1、V2 导联呈 IS 波，或呈 QS 波

正确答案：A，B，C，D，E

4、单选　关于尿蛋白 SDS 圆盘电泳的说法，错误的是（）

A.分子量大的蛋白泳带越靠后

B.肾小球损伤性疾病其蛋白泳带靠清蛋白及清蛋白以下

C.整个肾单位受损的疾病其蛋白电泳区带以清蛋白区带为主

D.肾小管损伤性疾病其蛋白泳带靠清蛋白及清蛋白以下

E.分子量小的蛋白泳带越靠前

正确答案：B

5、多选　心电图运动实验的方法包括（）

A.踏车运动实验

B.Master 二级梯运动实验

C.散步后的心电图

D.长跑后的心电图

E.平板运动实验

正确答案：A，B，E

6、单选　留 24h 尿测定 17-OH、17-KS 应加的防腐剂是（）

A.二甲苯

B. 浓盐酸
C. 浓乙醇
D. 三氯甲烷
E. 甲醛
正确答案：B
7、单选　慢性肾盂肾炎患者肾功能的最初表现为（）
A. 内生肌酐清除率降低
B. 肾小球滤过率降低
C. 肾血流量降低
D. 血清尿素氮升高
E. 尿液比重降低
正确答案：E
8、单选　对早期糖尿病诊断有参考价值的是（）
A. 尿 FDP 增高
B. β2-微球蛋白增高
C. 尿微量清蛋白增高
D. α1-M 增高
E. 尿 NAG 增高
正确答案：C
9、单选　有关梅毒螺旋体的描述，错误的是（）
A. 能通过胎盘且感染胎儿
B. 电镜下可见细胞壁和细胞膜
C. 能在不含活细胞的人工培养基上生长繁殖
D. 革兰染色不易着色
E. 人是其唯一宿主
正确答案：C
10、单选　可引起呼吸性酸中毒的是（）
A. 慢性阻塞性肺疾病
B. 大量使用水杨酸类药物
C. 严重低血氯
D. 库欣综合征
E. 尿毒症
正确答案：A
11、单选　血清 LDH 不升高的疾病是（）
A. 骨骼肌损伤
B. 慢性支气管炎
C. 恶性肿瘤
D. 急性心肌梗死

E.肝硬化
正确答案：B
12、多选　针对 A 亚型，血型鉴定及配血时应注意（）
A.A1、A2 亚型之间输血会引起输血反应
B.血型鉴定时要加用 O 型血清
C.A1 亚型的红细胞上有 A 和 A1 抗原，血清中含有抗 B 抗体
D.有 A1、A2、A3、AX、Am 等亚型
E.A2 亚型的红细胞上有 A2 抗原，血清中含有抗 B、抗 A，抗体
正确答案：A，B，C，D，E
13、单选　一冠心病患者，突发心前区不适，呈下颌呼吸，血压测不到，心电监测图显示 QRS-T 波消失，出现大小不等，极不匀齐的低小波，频率 200～500 ／min，应考虑为（）
A.心房扑动
B.心房颤动
C.心室扑动
D.心室颤动
E.以上都不是
正确答案：D
14、单选　某女性患者 3 年前诊断为 SLE，在治疗过程中出现鼻衄、月经过多现象，检查结果为血小板 66×10/L，APTT90s（正常对照 39s）；PT17s（13s）；与正常入血浆混合后上述两个实验结果不变。TT20s（正常对照 17s）；纤维蛋白原定量为 2g／L 病人体内游离肝素时间为 TT25s，甲苯胺蓝中和后 TT24s，其出血原因可排除（）
A.肝素类抗凝物质过多
B.狼疮样抗凝物质过多
C.因子Ⅹ功能障碍
D.纤维蛋白原缺乏症
E.维生素 K 缺乏症
正确答案：A
15、单选　有关螺旋体的描述错误的是（）
A.大部分螺旋体目前尚不能人工培养
B.常规革兰染色镜检
C.常用暗野显微镜观察形态
D.属于原核细胞型微生物
E.细长、柔软、运动活泼
正确答案：B
16、单选　可引起夜尿增多的疾病是（）
A.糖尿病

B.慢性肾炎
C.急性肾小球肾炎
D.高血压
E.肾动脉硬化
正确答案：B
17、单选　不会引起孕酮增高的疾病有（）
A.妊娠高血压综合征
B.多囊卵巢综合征
C.卵巢肿瘤
D.多胎妊娠
E.葡萄胎
正确答案：B
18、单选　可以通过胎盘的 Is 是（）
A.IgA
B.IgE
C.IgG
D.IgM
E.IgD
正确答案：C
19、单选　与冠心病的发生危险性呈负相关的是（）
A.CM
B.LDL
C.HDL
D.VLDL
E.LPA.
正确答案：C
20、单选　AST 含量最丰富的是（）
A.肝脏
B.线粒体
C.心肌
D.骨骼肌
E.肾脏
正确答案：C
21、单选　心肌中主要存在的肌酸激酶同工酶是（）
A.CK-MB
B.CK-MM1
C.CK-MM3
D.CK-BB

E.CK-MM2
正确答案：A
22、单选　变异心绞痛与心肌梗死在心电图上的鉴别点是（）
A.T 波异常高耸
B.T 波呈冠状 T
C.病理性 Q 波
D.频发室性早搏
E.S-T 段上抬
正确答案：C
23、单选　正常人禁饮尿渗量为（）
A.300～400mOsm / kgH2O
B.275～305mOsm / kgH2O
C.500～800mOsm / kgH2O
D.1500mOsm / kgH2O
E.600～1000mOsm / kgH2O
正确答案：E
24、单选　没有昼夜节律性变化的激素是（）
A.血浆醛固酮
B.睾酮
C.VMA
D.ACTH
E.甲状腺素
正确答案：E
25、多选　蹲位最适用于检查（）
A.直肠息肉
B.直肠脱出
C.前列腺
D.内痔
E.盆腔病变
正确答案：A，B，D
26、单选　AFP 对肝癌的诊断阈值是（）
A.1000μg / L
B.300μg / L
C.30μg / L
D.25μg / L
E.250bμg / L
正确答案：B
27、多选　急性白血病的特征有（）

A.贫血、出血、感染
B.细胞分化差、自然病程短
C.急性淋巴细胞白血病多见于成年人
D.骨髓增生极度活跃，外周血有幼稚细胞
E.都表现为肝、脾肿大
正确答案：A，B，D
28、单选　脑脊液静置 12～24h 后出现纤细的薄膜可能是（）
A.椎管炎
B.化脓性脑膜炎
C.结核性脑膜炎
D.脑梗死
E.蛛网膜下腔出血
正确答案：C
29、单选　某患者长期服用大剂量皮质激素，突然出现肢体软瘫，此时应立即检查的项目是（）
A.血铁
B.血镁
C.血钠
D.血钙
E.血钾
正确答案：E
30、单选　MM 中最常见的 Ig 类型是（）
A.IgD
B.IgE
C.IgG
D.IgA
E.IgM
正确答案：C
31、单选　对血清阴离子间隙(AG)描述错误的是（）
A.AG 是指血清中被测阳离子与阴离子之差
B.酮症酸中毒可致血清 AG 降低
C.血清 AG 水平主要受有机酸根、HPO42-、SO42-等酸性物质影响
D.乳酸性酸中毒可致血清 AG 升高
E.低血钾、低血钙症可致血清 AG 升高
正确答案：B
32、多选　与心律失常密切相关的心肌细胞特性包括（）
A.自律性
B.自动性

C.传导性
D.兴奋性
E.收缩性
正确答案：A，C，D
33、单选　表明乙肝病毒复制并具有较强的传染性的指标是（）
A.HBsAg 阳性
B.HBeAg 阳性
C.抗 HBsAb 阳性
D.抗 HBeAb 阳性
E.抗 HBcAb 阳性
正确答案：B
34、单选　脑脊液静置 1～2h 后出现凝块或沉淀物可能是（）
A.结核性脑膜炎
B.脑梗死
C.化脓性脑膜炎
D.蛛网膜下腔出血
E.椎管炎
正确答案：C
35、单选　不能引起血氯升高的是（）
A.心功能不全
B.呼吸性酸中毒
C.肾功能不全少尿期
D.肾上腺皮质功能亢进
E.呼吸性碱中毒
正确答案：B
36、单选　多见于肾病综合征的管型是（）
A.颗粒管
B.蜡样管型
C.脂肪管型
D.细胞管型
E.透明管型
正确答案：C
37、单选　不会引起血清尿素氮升高的疾病是（）
A.高蛋白饮食
B.心力衰竭
C.急性肾炎
D.上消化道出血
E.肝功能衰竭

正确答案：E
38、多选　含有丝氨酸活性中 心的是（）
A. Ⅻ
B. Ⅺ
C. 凝血酶
D. Ⅸ
E. Ⅹ
正确答案：A，B，C，D，E
39、单选　关于尿胆红素的描述，正确的是（）
A. 阻塞性黄疸时，尿胆红素强阳性
B. 肝细胞性黄疸时，尿胆红素阴性
C. 溶血性黄疸时，尿胆红素明显升高
D. 严重肾损伤时，尿胆红素明显升高
E. 正常时，尿胆红素阳性
正确答案：A
40、单选　肥厚性胃炎的内镜所见不包括（）
A. 黏膜充血、斑片状发红
B. 皱襞粗大似脑回状，充血不能展平
C. 胃内分泌物增多，常伴糜烂
D. 黏膜肥厚、水肿
E. 颜色深红似牛肉状
正确答案：A
41、单选　鉴别 SARS 感染最准确的方法是（）
A. 巢式 RT-PCR
B. RT-PCR
C. 细胞培养
D. ELISA
E. 免疫荧光试验
正确答案：C
42、单选　醛固酮的作用是（）
A. 保钾排钠
B. 调节钙磷代谢
C. 调节酸碱平衡
D. 保钠排钾
E. 以上均不对
正确答案：D
43、单选　脑脊液性状的临床意义，错误的是（）
A. 黄色因红细胞在脊液溶解

B.损伤第一管血性，第二、三管颜色变浅
C.蛛网膜下腔出血离心后上清液为五色
D.红色见于穿刺损伤或蛛网膜下腔出
E.蛛网膜下腔出血三管均为血性
正确答案：C
44、多选　急性心肌梗死的心电图诊断包括（）
A."损伤性"改变，S-T 弓背型明显抬高与 T 波形成单向曲线
B."缺血性"改变，出现对称性 T 波倒置
C."缺血性"改变，出现 ST 段水平型下移及 T 波倒置
D.QRS 波群电压增高
E."坏死性"改变，出现异常 Q 波或 QS 波
正确答案：A，B，E
45、单选　某患者，心电图表现为：P 波高尖，振幅为 0．30mV，P 波时间 0．08s，以Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联最为明显，应考虑为（）
A.左房肥大
B.双房肥大
C.右房肥大
D.左室肥大
E.右室肥大
正确答案：C
46、单选　退出胃镜时应注意的事项是（）
A.注气
B.尽量抽气，防止腹胀
C.患者深吸气
D.作吞咽动作减少恶心
E.将胃镜先端右旋 90°
正确答案：B
47、单选　窦性心动过缓的频率为（）
A.<70／min
B.<60／min
C.50～60／min
D.<50／min
E.<40／min
正确答案：B
48、单选　浆膜腔积液黏蛋白定性试验的等电点是（）
A.6～7
B.7～8
C.3～5

D.8～9
E.5～6
正确答案：C
49、单选　可有血清铜升高的疾病中，除外（）
A.心肌梗死
B.贫血
C.肾病综合征
D.风心病
E.白血病
正确答案：C
50、多选　运动实验的禁忌证包括（）
A.不稳定型心绞痛
B.急性心肌梗死或心肌梗死合并室壁瘤
C.严重主动脉瓣狭窄
D.心力衰竭
E.肺栓塞
正确答案：A，B，C，D，E
51、单选　正常前列腺液红细胞为（）
A.<10／HP
B.<1／HP
C.<3／HP
D.<15／HP
E.<5／HP
正确答案：E
52、单选　常见诊断失误的原因不包括（）
A.尽可能用同一种疾病去解释多种临床表现
B.病史资料不完整、不确切
C.观察不细致或检查结果误差较大
D.先入为主、主观臆断
E.医学知识不足，缺乏临床经验
正确答案：A
53、单选　诊断肝性脑病最有参考价值的是（）
A.血气分析
B.ALT 测定
C.脑电图检查
D.AFP 测定
E.血氨测定
正确答案：E

54、多选　手足徐动见于（）
A.肝豆状核病变
B.脑性瘫痪
C.脑基底节变性
D.脑风湿性病变
E.小儿病变
正确答案：A，B，C
55、单选　隐性黄疸时，血清总胆红素为（）
A.3.4～17.1μmol/L
B.1.7～34μmol/L
C.171～342μmol/L
D.17.1～34.2μmol/L
E.34.2～171μmol/L
正确答案：D
56、多选　运动实验的适应证包括（）
A.评估冠心病病人的心脏负荷能力
B.对不典型胸痛或可疑冠心病病人进行鉴别诊断
C.评价冠心病的药物或介入手术治疗效果
D.观察是否有电解质紊乱
E.观察洋地黄中毒的程度
正确答案：A，B，C
57、单选　有关尿液标本的采集，错误的是（）
A.通常采用清洁的中段尿作为细菌学检验的标本
B.尿液标本若不能及时送检，放4℃冰箱不能超过6h
C.检测尿中结核杆菌，需留12h尿液
D.检测尿中结核杆菌，需留24h尿液
E.厌氧菌培养需取膀胱穿刺的尿标本
正确答案：C
58、单选　制备尿沉渣检查标本时，10ml尿离心后弃去上清液，所留标本量的是（）
A.0.3ml
B.0.5ml
C.1ml
D.0.2ml
E.0.1ml
正确答案：D
59、单选　肾前性氮质血症与尿毒症最重要的鉴别指标是（）
A.尿素氮测定

B.尿渗量测定
C.尿素氮与肌酐同时测定
D.内生肌酐清除率测定
E.血清肌酐测定
正确答案：B
60、单选　对尿渗量影响最大的物质是（）
A.肌酐
B.氯化钠
C.蛋白质
D.尿素氮
E.葡萄糖
正确答案：B
61、单选　血清中含量最少的是（）
A.IgE
B.IgA
C.IgG
D.IgD
E.IgM
正确答案：A
62、单选　关于血尿的说法，不正确的是（）
A.暂时镜下血尿无意义
B.体力劳动后尿中可出现镜下血尿
C.提示肾源性血尿
D.泌尿系肿瘤尿中出现镜下血尿
E.盆腔炎症可见血尿
正确答案：A
63、多选　马蹄足可见于（）
A.小腿三头肌麻痹
B.腓总神经麻痹
C.跟腱挛缩
D.胫前胫后肌麻痹
E.小儿麻痹后遗症
正确答案：B，C
64、单选　正常人尿渗量／血渗量为（）
A.（3～4.5）：1
B.>4.5：1
C.1：1
D.3：1

E.4：1
正确答案：A
65、单选　最易引起肝性脑病的疾病是（）
A.药物性肝炎
B.肝炎后肝硬化
C.酒精性肝硬化
D.血吸虫病引起的肝硬化
E.胆汁淤积性肝硬化
正确答案：B
66、单选　浆膜腔液葡萄糖检查，不正确的是（）
A.漏出液葡萄糖含量接近血液浓度
B.30％～50％化脓性胸膜炎病例降低
C.红斑狼疮基本正常
D.细菌感染常降低
E.风湿性疾病常<10mmol／L
正确答案：E
67、单选　血清铁及转铁蛋白饱和度均降低，转铁蛋白升高的是（）
A.血色病
B.缺铁性贫血
C.铁粒幼细胞性贫血
D.再生障碍性贫血
E.慢性肝损伤
正确答案：B
参考解析：暂无解析
68、单选　胃溃疡出血的粪便颜色一般是（）
A.浆色便
B.淡黄色便
C.柏油样便
D.黑色便
E.鲜红色便
正确答案：C
69、单选　引起肾小球蛋白尿的疾病，但除了（）
A.肾小球肾炎
B.肾病综合征
C.高血压
D.糖尿病
E.肾盂肾炎
正确答案：E

70、单选　关于脑脊液标本送检，不正确的是（）
A.怀疑肿瘤时另留一管作脱落细胞学检查
B.第二管作免疫化学检验
C.第一管作细菌学检验
D.第二管作细菌学检验
E.第三管作细菌学检查
正确答案：C
71、单选　关于心电图波形的含义，错误的是（）
A.P 波为心房除极波
B.Ta 波为心房复极波
C.QRS 波群为心室除极波
D.T 波为心室复极波
E.P-R（Q）间期为心房除极终了至心室除极开始的时间
正确答案：E
72、单选　一青年男性，突然右下肢疼痛，水肿，患肢皮肤颜色发暗但无皮损，皮温略高，足背动脉有搏动。白细胞计数及分类都正常。 根据病人表现，可认为病人发生了（）
A.右下肢动脉堵塞
B.右下肢静脉堵塞
C.右下肢动、静脉都有堵塞
D.双下肢静脉堵塞
E.右下肢有炎症
正确答案：B
73、单选　Ⅱ型肾小管酸中毒反映（）
A.远端、近端肾小管均有障碍
B.代谢性酸中毒
C.远端肾小管功能缺陷
D.近端肾小管功能缺陷
E.代谢性碱中毒
正确答案：D
74、单选　酒精性肝病时升高最显著的是（）
A.ALT
B.ALP
C.AST
D.GGT
E.LDH
正确答案：C

75、单选　某一成年女性患者尿 17-OHCS 正常而尿 17-KS 明显增高，应考虑（）
A. Addison 病
B. 库欣综合征
C. 甲状腺功能亢进
D. 肾上腺腺癌
E. 尿病
正确答案：D
76、单选　不会引起血钙升高的是（）
A. Burkitt 淋巴瘤
B. 急性白血病
C. 多发性骨髓瘤
D. 肾癌
E. 甲状旁腺功能减退
正确答案：E
77、单选　患者男性，48 岁，多年饮酒史，近一个月上腹疼痛，饥饿时加重，呈现疼痛一进食一缓解规律。 若胃镜下所见溃疡面较大，周边不整齐，底部不平，触之质硬，黏膜脆易出血有可能是（）
A. 溃疡愈合期
B. 溃疡瘢痕期
C. 恶性溃疡
D. 慢性肥厚性胃炎
E. 慢性浅表性胃炎
正确答案：C
78、多选　原发性血小板减少性紫癜患者可出现（）
A. 血块收缩异常
B. 3P 试验阳性
C. KPTT 延长
D. 血小板相关抗体阳性
E. 束臂试验阳性
正确答案：A, D, E
79、单选　尿比重降低的临床意义，不正确的是（）
A. 慢性肾小管肾炎
B. 肾功能衰竭
C. 肾小管间质性疾病
D. 尿崩症
E. 肾病综合征
正确答案：E

80、单选　怀疑患者为急性无黄疸性肝炎时，不需检查的项目是（）

A. ALT
B. 胆汁酸
C. 肝炎病毒标志物
D. 尿内尿胆原
E. 血清蛋白电泳
正确答案：E
81、单选　血清蛋白电泳时，泳动最慢的蛋白是（）
A. γ球蛋白
B. M 蛋白
C. β球蛋白
D. α2 球蛋白
E. α1 球蛋白
正确答案：A
82、单选　可引起 PT 延长的是（）
A. 溶血性黄疸
B. 血友病
C. 特发性血小板减少性紫癜
D. 血小板无力症
E. 肝脏疾病
正确答案：E
83、单选　男，50 岁，酗酒后寒战、高热、咳嗽咯铁锈色痰伴左侧胸痛，放散至肩部。查体：T40℃，左下肺触觉语颤增强，叩呈浊音，呼吸音低，闻及管状呼吸音。胸片示左下肺大片状浸润影呈段性分布。外周血白细胞 19 乘以十的九次方／L，中性粒细胞 0．85，淋巴细胞 0．15。 对于诊断最有意义的表现是（）
A. 醉酒后寒战、高热
B. 左侧胸痛放射至左肩部
C. X 线示左下肺浸润影
D. 咯铁锈色痰
E. 左下肺语颤增强，叩呈浊音，闻及管状呼吸音
正确答案：D
84、单选　某患者，心电图的表现为：V1～V，导联有病理性 Q 波，ST 段上抬 0．3mV，T 波倒置，应诊断为（）
A. 陈旧性前间壁心肌梗死
B. 急性前间壁心肌梗死
C. 急性前壁心肌梗死
D. 亚急性前间壁心肌梗死
E. 亚急性前壁心肌梗死

正确答案：D
85、多选　可导致不均匀的气流阻力的有（）
A.肺部感染
B.支气管痉挛
C.气管受压
D.肺结核
E.肺水肿
正确答案：B，C
86、单选　主要用于反映肝细胞损伤的酶是（）
A.脯氨酰羟化酶
B.单胺氧化酶
C.碱性磷酸酶及其同工酶
D.丁-谷氨酰转移酶及其同工酶
E.氨基转移酶及其同工酶
正确答案：E
87、单选　SNP 占所有已知多态性的（）
A.60％以上
B.70％以上
C.90％以上
D.80％以上
E.以上都不对
正确答案：C
88、多选　病程记录的内容包括（）
A.实验室、器械检查结果及分析
B.对诊断的确定、补充或原诊断修正依据
C.对现病史和其他方面的补充资料
D.会诊意见和执行情况
E.患者自觉症状、心理活动和睡眠饮食等
正确答案：A，B，C，D，E
89、单选　IgM 占血清总 Ig 的（）
A.10％～15％
B.1％～5％
C.15％～20％
D.20％～25％
E.5％～10％
正确答案：E
90、单选　踏车运动实验的主要优点是（）
A.根据受试者个人情况，达到各自的亚极量负荷

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/828033123031006062