

2023-24 年江西省信州区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题完整版含答案（黄金题型）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于 X 级的药物是

- A: 葡萄糖
- B: 沙利度胺
- C: 万古霉素
- D: 阿莫西林

答案：B

2. 在氯化钠注射液中可形成胶状不溶物是

- A: 氯化钾
- B: 红霉素
- C: 青霉素
- D: 苯妥英钠

答案：B

3. “1 个半衰期给药 1 次；如需要立即达到稳态，可首剂加倍”是针对

- A: 半衰期大于 24 小时的药品
- B: 半衰期 8~24 小时的药品
- C: 半衰期小于 30 分钟的药品
- D: 半衰期大于 30 小时的药品

答案：B

4. 饮水可能会引起水潴留是指

- A: 苦味健胃药
- B: 抗利尿药
- C: 舌下片（丸）
- D: 利胆药

答案：B

5. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 共济失调
- B: 口干
- C: 便秘
- D: 肾损害

答案：D

6. ADR 报表内容填写不齐全、等待补充，或因果关系难以定论，缺乏文献资料佐证；可评价为

- A: 可能
- B: 很可能
- C: 可能无关
- D: 待评价

答案：D

7. 降低夜间的眼压作用强，尤其用于其他降眼压药不能耐受的患者的药物是

- A: 噻吗洛尔
- B: 拉坦前列素

C: 溴莫尼定

D: 毛果芸香碱

答案: B

8. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药物是

A: 利福平

B: 吡嗪酰胺

C: 链霉素

D: 乙胺丁醇

答案: D

9. 药物对医学检查指标异常结果的影响,可能导致血清总胆固醇升高的药物是

A: 氯氮平

B: 阿司匹林

C: 胰岛素

D: 苯妥英钠

答案: A

10. 解救强腐蚀剂中毒者 ()

A: 禁止洗胃

B: 不能催吐

C: 不能用强利尿剂

D: 不能导泻

答案: A

11. 香豆素类杀鼠药中毒呈现

A: 恶心、呕吐、口内有金属味

- B: 抽搐、进行性加重
- C: 呼出气体中可有苦杏仁气味
- D: 出血、凝血时间延长

答案：D

12. 患者，男，72 岁，既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。1 个月前因出现哮喘症状就诊。医师处方：布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入，沙丁胺醇气雾剂 100pgpm 吸入，氨氯地平片 5mgqd 口服及硝酸甘油片 0.5mgpm 舌下含服。

- A: 氨氯地平的不良反应
- B: 硝酸甘油剂量不足
- C: 布地奈德剂量太大
- D: 沙丁胺醇的不良反应

答案：D

13. (2015 年真题) 患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液
- B: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他汀片
- C: 特拉唑嗪片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片
- D: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片

答案：A

14. 患者，女，48 岁，因进食高蛋白食物过多导致消化不良、胃胀气到药店购药，药师应推荐的药品是()

- A: 乳酶生片

B: 酵母片

C: 多潘立酮片

D: 甲氧氯普胺片

答案：A

15. 阿昔洛韦用于肾功能不全患者应（）

A: 减量使用

B: 避免应用

C: 加量使用

D: 在危及生命时方可使用

答案：A

16. 举重运动员使用后,可短时间内急速降低体重, 因此需按兴奋剂管理的药物是()

A: 硝苯地平

B: 呋塞米

C: 普萘洛尔

D: 缬沙坦

答案：B

17. 贫血的临床表现与下列哪项有关

A: 红细胞减少

B: 血红蛋白下降的速度

C: 铁元素缺乏

D: 缺乏叶酸

答案：B

18. “调查显示，应用过庆大霉素治疗的霍乱患者肾衰竭的发病率是未用患者的 5 倍”提示诊断药源性疾病应该进行

- A: 流行病学的调查
- B: 排除药物以外的因素
- C: 致病药物的确定
- D: 询问用药过敏史和家族史

答案：A

19. 在患者入院、转科和出院时，药师通过核对新开的医嘱和已有的医嘱，核对患者目前的整体用药情况，避免漏用药物、重复用药。剂量错误和不良药物相互作用等，以保证患者用药安全的药学服务过程，属于（）

- A: 药物利用评价
- B: 药学干预
- C: 药物重整
- D: 处方审核

答案：C

20. 患者女，56 岁，既往有高血压、高脂血症病史，长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周，伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛，服用布洛芬，疼痛未缓解，自行加用萘普生。胃镜检查显示：胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡，幽门螺杆菌（Hp）阳性。肾功能未见异常

- A: 阿莫西林、克拉霉素
- B: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）、克拉霉素
- C: 枸橼酸铋钾、左氧氟沙星
- D: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）、枸橼酸铋钾

答案：D

21. 博来霉素的主要毒副作用是（）

- A: 肺纤维化
- B: 心脏毒性
- C: 出血性膀胱炎
- D: 溶血性尿毒症

答案：A

22. 以下治疗哮喘疾患的中成药中，不含有麻黄碱成分的是

- A: 止咳定喘膏
- B: 防风通圣丸
- C: 通宣理肺丸
- D: 蛇胆川贝液

答案：D

23. 青霉素常采用的剂量单位是

- A: μg
- B: g
- C: IU
- D: mg

答案：C

24. 宜于睡前服用的药品是

- A: 洛伐他汀
- B: 甲氧氯普胺
- C: 阿卡波糖
- D: 糖皮质激素

答案：A

25. 静脉注射青霉素的适宜溶媒是

- A: 复方氨基酸注射液
- B: 0.9%氯化钠注射液
- C: 50%葡萄糖注射液
- D: 5%葡萄糖注射液

答案：B

26. 患者治疗 3 天后，感染控制不佳，痰培养及药敏报告提示病原菌为对青霉素高水平耐药的肺炎链球菌，可将抗菌药物调整为（）

- A: 莫西沙星
- B: 阿奇霉素
- C: 头孢哌酮舒巴坦
- D: 哌拉西林他唑巴坦

答案：A

27. 以下血浆脂质水平检查结果中，不能判断为高脂血症的是

- A: 三酰甘油(TG)高于同年龄正常值
- B: 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-ch)高于同年龄正常值
- C: 总胆固醇(Tc)高于同年龄正常值
- D: 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-ch)高于同年龄正常值

答案：A

28. 患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断服用沙丁胺醇 4mg tid 治疗，没有规律用药治疗。因秋冬季交替出现明显喘憋，话不成句，被紧急送医预防治疗。

- A: 沙丁胺醇气雾剂
- B: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

C: 布地奈德气雾剂

D: 沙丁胺醇片

答案: B

29. 女性，59 岁，间断咳嗽、咳痰 5 年，加重伴咯血 2 个月。患者表现为低热、乏力、食欲减退、咳白色黏痰、体重逐渐下降。

A: 布地奈德?

B: 青霉素?

C: 特布他林?

D: 异烟肼?

答案: D

30. 成人静脉血白细胞计数的正常范围值

A: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9/L$

B: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

C: $(10.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

D: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$

答案: D

31. (2019 年真题) 患者，男，28 岁，外出进餐后出现腹泻，一日 6 次，水样便，无发热和腹痛症状。宜选用的药物是

A: 奥美拉唑肠溶胶囊

B: 蒙脱石散

C: 干酵母片

D: 复方阿嗪米特肠溶片

答案: B

32. 下列疾病中，WHO 视为艾滋病最常见的机会性感染的是

- A: 腹泻
- B: 结核病
- C: 肺炎
- D: 卡氏肉瘤

答案：B

33. 尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物，正常人每日排出尿液 1000～3000ml。其中 97% 为水分，而在 3% 的固体物质中，主要含有两大类物质：有机物（尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物）和无机物（氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等）。

- A: 氯化铵
- B: 氯化钾
- C: 硫酸镁
- D: 氯化钠

答案：A

34. 肺炎药物治疗时应注意

- A: 观察抗菌药物疗效应在药物治疗后 12～24 小时对病情进行评价
- B: 抗菌药一般不良反应较少，不需要注意与预防
- C: 一旦怀疑为细菌性肺炎应给予首剂抗菌药物，病情稳定后可从静脉途径改为口服治疗
- D: 肺炎的抗菌药物疗程大多数为 5 天，极少数需要 7～10 天或更长疗程

答案：C

35. 患者，女，42 岁，因成骨肉瘤使用环磷酰胺甲氨蝶呤联合化疗，用药过程中，者出现出血性膀胱炎。适宜的处理措施是()

- A: 停药，给予糖皮质激素

B: 给予糖皮质激素冲击治疗

C: 停药，给予亚叶酸钙治疗

D: 停药，水化，给予美司钠治疗

答案：D

36. (2017 年真题) 缺铁性贫血患者常表现为 ()

A: 红细胞增多

B: 嗜酸性粒细胞增多

C: 血红蛋白减少

D: 中性粒细胞增多

答案：C

37. 合并心力衰竭的高血压患者，降压目标值为

A: $<125 / 75\text{mmHg}$

B: $<140 / 90\text{mmHg}$

C: $<150 / 90\text{mmHg}$

D: $<130 / 80\text{mmHg}$

答案：B

38. 甲状旁腺素制剂属于

A: 骨形成刺激剂

B: 激素替代剂

C: 骨吸收抑制剂

D: 促进骨矿化剂

答案：A

39. 以餐后血糖升高为主，伴餐前血糖轻度升高，应该首选的降糖药是

A: 阿卡波糖

- B: 二甲双胍
- C: 格列本脲
- D: 罗格列酮

答案：D

40. 醛固酮受体拮抗剂

- A: 阿利吉仑
- B: 阿米洛利
- C: 依普利酮
- D: 雷米普利

答案：C

41. 鼻窦炎的急性期应尽早采用足量的何种药物治疗

- A: 抗过敏药
- B: 抗菌药
- C: 解热镇痛药
- D: 局部血管收缩剂

答案：B

42. 患者，男，68 岁，肺癌晚期，平日清晨、晚间 8 点使用吗啡缓释片控制疼痛。目前出现暴发性疼痛，应采取的治疗措施是

- A: 即刻加用芬太尼透皮贴剂
- B: 即刻加用可待因片一次
- C: 即刻加用吗啡片一次
- D: 即刻加用吗啡缓释片一次

答案：C

43. 疾病预防和控制中心（www.cdagov.cn）刊载的主要内容是

- A: 卫生事业发展的总体规划和战略
- B: 国内外医学新闻、最科研动态
- C: 有关感染性疾病的预防信息
- D: 综合药学信息，药学服务

答案：C

44. 属于抗胆碱药的是

- A: 恩托卡朋
- B: 普拉克索
- C: 苯海索
- D: 司来吉兰

答案：C

45. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

- A: 医疗机构从业人员
- B: 60 岁上的老人
- C: 慢性病患者及体弱多病者
- D: 3 岁以上儿童

答案：D

46. 静脉滴注两性霉素 B 的适宜溶媒是

- A: 50%葡萄糖注射液
- B: 5%葡萄糖注射液
- C: 复方氯化钠注射液
- D: 0.9%氯化钠注射液

答案：B

47. 多数抗过敏药物慎用于（）

A: 前列腺增生老年患者

B: 慢性鼻炎患者

C: 胃溃疡患者

D: 高脂血症患者

答案：A

48. （2018 年真题）患者，男，16 岁，因急性细菌性扁桃体炎使用青霉素钠治疗，用药前进行青霉素皮试。关于青霉素皮试液浓度和给药方法的说法正确的是（）

A: 浓度 500U/ml，皮内注射 0.1ml

B: 浓度 5000U/ml，皮内注射 0.1ml

C: 浓度 500U/ml，肌肉注射 0.1ml

D: 浓度 5000U/ml，肌肉注射 0.1ml

答案：A

49. 高蛋白饮食在肠内产生氨基酸会影响其吸收、降低疗效的药物是（）

A: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊

B: 维 A 酸片

C: 左旋多巴片

D: 非洛地平片

答案：C

50. 以下毒物中，误服中毒、须用碳酸氢钠溶液洗胃的是

A: 有机磷杀虫药

B: 瘦肉精

C: 苯二氮

D: 苯丙胺

答案：A

51. 判别“大三阳”区别于“小三阳”的主要检查项目为

A: HBeAg(+)

B: 抗-HBe(+)

C: 抗-HBs(+)

D: 抗-HBc(+)

答案：A

52. 用 10%的氯化钠注射液和注射用水配制 3%的氯化钠注射液 100ml, 所需的 10%氯化钠注射液的毫升数是()

A: 30

B: 25

C: 33.3

D: 10

答案：A

53. (消化性溃疡病的治疗)，除中和胃酸外，尚具有黏膜保护作用

A: 溴丙胺太林

B: 奥美拉唑

C: 硫酸镁

D: 硫糖铝

答案：D

54. (透析患者常用药物)可消除便秘，避免腹腔感染和腹膜透析液引流不畅的药物是

- A: 铁剂
- B: 乳果糖
- C: 阿法骨化醇
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

55. 患者男 78 岁，因心房颤动服用华法林治疗 2 年余。后因真菌感染使用氟康唑，用药后 INR 升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是（）

- A: 氟康唑可抑制 CYP2C9，导致华法林血药浓度升高
- B: 氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力，导致血中游离的华法林浓度升高
- C: 氟康唑抑制华法林的肾脏排泄，导致华法林血药浓度升高
- D: 氟康唑可增加华法林的吸收，导致华法林血药浓度升高

答案：A

56. 患者，男，30 岁，因反复发作呼吸困难，咳嗽、胸闷入院。每年春季发作，持续 3 年，查体：双肺满布哮鸣音，HR80 次 / 分，律齐，无杂音。

- A: 慢性支气管炎
- B: 慢性支气管炎合并肺气肿
- C: 阻塞性肺气肿
- D: 支气管哮喘

答案：D

57. 可引起血小板减少症的抗肿瘤药物是

- A: 利巴韦林
- B: 阿洛司琼

C: 甲氨蝶呤

D: 阿昔洛韦

答案: C

58. 血清丙氨酸氨基转移酶正常参考区间是

A: 男性<40U/L

B: 成人<40U/L

C: 成人<50U/L

D: 男性 11~50U/L

答案: B

59. 不宜与葡萄柚汁合用的药物是

A: 磺胺类药物

B: 左旋多巴

C: 硫酸亚铁

D: 辛伐他汀

答案: D

60. 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是

A: 低精蛋白锌胰岛素

B: 甘精胰岛素

C: 普通胰岛素

D: 预混胰岛素

答案: C

61. 关于儿童药动学和药效学特点的说法，错误的是（）

A: 和成人相比，婴儿胃液 PH 低，对酸不稳定的药物易被破

B: 婴幼儿血浆白蛋白与药物的结合能力低于成人，血中游离药物浓度较高

C: 儿童内分泌系统不够稳定，长期使用糖皮质激素易导致发育迟缓

D: 儿童血脑屏障不完善，多种药物均能通过，有可能引发不良反应

答案：A

62. 可出现体位性低血压的是

A: 甲氧氯普胺

B: 苯二氮

C: 哌替啶

D: 双嘧达莫

答案：D

63. 患者，男，60 岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降 6 个月，BMI 值 29.0。空腹血糖 10.2mmol/L，餐后 2 小时血糖 16.7mmol/L，血压 115/80mmHg。

A: 胃肠道反应

B: 关节痛

C: 皮疹

D: 低血糖

答案：A

64. (2018 年真题) 患者，女，45 岁，6 个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁，在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗，症状控制较好，近 3 个月服用西咪替丁，患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱，该患者各地求医，服用各种药物，具体药物品种不详。围绕该病例，医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

A: 地西泮

- B: 卡马西平
- C: 丙戊酸钠
- D: 苯巴比妥

答案：C

65. 在脑卒中各亚型中发病率最高的疾病为（）

- A: 缺血性脑卒中
- B: 脑梗死
- C: 原发性蛛网膜下腔出血
- D: 脑出血

答案：A

66. （2019 年真题）患者，男，56 岁，因出现面色苍白、乏力、肢体麻木、共济失调等症状就诊，查体：舌面光滑，呈“牛肉样舌”。化验结果提示血清叶酸和维生素 B12 水平下降，下列药物中不会影响维生素 B12 吸收的是

- A: 二甲双胍
- B: 奥美拉唑
- C: 对氨基水杨酸
- D: 氨氯地平

答案：D

67. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

- A: 维生素 B12 肌肉注射
- B: 硫酸亚铁口服
- C: 输血

D: 右旋糖酐铁肌注

答案: B

68. 易经乳汁分泌的药物特性是

A: 蛋白结合率高

B: 分子量大

C: 弱酸性

D: 脂溶性高

答案: D

69. 每四小时用药一次的外文规范缩写是

A: qn

B: tid

C: q4h

D: qod

答案: C

70. 慢性痛风和痛风性肾病为抑制尿酸生成可选用

A: 苯溴马隆

B: 秋水仙碱

C: 泼尼松龙

D: 别嘌醇

答案: D

71. 现有一新生儿确诊感染乙型肝炎，以下可提示其生母妊娠期间血清学检查结果的是

A: HBsAg 为阳性

B: HBsAb, HBeAg 均为阳性

C: HBsAg, HBeAg 均为阳性

D: HBeAg 为阳性

答案：C

72. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病，而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有用药物治疗，接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅三成左右。高血压死亡率不断升高。熟悉高血压及相关用药，对更有效地治疗高血压非常重要。

A: 甲基多巴

B: 依那普利

C: 拉贝洛尔

D: 氢氯噻嗪

答案：B

73. “沟通医、药、患的重要纽带”的工作是

A: 治疗药物监测

B: 静脉药物配置

C: 参与临床药物治疗

D: 处方调剂

答案：D

74. 患者男，64 岁，诊断为 2 型糖尿病，既往有磺胺过敏史不宜选用的药物是（）

A: 吡格列酮

B: 格列齐特

C: 二甲双胍

D: 阿卡波糖

答案：B

75. 可卡因属于兴奋剂中的

- A: 利尿剂
- B: 精神刺激剂
- C: β 受体阻断剂
- D: 麻醉药品

答案：B

76. 顺应人体生物节律的变化，适宜清晨给药的是

- A: 地塞米松
- B: 强力泻药
- C: 鞣酸蛋白
- D: 洛伐他汀

答案：A

77. 紫外线加速一些药品的氧化、分解

- A: 温度
- B: 湿度
- C: 空气
- D: 日光

答案：D

78. 下列处方用药应该评判为“无适应证用药”的是

- A: 感冒、咳嗽、无感染，给予阿奇霉素
- B: 应用两种或两种以上一药多名的药物
- C: 病因未明用药
- D: 忽略药品说明书提示用药

答案：A

79. 患儿，3 岁，因发热就诊，体温 38.8℃。药师应推荐的治疗药物是

- A: 塞来昔布缓释片
- B: 布洛芬混悬液
- C: 20% 安乃近滴鼻剂
- D: 阿司匹林肠溶片

答案：B

80. 杨某，女，19 岁，咳嗽，有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性啰音；WBC $>13\times 10^9/L$

- A: 支气管炎
- B: 肺结核
- C: 哮喘
- D: 社区获得性肺炎

答案：D

81. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7\times 10^9/L$ ，血小板 $120\times 10^9/L$ ，血清铁 300 $\mu g/L$ 。

- A: 缺铁性贫血
- B: 溶血性贫血
- C: 巨幼细胞性贫血
- D: 再生障碍性贫血

答案：A

82. 饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物药动学的机制是

- A: 抑制 CYP1A2

B: 抑制 CYP3A4

C: 诱导 CYP3A4

D: 抑制 CYP2C9

答案：B

83. 可提示急性肝炎的是

A: 丙氨酸氨基转移酶升幅很高

B: A/G 值低于 1

C: γ -谷氨酰转移酶升高

D: 血清碱性磷酸酶升高

答案：A

84. 控制癫痫持续状态应入院后首选（）

A: 肌肉注射地西洋

B: 静脉注射丙戊酸钠

C: 静脉注射地西洋

D: 口服硫酸镁

答案：C

85. I 期临床试验是初步的临床药理学及人体安全性评价。试验对象主要为健康受试者，样本数一般只有

A: 10~18 例

B: 20~24 例

C: 12~13 例

D: 20~30 例

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/828051027051007022>