

2024 年广西壮族自治区龙胜各族自治县《执业药师之西药学专业二》资格考试题库含答案【模拟题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 使用时可引起单抗药综合征的是

- A: 他莫昔芬
- B: 阿那曲唑
- C: 氟他胺
- D: 曲妥珠单抗

答案：D

2. 可用于恶性淋巴瘤的药物是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 阿糖胞苷
- C: 甲氨蝶呤
- D: 利妥昔单抗

答案：B

3. 放线菌素 D 的主要作用环节在

- A: G
- B: M 期
- C: S 期
- D: G

答案：D

4. (2016 年真题) 耐甲氧西林金黄色葡萄菌感染宜首选的抗菌药物是

- A: 头孢他啶
- B: 罗红霉素
- C: 头孢曲松
- D: 利奈唑胺

答案: D

5. 可诱发哮喘且变异型心绞痛不宜选用的药物是

- A: 硝苯地平
- B: 洛伐他汀
- C: 普萘洛尔
- D: 硝酸甘油

答案: C

6. 下列关于升华硫的描述中，错误的是

- A: 不得与铁制品接触
- B: 避免接触眼睛和其他黏膜
- C: 儿童慎用
- D: 可用于痤疮、脂溢性皮炎

答案: A

7. 巨细胞病毒可致

- A: 巨细胞病毒性视网膜炎
- B: 角膜炎
- C: 急性出血性结膜炎
- D: 流行性结膜炎

答案: A

8. (2021 年真题) 患者，男，65 岁。患有 2 型糖尿病，长期服用降糖药，同时长期服用阿司匹林肠溶片 (100mg/d) 预防心脑血管疾病。近期拟行髋关节置换手术，为减少出血风险，宜采取的措施是 ()。

- A: 停用阿司匹林 3 天后，再行手术
- B: 停用阿司匹林 7-10 天后，再行手术
- C: 无需停用阿司匹林，也无需加用其他药物预防出血
- D: 无需停用阿司匹林，在手术日加用维生素 K1 预防出血

答案：B

9. 顺铂

- A: 影响蛋白质合成和功能
- B: 干扰 RNA 转录
- C: 干扰核酸生物合成
- D: 直接破坏 DNA 结构和功能

答案：D

10. 抑制细菌核酸合成的抗菌药物是

- A: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶
- B: 头孢米诺
- C: 头孢吡肟
- D: 利福喷丁

答案：D

11. 甲状腺功能亢进症的内科治疗宜选用 ()

- A: 甲巯咪唑
- B: 小剂量碘剂
- C: 吡格列酮
- D: 甲状腺素

答案：A

12. 高血钾的肾损伤患者禁用下列哪种利尿药()

- A: 依他尼酸
- B: 呋塞米
- C: 山梨醇
- D: 螺内酯

答案：D

13. (2021 年真题) 关于抗心力衰竭药物沙库巴曲缬沙坦的说法，错误的是()

- A: 血钾水平 >5
- B: 与血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)合用具有协同作用
- C: 适用于射血分数降低的慢性心力衰竭(NYHA II-IV 级, LVEF $\leq 40\%$)成年患者
- D: 通过抑制脑啡肽酶, 同时阻断血管紧张素 II 的 1 型受体(AT1)起效

答案：B

14. 维生素 B

- A: 拮抗华法林过量导致的出血
- B: 拮抗肝素过量导致的出血
- C: 恶性贫血和巨幼红细胞性贫血
- D: 纤溶亢进所致的出血

答案：C

15. 用于治疗对阿司匹林敏感的哮喘以及预防运动性哮喘, 也用于减轻季节性过敏性鼻炎引起的症状的是

- A: 沙美特罗
- B: 沙丁胺醇
- C: 孟鲁司特
- D: 茶碱

答案：C

16. 硝酸酯类药物扩张血管是通过

- A: 产生一氧化氮，使细胞内环磷酸鸟苷升高
- B: 阻滞 Ca^{2+} 通道
- C: 促进前列环素的生成
- D: 直接作用于血管平滑肌

答案：A

17. 噻唑烷二酮类药物可降低

- A: 血红蛋白
- B: 女性骨折的风险
- C: 体重
- D: 血容量

答案：A

18. 哮喘急性发作首选的治疗药物是()。

- A: 短效 β
- B: 白三烯受体阻断剂
- C: 吸入性糖皮质激素
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：A

19. (2019 年真题) 患者，女 75 岁，既往有 2 型糖尿病史 18 年，有青霉素过敏史，因车祸导致左下肢开放性骨折，术后发生骨髓炎，给予克林霉素治疗 10 余天，临床应关注的典型不良反应是 ()

- A: 红人综合征
- B: 抗生素相关性腹泻
- C: 肌肉震颤
- D: 急性溶血性贫血

答案：B

20. 治疗侵袭性曲霉菌病首选 ()

- A: 灰黄霉素
- B: 氟康唑
- C: 伏立康唑
- D: 氟胞嘧啶

答案：C

21. (2018 年真题) 普通感冒患者，有打喷嚏、流鼻涕的症状，宜选用的药物是 ()

- A: 氯苯那敏片
- B: 茶碱缓释片
- C: 对乙酰氨基酚滴剂
- D: 右美沙芬片

答案：A

22. 弱效 (使 LDL-ch 水平降低 $<30\%$) 的他汀类调血脂药

- A: 依折麦布
- B: 小剂量阿托伐他汀
- C: 大剂量阿托伐他汀

D: 小剂量氟伐他汀

答案: D

23. 下列药物中，与维生素 D 合用能出现高钙血症的药物是

A: 考来烯胺

B: 硫酸铝

C: 矿物油

D: 氢氯噻嗪

答案: D

24. (2017 年真题) 长期大剂量服用维生素 D 可能引起的不良反应是 ()

A: 高胆红素血症

B: 血栓性静脉炎

C: 高钙血症

D: 颅内压升高

答案: C

25. (2017 年真题) 对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是 ()

A: 吸入性糖皮质激素+短效 β_2 受体激动剂

B: 长效 M 胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂

C: 吸入性糖皮质激素+长效 β_2 受体激动剂

D: 长效 β_2 受体激动剂+长效 M 胆碱受体阻断剂

答案: C

26. (2017 年真题) 在痛风急性期禁用的药物是 ()

A: 布洛芬

- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱
- D: 舒林酸

答案: B

27. 进行透析的急、慢性。肾衰竭患者静脉滴注复方氨基酸注射液（9AA），滴速为

- A: 不超过 40 滴 / 分
- B: 滴速 80~100 滴 / 分
- C: 滴速 20~30 滴 / 分
- D: 不超过 15 滴 / 分

答案: D

28. （2021 年真题）可干扰转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药物是（）

- A: 塞替派
- B: 多柔比星
- C: 顺铂
- D: 丝裂霉素

答案: B

29. 氯吡格雷应避免与奥美拉唑联合应用，因为两者竞争共同的肝药酶，该肝药酶是（）。

- A: CYP2E1
- B: CYP286
- C: CYP2C19
- D: CYP2D6

答案: C

30. 头孢拉定()

- A: 肾毒性大
- B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染
- D: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染

答案：A

31. 阻断 H₂ 受体的药物是

- A: 氢氧化铝
- B: 阿托品
- C: 奥美拉唑
- D: 雷尼替丁

答案：D

32. 利尿作用极弱，具有降低眼压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案：A

33. 属于 β 受体阻断剂，对正常人血压影响不明显，而对高血压患者具有降压作用的降压药是()

- A: 利血平
- B: 氢氯噻嗪
- C: 硝苯地平
- D: 美托洛尔

答案：D

34. (2018 年真题) 主要用于青光眼急性发作短期控制的药物是 ()

- A: 依托塞米
- B: 乙酰唑胺
- C: 依他尼酸
- D: 布美他尼

答案：B

35. 与青霉素相比，阿莫西林 ()

- A: 对 β -内酰胺酶稳定
- B: 对革兰阳性细菌的抗菌作用强
- C: 对革兰阴性杆菌作用强
- D: 对耐药金黄色葡萄球菌有效

答案：C

36. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 60mg&g
- B: 5mg / kg
- C: 15mg / kg
- D: 40mg / kg

答案：D

37. 慢性外耳道炎时局部滴用，促使耳道干燥，可选用 ()

- A: 3%硼酸乙醇
- B: 2%酚甘油

C: 赛洛唑啉

D: 伪麻黄碱

答案: A

38. 成人应用 0.1% 溶液，儿童应用 0.05% 溶液，这种药物是

A: 羟甲唑啉滴鼻液

B: 酚甘油滴耳液

C: 赛洛唑啉滴鼻液

D: 麻黄碱滴鼻液

答案: C

39. 用于肿瘤化疗引起的中性粒细胞减少症的药物是()

A: 沙格司亭

B: 利可君

C: 糖皮质激素

D: 非格司亭

答案: D

40. 患者，女，55 岁，2 型糖尿病史 5 年；心律失常病史 2 年长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是

A: 可致甲状腺功能减退较为常见发病隐匿

B: 可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎

C: 可致甲状腺功能亢进，同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常

D: 可掩盖低血糖症状（如心悸、手抖），但低血糖的其他症状（如出汗）仍然存在

答案: D

41. 头孢曲松()

- A: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注
- B: 肾毒性较大
- C: 用于非典型致病原感染
- D: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎

答案：D

42. 噻嗪类利尿药的作用部位是

- A: 远曲小管近端
- B: 磷酸二酯酶
- C: Na^+-Cl^- -共转运子
- D: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ -同向转运子

答案：A

43. 适用于心功能比较稳定的 II ~ III 级心力衰竭患者的药物是

- A: 多巴酚丁胺
- B: 维拉帕米
- C: 卡维地洛
- D: 氯沙坦

答案：C

44. 高血压伴消化性溃疡患者不宜选用的药物是()

- A: 普萘洛尔
- B: 哌唑嗪
- C: 卡托普利
- D: 利血平

答案：D

45. 对于高胆固醇血症造成高危心肌梗死的患者，作为一线治疗药物应选择()

- A: 非诺贝特
- B: 烟酸
- C: 阿昔莫司
- D: 洛伐他汀

答案: D

46. 羟基脲属于()

- A: DNA 多聚酶抑制剂
- B: 核苷酸还原酶抑制剂
- C: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- D: 胸腺核苷合成酶抑制剂

答案: B

47. 血浆半衰期最长的强心苷类药物是

- A: 多巴酚丁胺
- B: 洋地黄毒苷
- C: 米力农
- D: 地高辛

答案: B

48. 患儿，女，8岁。长期发热，伴有精神不振、头痛、胸闷气短等症状，诊断为草绿色链球菌引起的心内膜炎。

- A: 四环素
- B: 氨基糖苷类
- C: 喹诺酮类

D: 头孢菌素类

答案：B

49. 患者，男，17 岁。拔牙 2 天后出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈。12 天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。

查体：T39℃，脉搏 89 次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音。实验室检查：WBC 28×10

A: 咳出的痰直接涂片

B: 咳出的痰进行细胞培养

C: 痰细胞学检查

D: 通过环甲膜穿刺吸取痰液，进行痰涂片和需氧、厌氧菌检查

答案：D

50. 奥司他韦治疗流行性感冒时，首次用药的时间是

A: 出现流感症状 100 小时内

B: 出现流感症状 96 小时内

C: 出现流感症状 48 小时内

D: 出现流感症状 72 小时内

答案：C

51. 属于利胆类保肝药的是

A: 甘草酸二铵

B: 多烯磷脂酰胆碱

C: 熊去氧胆酸

D: 还原型谷胱甘肽

答案：C

52. 伊曲康唑属于()

- A: 丙烯胺类抗真菌药
- B: 多烯类抗真菌药
- C: 棘白菌素类抗真菌药
- D: 唑类抗真菌药

答案：D

53. 可以改善心肌缺血的是

- A: 葡萄糖
- B: 果糖
- C: 维生素
- D: 脂肪乳

答案：B

54. 使用氟尿嘧啶 4~6h 前使用哪种药物可以起到协同作用

- A: 西咪替丁
- B: 别嘌醇
- C: 甲氨蝶呤
- D: 阿司匹林

答案：C

55. 抗酸作用较强、快而持久，可引起反跳性胃酸分泌增多

- A: 三硅酸镁
- B: 氢氧化镁
- C: 碳酸钙
- D: 氢氧化铝

答案：C

56. 急性化脓性中耳炎的局部治疗方案, 正确的是()

- A: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗
- B: 鼓膜穿孔前可先用 3%过氧化氢溶液彻底清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液，鼓膜穿孔后可使用 2%的酚甘油滴耳继续治疗
- C: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，再用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，以防止进一步感染
- D: 鼓膜穿孔前可使用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，鼓膜穿孔后可用 2%酚甘油滴耳，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗

答案：A

57. 呋塞米利尿的主要作用部位是()

- A: 远曲小管近端
- B: 远曲小管远端
- C: 肾小管髓袢升支粗段
- D: 集合管

答案：C

58. 患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适使用的药物是

- A: 氨氯地平
- B: 贝那普利
- C: 硝普钠
- D: 美托洛尔

答案：D

59. 可用于治疗非霍奇金淋巴瘤的单克隆抗体是

- A: 英夫利昔单抗

- B: 利妥昔单抗
- C: 贝伐单抗
- D: 西妥昔单抗

答案：B

60. 可与抗菌药物联合应用的是

- A: 地衣芽孢杆菌
- B: 保加利亚乳杆菌
- C: 嗜热链球菌
- D: 嗜酸乳杆菌

答案：A

61. (2017 年真题) 奥司他韦治疗流行性感冒, 首次用药的时间是 ()

- A: 出现流感症状后 96 小时内
- B: 出现流感症状后 100 小时内
- C: 出现流感症状后 36 小时内
- D: 出现流感症状后 72 小时内

答案：C

62. 关于唑吡坦作用特点的说法, 错误的是 ()

- A: 唑吡坦血浆蛋白结合率高
- B: 口服唑吡坦后消化道吸收迅速
- C: 唑吡坦属于 γ -氨基丁酸 A 型受体激动剂
- D: 唑吡坦具有镇静催眠作用, 抗焦虑作用

答案：D

63. 甲氧苄啶的抗菌机制是

- A: 抑制二氢蝶酸合成酶

- B: 破坏细菌细胞壁
- C: 抑制 DNA 螺旋酶
- D: 抑制二氢叶酸还原酶

答案：D

64. 静脉注射可以治疗单纯疱疹病毒脑炎，局部可以用于疱疹病毒性角膜炎的药物是

- A: 干扰素
- B: 奥司他韦
- C: 阿昔洛韦
- D: 阿糖腺苷

答案：D

65. 属于肾小管上皮细胞钠离子通道抑制剂的是()

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 阿米洛利
- D: 呋塞米

答案：C

66. 以下 PPI 中，主要代谢酶是 CYP3A4 的是

- A: 泮托拉唑
- B: 兰索拉唑
- C: 雷贝拉唑
- D: 奥美拉唑

答案：B

67. 叶酸主要用于治疗

- A: 溶血性贫血
- B: 再生障碍性贫血
- C: 缺铁性贫血
- D: 妊娠期巨幼红细胞性贫血

答案：D

68. (2017 年真题) 可能导致牙龈出血的药物是 ()

- A: 依诺肝素
- B: 普萘洛尔
- C: 普伐他汀
- D: 拉西地平

答案：A

69. 慢性肾上腺皮质功能减退症宜用

- A: 倍他米松
- B: 泼尼松
- C: 氢化可的松
- D: 地塞米松

答案：C

70. 可用维生素 B12 治疗的疾病是

- A: 缺铁性贫血
- B: 再生障碍性贫血
- C: 神经炎
- D: 慢性失血性贫血

答案：C

71. 严重肝病患者应减量慎用、肾功能减退患者应避免使用的是

- A: 青霉素
- B: 氟胞嘧啶
- C: 红霉素
- D: 异烟肼

答案：B

72. 氟替卡松吸入气雾剂用于重度哮喘时的用法和用量为

- A: 一次 250~500 μg ，一日 2 次
- B: 一次 50~100 μg ，一日 2 次
- C: 一次 100~250 μg ，一日 2 次
- D: 一次 500~1000 μg ，一日 2 次

答案：D

73. 应用华法林时，为掌握好剂量，应测定

- A: 凝血时间
- B: 出血时间
- C: 凝血酶原时间
- D: 部分凝血活酶时间

答案：C

74. 不属于抗代谢抗肿瘤药的是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 环磷酰胺
- C: 氟尿嘧啶
- D: 阿糖胞苷

答案：B

75. 葡萄糖和胰岛素一起静脉滴注，可以用来治疗的是

- A: 高钾血症
- B: 高钠血症
- C: 低钾血症
- D: 低钠血症

答案：A

76. 利尿作用最强，特别当急、慢性肾衰竭（肌酐清除率 $<30\text{mL/min}$ ）时，可作为首选治疗的利尿剂为（）。

- A: 袢利尿剂
- B: 噻嗪类利尿剂
- C: 留钾利尿剂
- D: 碳酸酐酶抑制剂

答案：A

77. 能与胰岛素竞争血浆蛋白，升高胰岛素血浆浓度的是

- A: 普萘洛尔
- B: 甲状腺素
- C: 格列喹酮
- D: 磺胺甲唑

答案：D

78. 四环素联用红霉素使

- A: 口服吸收减少
- B: 肝毒性增加
- C: 增加麦角中毒的风险
- D: 调整抗凝血药的剂量

答案：B

79. 抗菌药物联合用药的目的不包括

- A: 提高疗效
- B: 减少耐药性的发生
- C: 延长作用时间
- D: 扩大抗菌范围

答案：C

80. 患者，男，45 岁。以"间断巩膜黄染伴腹胀 2 年，加重 1 周"之主诉入院。患者 2 年前无明显诱因出现巩膜黄染，伴有腹胀，在当地医院诊断为酒精性肝硬化。1 周前患者上述症状加重，胃镜检查：胃溃疡(A

- A: 预防消化道出血
- B: 治疗肝硬化
- C: 缓解腹胀
- D: 治疗胃溃疡

答案：D

81. 强阿片类药物注射剂连续应该 3-5 日易出现

- A: 便秘、恶心、镇静功能受损
- B: 身体和精神依耐性
- C: 认知障碍
- D: 尿频、尿急、尿潴留

答案：B

82. 有些药品的不良反应源于药物制剂的辅料，紫杉醇注射液中可能引起过敏反应的辅料是()

- A: 聚乙烯醇蓖麻油
- B: 邻苯二甲酸二辛酯
- C: 乙醇

D: 聚氯乙烯

答案：A

83. (2018 年真题) 通过分解产生新生态氧而发挥杀菌除臭作用，用于治疗痤疮的药物是 ()

A: 壬二酸

B: 过氧苯甲酰

C: 阿达帕林

D: 维 A 酸

答案：B

84. 过量使用, 会导致大量的中间代谢产物 N-乙酰对苯醌亚胺堆积, 引起严重肝毒性的药物是 ()

A: 对乙酰氨基酚

B: 阿司匹林

C: 双氯芬酸

D: 塞来昔布

答案：A

85. 淋巴细胞白血病采用

A: 糖皮质激素大剂量冲击疗法

B: 抗结核病药与糖皮质激素合用

C: 糖皮质激素一般剂量长期疗法

D: 糖皮质激素小剂量代替疗法

答案：C

86. 服药后尿、唾液、汗液、痰液、泪液等排泄物均可显橘红色的药物是 ()

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/828070122045007022>