

系统复习资料汇编

考试复习重点推荐资料

百炼成金模拟考试汇编

阶段复习重点难点梳理

适应性全真模拟考试卷

考前高效率过关手册集

高效率刷题好资料分享

学霸上岸重点笔记总结

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

外科主治医师-《专业实践能力》试卷及答案

一、A3/A4

1.女性，30 岁。处于月经期，自述乳房胀痛。查体：乳房有多个结节状肿块，可推动，边界不清。

1) 最可能的诊断是

- A. 乳腺癌
- B. 乳房纤维腺瘤
- C. 乳房囊性增生症
- D. 乳管乳头状瘤
- E. 乳房肉瘤

【正确答案】 C

【答案解析】 该患者处于月经期，而且乳房肿痛，考虑与月经周期有关，再结合患者的查体所见，考虑乳房囊性增生症的可能性最大。因为乳房纤维腺瘤、乳管乳头状瘤、肉瘤的边界是清晰的；乳腺癌一般跟月经周期无关。

2) 关于乳腺囊性增生病，下述哪项是错误的

- A. 雌孕激素比例失调
- B. 乳腺实质的良性增生
- C. 该病一般不需要治疗
- D. 可与乳腺癌同时存在
- E. 常伴有腋窝淋巴结肿大

【正确答案】 E

【答案解析】 常见于 30~50 岁女性。基本病理改变是乳腺实质的良性增生。本病病程长，发展和康复缓慢，临床症状波动变化大。主要为乳房胀痛和肿块，疼痛特点是具有周期性，与月经周期常相关，典型表现是月经前疼痛加重，月经来潮后症状减轻或消失。该病一般不需治疗。疼痛症状重者及与情绪心理有关者，可对症治疗，目前主要用中医药调理。对局限性增生有明显肿块者和有乳腺癌高危因素者，应定期复查，一般在月经结束 5~7 天复查，如肿块变软消退则可继续观察。因其属于乳腺实质的良性增生，故一般无腋窝淋巴结肿大。

本题知识点：乳房囊性增生病，

3) 关于乳腺囊性增生症的病因下列说法错误的是

- A. 与内分泌失调有关
- B. 病因尚不明确
- C. 与精神因素无关
- D. 催乳素升高
- E. 长期处于紧张焦虑的状态会增加会此病的几率

【正确答案】 C

【答案解析】 乳腺增生病的病因尚不十分明了。目前多认为与内分泌失调及精神因素有关。近年来，许多学者认为，催乳素升高也是引起乳腺增生病的一个重要因素。

本题知识点：乳房囊性增生病，

2.男性，55 岁。高血压伴冠心病 4 年。于 2 天在大排档吃饭时和人产生冲突，导致右下肢近腘窝处被刀刺伤，随后出现搏动性肿块，逐渐增大伴右下肢麻木，查体：下肢苍白，窝部搏动性肿块大小为 3cm×4cm，附近有收缩期杂音。

本题知识点：周围动脉瘤，

1) 最可能的诊断为

- A. 动脉开放性损伤
- B. 动脉闭合性损伤
- C. 动静脉瘘
- D. 动脉假性动脉瘤
- E. 以上都不是

【正确答案】 D

【答案解析】 本题中患者为损伤后动脉瘤。

动脉瘤是由于动脉壁的病变或损伤，形成动脉壁局限性或弥漫性扩张或膨出的病理表

现，以膨胀性、搏动性肿块为主要症状，可以发生在动脉系统的任何部位，以肢体主干动脉、主动脉和颈动脉较为常见。

本题知识点：周围动脉瘤，

2) 动脉瘤从病理学观点可分为真性动脉瘤、假性动脉瘤和夹层动脉瘤夹层血肿三种类型。

关于假性动脉瘤的概念下列说法正确的是

- A. 血管壁全层局部扩张
- B. 血管壁部分由纤维组织构成的局部扩张
- C. 动脉粥样硬化性动脉瘤
- D. 检查时有震颤并可听到连续性杂音
- E. 压迫动脉瘤出口部分出现血压升高，脉压缩小及脉率缓的现象

【正确答案】 B

【答案解析】 动脉瘤是动脉壁局部薄弱后所形成的永久性异常扩张，由动脉硬化、创伤、感染、梅毒及先天性等因素引起。动脉硬化是最常见和最主要的原因。真性动脉瘤是由动脉壁全层呈囊状或梭形扩张而形成；假性动脉瘤是由动脉壁破裂后引起局部血肿，以后由纤维组织包绕而继续与动脉沟通的肿物，创伤性动脉瘤大多属此种类；夹层动脉瘤因动脉壁本身分裂而成，动脉瘤和动脉经过动脉内膜上的裂口而互相交通。

本题知识点：周围动脉瘤，

3) 根据患者的症状与体征，动脉瘤最典型体征是

- A. 肢体苍白
- B. 肢体感觉异常
- C. 搏动性肿块
- D. 肢体疼痛
- E. 肢体缺血

【正确答案】 C

【答案解析】 搏动性肿块是动脉瘤最典型的体征，伴有震颤和血管杂音。

本题知识点：周围动脉瘤，

3.女性，30 岁。半年前剖腹产史，近 3 个月来下腹切口处逐渐隆起，出现一直径为 3cm 的肿块，站立和用力排便时明显，平卧休息时消失，起病来偶感腹部隐痛，伴有食欲减退、便秘。

本题知识点：腹壁切口疝，

1) 初步判断为

- A. 直疝
- B. 斜疝
- C. 股疝
- D. 切口疝
- E. 卵巢囊肿蒂扭转

【正确答案】 D

【答案解析】 本例有腹部手术史，在切口部位逐渐隆起的包块，腹压增高突出明显，腹压减轻时消失，以及腹部隐痛、便秘等这些都是切口疝的典型特点和主要表现。

本题知识点：腹壁切口疝，

2) 该病人术后发生切口疝最重要的解剖因素可能是

- A. 术后局部组织感染
- B. 下腹部腹直肌后鞘不完整
- C. 腹壁肌层纤维都是纵行的
- D. 切口切断了重要肌层纤维
- E. 缝合切口时留有死腔

【正确答案】 B

【答案解析】 该病人下腹部手术史，下腹部最重要的解剖因素是因为腹直肌后鞘不完整，加上手术带来的损伤，所以切口疝下腹部更多见。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/835240230043011221>