

1. 晶体悬韧带发育完全的时间是 C、胎儿出生時
2. 睑外翻的病因中不包括 B、動眼神經麻痹
3. 有关睫状环阻塞性青光眼的论述 E、尽快滴用 1%匹罗卡品眼液缩小瞳孔
4. 有关眼球穿孔伤，下列哪种說法是錯誤的 C、脱出的晶状体应予复位
5. 球後視神經炎的視野变化中，錯誤的是 C、偏盲性視野缺损
6. 有关同側偏盲的描述，下列錯誤的是 A、多為視交叉此前的病变所致
7. 青光眼斑是指位于（ ） A、晶状体前囊下的片状白色混浊
8. 如下哪项不属于慢性滤泡性結膜炎 D、可伴有角膜血管翳
9. 眼底检查发现右眼後极部视网膜有深浅不等的出血、渗出灶及微血管瘤。為明确诊断，最需做何种检查 D、荧光眼底血管造影
10. 禁用皮质类固醇激素治疗的疾病是 e、中心性浆液性脉络膜视网膜病变
11. 有关枯草热結膜炎的描述，下列何者不對的（ ） B、結膜刮片可找到嗜碱性细胞或嗜碱性結节
12. 有关色苷酸钠滴眼液的說法，如下哪项不對的（ ） D、可完全替代糖皮质激素

13. 下列後发性白内障的說法哪項錯誤 ( ) A、影响视力的程度与後囊膜混浊程度和厚度無關

14. 巩膜三大微弱处位于 ( ) B、角巩膜缘、肌肉附著點、赤道後

15. 惡性泪腺混合瘤的特點為 ( ) e、以上全是

16. 真菌所致角膜溃疡的特點不包括 ( ) E、溃疡表面湿润有光泽

17. 视网膜色素变性可出現的视野变化為 ( ) A、向心性视野缩小

18. 功能性泪溢患者泪道冲洗時 ( ) D、從泪點注入的液体顺利進入鼻腔或咽部

19. 下列哪項可导致結膜干燥综合征 ( ) C、自身免疫性原因

20. 沙眼的初期，角膜血管翳常发生于 ( ) C、角膜上 1/3

21. 流行性角結膜炎传染期一般為 ( ) B、发病後 7~10 天

22. 细菌性結膜炎患者結膜的分泌物為 ( ) D、浆液性、黏稠丝状和脓性

23. 耳前淋巴結肿大和压痛最常見于哪种結膜炎 ( ) D、病毒性結膜炎

24. 結膜细胞學检查時可見大量的嗜酸性和嗜碱性粒细胞增多時应考虑 ( ) E、春季結膜炎

25. 感染性角膜溃疡一旦穿孔或即将穿孔，其最佳的治疗措施是（ ） D、治疗性角膜移植术

26. 後巩膜葡萄肿位于眼底後极部及视盘周围，多見于下面哪种疾病（ ） D、高度近视眼

27. 白内障未成熟期散瞳检查禁用的散瞳药為（ ） E、阿托品

28. 急性闭角型青光眼常有（ ） E、遠视

29. 患儿，女，5岁。2岁时发现内斜视。检查：视力右眼0.3，左眼0.1。眼位：左眼+15°。眼球运动各方向均不受限。眼底未发现明显异常。同视机检查不合作。睫状肌麻痹下验光成果為中度遠视。為观测眼位变化状况，至少戴镜多长时间 D、3~6個月

30. 患者，女，70岁。发现左上睑硬结，坚硬，眼睑皮肤面無异常。為明确诊断应做的检查是（ ） B、肿物切除组织病理學检查

31. 青年女性患者，双眼球轻度突出，伴上睑退缩，巩膜暴露。超声波检查提醒眼外肌肥大，無明显占位性病变。若病情深入发展，双眼球高度突出，眼睑闭合不全，球結膜高度水肿伴复视。其治疗原则不包括（ ） A、手术矫正斜视

32. 患者，女，36岁。左眼流泪3年，泪囊区稍隆起，压迫泪囊区有脓液從下泪點溢出。较理想的治疗措施是（ ） E、泪囊鼻腔吻合术

33. 某男，37岁，既往無眼病史，出現右，眼视物模糊变暗15天。检查视力：右眼0.6，左眼1.5，眼底检查：视乳頭颜色正常，边界清晰，動静脉未見明显异常，黄斑部可

見 2PD 大小的水肿区，中心凹反射消失。為深入明确诊断，需要作下列哪项辅助检查 ( ) A、眼底荧光血管造影

34. 女患者，50 岁，因右眼被玉米叶划伤 1 天入院。查：右眼睫状充血，角膜颞上方可见一约 2mm×3mm 大小病灶，略隆起。体现较干燥，周围呈毛刺状变化，角膜基质层水肿，前房可见约 1mm 积脓。有关该病人的治疗，如下错误的是 ( ) C、适量应用糖皮质激素

35. 患者，男，30 岁，左眼被网球击中，双眼视物成双 10 天，全身一般状况可。眼部检查：视力右 1.0，左 1.0，右眼前节及眼底未见异常，左眼睑皮肤瘀血肿胀(+)，结膜充血(+)，角膜透明，眼底未见异常；角膜映光左眼 R/L 10°，左眼上转不能过中线，左眼眶下皮肤感觉障碍。最佳治疗方案为 ( ) A、手术治疗

36. 患者，男，42 岁。主因左眼被铁屑溅伤后视力下降 2 天而入院。查：视力左眼手动，左眼结膜混合性充血中度，结膜囊可见黄绿色脓液，角膜中央可见一直径约 5mm 的圆形溃疡灶，边缘呈灰白色浓密浸润，眼 溃疡表面大量黏稠分泌物附着，房水闪辉(++)。下列哪项检测措施有助于该病的诊断 ( ) C、分泌物培养+药物敏感

37. 男，35 岁，因左眼视力下降伴虹视 2 天就诊。查：左眼视力 0.6，左眼 (NCT)58mmHg，角膜水肿，可见多量羊脂状 KP 呈三角形分布，周围前房约 1/2CT，房水闪辉(+)，瞳孔圆，直径约 3mm，对光反应迟钝，眼底查：C/D=0.3。该病例也许的诊断是：D、青睫综合征

38. 某男，65 岁，高血压病史，忽然出现右眼视物模糊 1 小时。眼部检查：右眼视力：眼前手动，左眼视力：0.6，右眼角膜透明，前房深浅正常，瞳孔散大，对光反

应迟钝，晶体轻度混浊，眼底检查：视乳头色淡，边缘模糊，动脉、静脉管径均变细，後极部视网膜呈乳白色，黄斑区可见樱桃红斑。该患者首先考虑的诊断是 A、视网膜中央动脉阻塞。

39. 患者，女，42岁。因散瞳检查眼底，3小时后出现头痛、恶心、呕吐、眼部胀痛且视物不清，眼部结膜充血，角膜雾状混浊，瞳孔散大，直径约5mm，对光反应消失，余窥不清。该病例的诊断应考虑为： E、急性青光眼

40. 新生儿，生後第3天家長发现患儿双眼发红流泪，且伴有大量脓性分泌物。查：双眼睑高度水肿，结膜充血水肿，结膜囊可见大量黄绿色脓性分泌物，角膜清，余检查不配合。该患儿最也许的诊断是 B、新生儿淋球菌性结膜

41. 先天性後鼻孔闭锁最佳的手术措施是（ ） D、鼻内镜下後鼻孔修复术

42. 下列哪一项能评价鼻源性眶内并发症病情的严重程度（ ） A、眼球突出和视力变化

43. 蝶窦炎可（ ） D、直接扩散至海绵窦引起海绵窦血栓性静脉炎

44. 颞上听功能测试不包括（ ） A、盖莱试验

45. 声刺激在内耳转化为听神经冲动後，由蜗神经传至脑干耳蜗腹侧核，经同侧或交叉後從对侧上橄榄核传向两侧面神经核，再经面神经引起所支配的镫骨肌收缩，随即鼓膜松弛，鼓膜顺应性的变化由声导抗仪纪录，称为 B、镫骨肌声发射

46. 对脂性耳漏的描述，如下错误的是（ ） E、油性耳漏与细菌感染有关

47. 有关鼓膜的描述，如下不對的的是（ ） E、紧张部分為二层
48. 人骨蜗管旋绕蜗轴的周数是（ ） D、2.5~2.75
49. 人体处在何种体位時，外半规管与地面垂直（ ） C、直立位頭前倾 30°
50. 下列哪项描述有误（ ） B、神經性聋又称精神性聋或癩病性聋
51. 颈前甲状舌骨膜处有一圆形囊性肿物，時大時小，用手挤压可缩小，穿刺有气体，首先应考虑的是（ ） C、喉气囊肿
52. 一声嘶患者，時有咳嗽并感呼吸困难，喉镜检查見一侧室带膨出，遮盖同侧声带并阻塞部分声门，其体积随呼吸而变化，吸气時缩小，用力鼓气時增大，应诊断為（ ）  
C、喉气囊肿
53. 有关喉角化症的描述，如下對的的是（ ） E、病变黏膜表面有白色點状锥形突起，拭之易脱落
54. 對喉白斑病的描述，如下不對的的是（ ） E、喉镜检查見声带表面或其边缘有一层微凸而表面平整的发白斑片，易拭去
55. 如下哪项不是喉癌前期病变（ ） C、喉淀粉样变
56. 接诊IV度喉梗阻患者，對的的处理是（ ） D、立即行气管切開术，若病情拾分紧急，可先行环甲膜切開术或气管插管

57. 假如喉神經麻痺，声带活動狀況為（ ） D、外展、内收均正常
58. 临床上喉感覺神經性疾病的诊断要點是（ ） C、充足排除器质性病变
59. 食管异物最常发生于（ ） A、食管入口
60. 男性患儿，2岁，因误吸花生米後呛咳4天。胸片示右肺不张，听诊右肺呼吸音低，临床拟诊為右支气管异物，欲行支气管镜检查。应选择支气管镜的内径為（ ） B、4.0mm
61. 变应性鼻炎免疫疗法的机制是（ ） A、使患者体内产生 IgG 封闭抗体，阻断变应原与 IgE 結合
62. 下鼻甲参与鼻腔通气功能调整的解剖學基础重要為（ ） D、下鼻甲具有大量海绵状血窦
63. 有关噪声性聋的說法，下列哪项是對的的（ ） C、听力损害特點是：由高频向語频发展，逐渐加重。
64. 咽喉切割伤有关呼吸困难急救处理，下列哪项不合适（ ） D、及時使用呼吸中枢兴奋剂
65. 40Hz 听性有关電位临床应用中，最有价值的是（ ） B、客观评估听力水平
66. 出生後就有也許感染的鼻窦是（ ） E、上颌窦和筛窦

67. 有关甲状舌管囊肿及瘻管切除术，如下說法不對的的是（ ） E、应尽量保留舌骨

68. 行食管镜检查後 3 天，出現胸痛，发热，胸 X 线显示纵隔增宽，最也許的原因是（ ） C、食管穿孔，引起纵隔感染

69. CT 显示一侧上颌窦腔密度增高，伴不规则钙化影及窦壁骨质缺损，最也許的诊断是（ ） C、霉菌性鼻窦炎

70. 有关阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征手术治疗的說法，下列哪项是錯誤的（ ） E、手术治疗既可解除中枢性的也可处理外周性的 OSAHS

71. 根据受损程度不一样對喉运动神經瘫痪進行分型，如下不属于此种分型的是（ ） A、喉返神經不完全瘫痪，患侧声带居正中位不能外展，對侧正常

72. 下列不属于气管切開适应证的是（ ） B、多种原因的呼吸困难

73. 有关单纯型中耳炎的治疗，如下說法錯誤的是：（ ） C、抗生素粉剂用于脓多時效果很好

74. 下列對喉麻痹的描述，不對的的是：（ ） D、右侧喉返神經麻痹的发病率较左侧约多 1 倍

75. 收缩時使声带内收，声门关闭的是（ ） B、环杓侧肌和杓肌

76. 經典的上水平部分喉切除，手术切除范围包括（ ） A、會厌，室带，會厌前间



隙

77. Ohngren 界线是指 ( ) A、通過同侧内眦和下颌角的平面
78. 下列何种音叉检查成果提醒右耳传导性聋 ( ) B、Weber test 偏右, Rinne test 左耳阳性, 右耳阴性
79. 左耳感音神经性聋, 音叉检查成果为 ( ) B、RT 右耳阳性, 左耳阳性, WT 偏右
80. 如下哪项不符合小儿喉痉挛 ( ) C、伴发热、声嘶
81. 有关喉乳头状瘤的描述, 如下哪项是错误的 ( ) E、不会癌变
82. 有关喉癌的说法, 如下对的是 ( ) E、声门型喉癌初期症状为声嘶
83. 鼻腔毛细血管瘤最常见于: ( ) C、下鼻甲前端和鼻中隔前部
84. 鼻腔鼻窦癌肿来源于黏膜上皮或腺上皮, 最多见的是: ( ) C、鳞状细胞癌
85. 甲状舌管囊肿及瘻手术的治疗原则是: ( ) B、切除囊肿、瘻及有关的舌骨和舌根组织
86. 某患者, 左侧颈部胸锁乳突肌前缘及舌骨水平处可见一包块, 其上有一瘻孔, 触诊, 有一索状物指向耳部, 耳屏处亦可见一瘻孔, 可有干酪样物挤出。最有也许的诊断是: ( ) C、第一鳃裂瘻

87. 一成年男性，因误食魚骨後吞咽痛 8h 後急诊，急诊作食管吞钡摄片，发现第 5 胸椎水平异物影，并有钡剂滞留，請問异物位于第几狭窄：( ) C、左支气管压迹

88. 患者，男性，主诉左耳听力下降 1 周。纯音電测听示传导性聋，声导抗测试為 B 型曲线，外耳道容积 2.6ml。简朴可靠的治疗措施是 ( ) B、鼓膜穿刺抽水

89. 女患者，28 岁，左耳持续性流脓 9 年，伴耳道長肉芽 1 年来诊。检查：外耳道有易出血血性肉芽，有黄色脓液，鼓膜窺不見。CT 示上鼓室、鼓室及乳突內有软组织阴影，伴有轻微骨破坏。该病人最也許诊断是 ( ) B、骨溃型中耳乳突炎

90. 患者，男，25 岁。主诉间断回涕带血伴左侧鼻塞，左耳听力下降 3 個月，左颈有無痛性肿块 1 個月。左鼻咽镜下見咽隐窝处有菜花状外生物，触之易出血，质脆，左鼓室有积液。若病理成果為低分化鳞状细胞癌，下一步治疗应行 C、放射治疗

91. 超声诊断肝脓肿必须具有的条件是 ( ) C、实质内單发或多发类圆形以囊性為主  
的病变，後方增强效应明显

92. 周围血管检查時，如下哪种状况可以同步获得最佳的二维图像和最佳的血流显像  
( ) E、二维的声束/血管夹角尽量垂直，而 CDFI 的声束/血管夹角尽量小

93. 對於流入道型（隔瓣下）室间隔缺损，超声最佳显示切面是 ( ) B、心尖四腔  
心和五腔心

94. 彩色多普勒血流显像与伪彩（B 彩）的区别是 ( ) D、彩色多普勒与伪彩不是同  
一种概念

95. 正常 M 型超声心动图心室波群可反应如下哪种构造的运动状况 ( ) E、室间隔

96. 男, 23 岁, 超声查体发现肾窦边缘肾锥体的乳头部回声明显增强, 后方声影不明显。最也许的诊断是 ( ) D、海绵肾

97. 在声像图中, 下列哪一项是多发性肾囊肿和多囊肾的重要鉴别点 ( ) E、多囊肾没有完好的肾实质, 无囊肿的部位回声增强, 而多发性肾囊肿可有残存的正常肾实质, 无囊肿的部位回声正常

98. 男性, 70 岁, 间歇性无痛性肉眼血尿 3 个月。超声查体见膀胱左后壁有实性强回声结节, 大小约 1.2cm×1.6cm, 向膀胱内突出, 基底部与膀胱壁无明显分界, 变化体位结节不活动。下列哪项诊断对的 ( ) B、膀胱癌

99. 下列哪项超声征象不符合缩窄性心包炎血液动力学变化 ( ) E、室间隔舒张期运动异常, 初期向前然后向后运动。

100. 局限性脂肪肝的经典超声体现是 ( ) B、实质内无占位效应的片状细密强光点回声, 内见正常通行的血管

101. 持续多普勒取样线上的符号表达 ( ) C、波束发射与接受的焦点

102. 超声探头须具有一定的技术特性, 下列哪项说法是错误的 ( ) E、超宽频及变频探头可彻底处理超声成像中的所有问题

103. 男性患者, 37 岁, 既往有肝炎史。超声发现脾脏明显肿大, 肝表面不光滑, 肝实质回声不均匀。右肝可见 3cm 的圆形病变, 边缘整洁光滑, 有无回声晕, 内部为均匀

低回声。诊断最也许是 ( ) D、肝硬化合并肝肿瘤

104. 超声测量胎儿股骨长度，怎样才能防止较大的测量误差 ( ) D、使声束与胎儿股骨尽量保持垂直

105. 一阵发性高血压患者，右侧肾上腺区发现一 4cm×5cm 椭圆形肿块，边界清晰，呈中等不均匀回声，内见不规则小透声区。最也许诊断是 ( ) A、嗜铬细胞瘤

106. 患者因血肌酐、尿素氮增高行超声检查，示双肾体积缩小，肾皮质回声增强，皮髓质分界不清，肾内构造紊乱不清，彩色多普勒超声示肾内血流信号稀少。其最也许的诊断是 ( ) E、慢性肾功能衰竭

107. 患者，55 岁，绝经 5 年后阴道流血 1 周。诊断性刮宫，病理为子宫内膜高分化腺癌。下列哪项是错误的 ( ) C、已经有病理诊断，不需要再做经阴道子宫超声检查。

108. 乳腺炎的超声特点是 ( ) D、乳腺内回声减低、分布均、边界模糊欠清

109. 男性患者，45 岁，上腹不适 2 伴体重下降。声像图显示胰头区不规则低回声实质性肿块，边界不清，呈蟹足状，肠系膜上静脉轻度抬高，肝内外胆管扩张，主胰管内径 4mm。最也许的诊断是 ( ) E、壶腹癌

110. 下列哪项超声体现是支持软组织内金属异物最重要的证据 ( ) D、强回声后方拖著明亮的“彗星尾征”

111. 体内污染下列哪种核素可通过体外测定估计污染水平 ( ) D、 $\gamma$ 射线

112. 申請核醫學檢查與治療時應遵照哪一原則 ( ) E、以上均對的
113. 在採用核醫學措施進行疾病診斷時下列哪一做法是錯誤的 ( ) A、對心律失常患者進行門控心肌血流灌注顯像
114. 再生障礙性貧血患者經治療後需評價骨髓造血活性，應選用何種核醫學檢查措施 ( ) B、骨髓顯像
115. 一級核醫學工作場所的規定為 ( ) E、以上均是
116. 核醫學診斷用場所的布局次序為 ( ) A、放射性貯存室-給藥室-候診室-檢查室-診斷室
117. 使用治療量 $\gamma$ 放射性藥物的患者床邊多大範圍內應劃為臨時控制區 ( ) C、1.5m
118. 評價醫學診斷效能的措施中，將敏捷度和特异性結合起來進行評價的指標是 ( ) B、陰性成果預測值
119. 核素顯像劑的選擇需要可靠的顯像性能，下列對於顯像劑的描述哪項是錯誤的 ( ) B、規定血液清除慢，以保證顯像質量
120. 有關 PET/CT 顯像的論述，如下哪項是對的 ( ) E、PET/CT 顯像可以進行圖像解剖和功能融合
121. 核醫學分子影像中，儘管不一樣的技術和研究手段其根據和措施學原理不一

- 样，不過其共同的理论基础同样，這個理论基础是（ ） D、分子识别
122. 18F-FDG 葡萄糖代謝显像重要的临床应用不包括（ ） E、肝脏细胞功能状态
123. 有关重建断层图像的描述，下列哪项是對的的（ ） C、迭代的次数越多，图像重建的越精确
124. 在免疫放射分析時出現“平台效应”是指（ ） C、待测抗原浓度超過一定范围時
125. 局部脑血流灌注显像，显像剂能通過血脑屏障是由于（ ） B、脂溶性、不帶電、小分子
126. 目前認為 99mTc-MIBI 進入心肌细胞後，重要分布于（ ） C、线粒体内
127. 有关心肌放射免疫显像，下列錯誤的是（ ） B、显示病变范围较 99mTc-PYP 显示的大
128. 有关积极脉狭窄在核素動脉显像上的图像特點，下列錯誤的是（ ） D、動脉相病变处放射性提前抵达
129. 核素显像在循环系统疾病的诊断和评价，如下论述錯誤的是（ ） D、對先天性心血管疾病的诊断方面，初次通過法拾分有效，其敏捷度和特异性均好于超声心动图
130. 放射性肝胆動态显像适应证不包括（ ） B、诊断肝血管瘤

131. 手屈肌腱修复术後 1~4 周，置動力夹板使 ( ) C、腕处在屈 30°，掌指关节屈 70°，指间关节伸展位

132. 上肢截肢者的肩胸运动很重要，其原因由于 ( ) D、肩胸运动可提供双控制缆绳系统假体所需的力

133. 手神经外伤後，感觉恢复的次序是 ( ) C、痛覺、温度覺、32Hz 振動覺、移動性觸覺

134. 一位患有股四頭肌肌腱炎的患者症状逐渐開始，每天锻炼终了時尤其是跳跃、跑上楼梯時最疼，其肌力训练应是 ( ) B、集中闭链运动练习，如蹲坐、冲刺

135. 手屈肌腱修复术後中期(术後 6~8 周)可進行 ( ) E、以上均可以

136. 冠心病的康复评估最重要的是 ( ) E、运动试验

137. COPD 康复治疗中最有效的呼吸方式 ( ) D、缩唇呼吸

138. 烧伤创面出现新鲜肉芽组织時，紫外线照射剂量可选用 ( ) C、阈紅斑量

139. 烧伤患者的积极运动不對的的是 ( ) D、只做患侧，越多越好

140. 压疮护理中最重要的措施是 ( ) B、局部减压

141. 依托轮椅生活的患者为防止压疮的发生应指导患者 ( ) D、不超過 30 分钟使臀部抬离椅面 30 秒

142. 穿脱衣服训练护理要點中錯誤的是 ( ) B、穿衣服時应先穿健側後穿患側

143. 患者，男性，35岁，患有脑干梗死。其妻来征询有关患者用胃管鼻饲吞咽問題。床旁检查可发现发生吸入的临床预测指標，床旁检查所見不包括( ) D、出現感覺性失語

144. 根据感染的伤口、创面、潰瘍的状况调整紫外线剂量，下列哪项不對的 ( ) B、创面逐渐洁净，肉芽逐渐新鲜，脓性分泌物減少時，照射剂量不变

145. 截肢後下肢残肢肌肉训练重點是 ( ) C、臀大肌、臀中肌、股四頭肌

146. 吞咽训练時，當患者會厌上凹易残留食物時，应采用下述哪项训练 ( ) D、點頭样吞咽

147. 患者，女性，30岁。刀割伤右腕致腕屈肌及指屈肌腱断裂，現右手功能障碍，進行作业治疗前评估重點是 ( ) A、感覺运动功能

148. 慢性疼痛综合征的康复治疗目的不包括( ) c 減少疼痛水平，使患者能增强功能

149. 患者，女性，62岁，脑卒中後出現踝跖屈肌痙攣影响其步行已3個月。合适的治疗方略是( ) B、牵张方案，供应一种踝足矫形器

150. 脊髓灰质炎患者出現瘫痪後，防止畸形的康复治疗措施不包括 ( ) E、防止骨质疏松

151. 如下哪项是小棘苔藓的好发部位 ( ) D、腋窝及臀部



152. 有关脓疱型银屑病的描述，如下對的是（ ） D、脓疱可融合成脓湖

153. 患者，男性，45岁。因"上感"口服阿莫西林3天後，颜面及四肢出現水肿性紅斑及水疱，呈"虹膜状"，口服扑尔敏無效，皮疹加重，躯体广泛水肿性暗紅斑及水疱，眼結膜充血、口腔黏膜糜烂，伴高热、关节痛。此患者最也許的诊断是（ ） C、重症多形紅斑

154. 患者女，31岁。因躯体、四肢出現紅色丘疹、斑丘疹及银白色鳞屑，伴瘙痒。口服泼尼松治疗2周停药後，全身皮肤忽然出現急性炎性紅斑，表面為针頭大小密集的脓疱，以四肢屈侧及腹股沟较重，伴全身不适、发热及关节疼痛，化验：血常规白细胞升高。该患者最也許的诊断是：（ ） C、脓疱型银屑病

155. 患者，女，40岁。双前臂屈侧出現皮疹六個月，伴瘙痒。体检：双前臂屈侧可見散在紅色、紫紅色多角形扁平丘疹，表面覆白色角质薄膜，有蜡样光泽，口腔黏膜可見乳白色网状白纹。该患者最也許的诊断是（ ） C、扁平苔藓

156. 黑棘皮病的临床体现不包括（ ） B、角化不全

157. SLE 最常見的致死原因是（ ） D、肾衰竭

158. CREST 综合征的特异性抗体是（ ） B、抗著丝點抗体

159. 有关硬皮病的治疗，如下錯誤的是（ ） C、大剂量糖皮质激素

160. 50岁女性，因面部出現水肿性紫紅色斑伴四肢肌肉酸痛無力六個月，吞咽困难

余天就诊。查体发现双手指伸侧对称分布扁平紫红色鳞屑性丘疹，甲周可见毛细血管扩张及瘀点。其最也许的诊断是（ ） B、皮炎

161. 组织病理具有"倒塌的砖墙"这一特性变化的疾病是（ ） C、家族性慢性良性天疱疮

162. 有关妊娠疱疹的临床特性，如下描述不对的是（ ） E、持续加重

163. 急性渗出性湿疹选择哪种剂型最佳（ ） A、溶液

164. 有关药疹的诊断，如下哪项是错误的（ ） E、根据药疹型和皮疹特点可以作出诊断

165. 有关褶烂的防治，如下哪项是错误的（ ） C、发生糜烂或渗出时外用抗生素软膏消炎

166. 有关硬下疳的描述，如下哪项是错误的（ ） B、溃疡表面有大量脓性分泌物

167. 如下疾病不适合外用糖皮质激素治疗的是（ ） D、体股癣

168. 女性患者，26岁，孕36周。外阴起水疱，伴疼痛3天。查体：左侧大阴唇内侧可见簇集的针尖大小的水疱，周围有红晕，壁薄，易破。有触痛。试验室检查：疱液HSV-DNA阳性。（ ） E、生殖器疱疹

169. 乳房湿疹的特点是（ ） B、皮损呈棕红色

170. 有关口腔黏膜白斑的說法，如下錯誤的是（ ）E、若皮损表面有白色膜状物即可

## 排除诊断

171. 有关急性光化性唇炎和慢性光化性唇炎区别的描述，如下错误的是（ ）C、慢性光化性唇炎皮损易破裂，糜烂，表面可见黄棕色血痂或形成溃疡。

172. 有关毛发的生长周期，下列论述错误的是（ ）D、眉毛和睫毛的生长期约为4个月，故较长

173. 皮肤组织中经紫外线照射后可合成维生素D的物质是（ ）C、7-脱氧胆固醇

174. 有关表皮组织的能量代谢特点，如下对的是（ ）A、糖酵解是最重要的途径

175. 皮肤对油脂的吸取能力是（ ）C、羊毛脂>凡士林>植物油>液体石蜡

176. 基底膜在电镜下的构造区域不包括（ ）E、角质层

177. 有关免疫耐受的描述，下列对的是（ ）C、正常状况下，对自身组织成分不产生免疫应答，处在自身免疫耐受状态

178. 补体不具有的生物学功能是（ ）C、ADCC作用

179. 皮肤迟发型超敏反应患者的皮损部位活体组织学检查，其特点为（ ）E、小血管周围有单个核细胞浸润

180. 速发型超敏反应中引起皮肤奇痒的物质是（ ）C、组胺

181. 既可引起浅部真菌感染，又可引起深部真菌病的是（ ） C、念珠菌

182. 有关口服特比萘芬治疗甲真菌病，下列描述错误的是（ ） C、必须在饭后服药

183. 马拉色菌毛囊炎重要皮损形态为（ ） B、毛囊性半球形小丘疹

184. 男性，28岁。2周来全身出现散在玫瑰色指甲盖大的红斑，累及躯干、四肢掌跖。不痒。体检发现肛门附近有半环形排列的湿性丘疹，表面浸渍状。全身淋巴结肿大。应考虑（ ） A、二期梅毒

185. 女患者，妊娠38周，发现肛门赘生物2天，稍有瘙痒。自诉2个月前有外阴溃疡史，无痛，无痒，未诊治，自愈。配偶有婚外性生活史。查体：肛周可见数个暗红色、直径1~3cm的扁平疣状损害，基底宽，无蒂，表面少许渗液。最可能的诊断是（ ） C、扁平湿疣

186. 男性，28岁。尿痛排尿困难，龟头红肿流脓4天，7天前有不洁性接触史。检查：包皮龟头红肿，尿道口肿胀外翻，有大量黄色脓液自尿道口溢出。最可能的诊断是（ ） C、淋病

187. 患者，男，38岁。会阴钝痛1个月，尿痛3天，有冶游史。查体：尿道口轻度红肿，少许浆液性分泌物，前列腺轻度肿大。前列腺常规检查高倍镜下白细胞(+++)。本病最可能的诊断是（ ） C、非淋菌性尿道炎合并前列腺炎

188. 有关小朋友型皮炎，如下哪项是错误的（ ） C、预后较成人差

189. 荨麻疹的发病机制主要有免疫性和非免疫性两类，下列荨麻疹属非免疫性的是

( ) D、延迟性压力性荨麻疹

190. 下列哪项不是慢性光化性皮炎的诊断根据 ( ) D、皮肤划痕试验阳性

191. 湿疹症状的特点是 ( ) A、多形性皮疹，有渗出倾向，对称分布，瘙痒明显，易复发

192. 慢性湿疹组织病理学变化与银屑病的关键区别为 ( ) A、前者有海绵形成，而后者往往没有

193. 有关接触性皮炎说法，下列错误的是 ( ) A、不会发展到全身

194. 男性患儿，1岁，口周、鼻周、肛周、双手背起红色鳞屑性斑块伴腹泻3个月余就诊。患儿断奶后1个月发生上述皮疹，初期皮损为红斑基础上的群集水疱或大疱，尼氏征阴性。曾予以抗过敏，抗真菌治疗无效。患儿精神差，表情淡漠。对的诊断是 ( ) C、肠病性肢端皮炎

195. 患者，男性，41岁，上背部及双臂外侧其褐色苔藓样皮疹伴痒1年。1年前患者上背部始出现褐色针头大小的丘疹，瘙痒明显，用抗过敏药治疗能缓和症状，但皮疹继续增多，密集成片，丘疹顶端出现苔藓样变化。皮损组织病理：角化过度，棘层增生肥厚，皮突延长增宽，乳头和真皮上部见嗜红性团块状物质，并见色素失禁现象。该患者应诊断为 ( ) D、皮肤淀粉样变

196. 患者，女性，24岁。精神遭受打击后开始厌食3个月，双臂、面颈出现暗红斑2个月，口腔溃疡、腹泻半个月。试验室检查结果显示贫血、低蛋白血症。予以复合维生素

素 B、烟酰胺、富馬酸亚铁治疗 2 周，症状明显缓和。应诊断為 ( ) E、烟酸缺乏症

197. 大疱性表皮松解症的皮损好发部位是 ( ) C、肢端及四肢关节伸面等易受到摩擦处

198. 患儿，男性，15 岁，2 年前两臂出現针尖到粟粒大小与毛孔一致的坚硬丘疹，不融合，顶端有褐色角质栓，内含卷曲的毛发，皮损冬重夏轻。曾服用维生素 A 治疗，症状無改善。其父年轻時有同样病史，現已減輕。该患儿应诊断為 ( ) B、毛周角化症

199. 白塞综合征的皮肤损害經典体现是 ( ) A、結节样紅斑、毛囊炎、针刺反应阳性

200. 男性，15 岁，因四肢皮肤出現紫紅色紅斑丘疹和瘀點 2 周，小腿水肿 5 天就诊。血常规正常，尿蛋白(++)，并出現细胞管型。最也許的诊断為 ( ) D、肾型過敏性紫癜

201. 3 岁小儿作气管内插管時，最适合的气管导管内径及插管深度為 ( ) D、内径 4.5mm，深度 13.5cm

202. 拔除气管导管時处理錯誤的是 ( ) A、當麻醉進入清醒期，為防止咳呛、躁動，尽管咳嗽、吞咽反射尚未恢复，仍可拔除气管导管

203. 有关吸入麻醉药的血/气分派系数，下列哪项對的 ( ) D、血/气分派系数大，麻醉诱导慢

204. 下列麻醉呼吸回路中需要二氧化碳吸取罐的是 ( ) E、紧闭系统

205. 有关腰麻對生理的影响，下列论述哪项錯誤 ( ) C、麻醉平面在 T8 如下時呼吸功能基本無影响

206. 最有效的人工通气措施是 ( ) D、与气管插管相結合的机械通气

207. 下列均為氟芬合剂的禁忌证，但除外 ( ) D、颅脑外伤病人

208. 有关麻醉前用药，如下哪种說法是錯誤的 ( ) C、卞啉病病人应常规使用鲁米那

209. 68 岁患者，在持续硬膜外麻醉下行胃大部切除术，麻醉效果满意。手术開始 2 小時後，血压逐渐下降，經加紧补液，血压下降更為明显，并出現颈外静脉怒张。此時应采用的措施应除外 ( ) E、迅速输入 6% 羟乙基淀粉

210. 男性，72 岁，因前列腺增生在腰 - 硬联合麻醉下行 TURP 术。患者轉為仰卧位後 5min，血压從 145/88mmHg 下降至 85/44mmHg，心率從 78 次/分下降至 55 次/分，患者出現烦躁。下述处理中哪项不對的 ( ) B、静注咪哒唑仑 5mg

211. 男性患者，34 岁，拟在全麻下行腹腔镜胆囊切除术(LC)。在肘窝处静注硫喷妥钠時立即出現上肢剧烈灼热痛、皮肤苍白、脉搏消失。如下哪项措施不對的 ( ) D、用特异拮抗药氟馬西尼

212. 女性，32 岁，在全麻下行腹腔镜卵巢囊肿剥出术。患者曾有哮喘病史，不适宜使用如下哪种麻醉药 ( ) C、硫喷妥钠

213. 男性，85 岁，有心肌梗死史，心功能 IV 级。因胃穿孔拟在全麻行胃穿孔修补术，



最合适的麻醉诱导药是 ( ) A、依托咪酯

214. 有关预给量法的描述，如下哪项不对的 ( ) B、预给量一般为气管插管剂量的 1/5 ~ 1/3

215. 局麻药中加肾上腺素的长处不包括 ( ) D、增强穿透性和扩散力

216. 腋路臂丛阻滞法的长处不包括 ( ) D、不易引起局麻药毒性反应

217. 蛛网膜下腔阻滞时局麻药直接作用于脊神经前后根和脊髓，如下说法不对的是 ( ) D、交感神经阻滞平面比感觉阻滞平面高 1 ~ 3 神经节段

218. 男性患者，31 岁，高处坠落颈部创伤，致急性脊髓高位损伤。急诊入院行颈椎减压内固定术。应选择什么麻醉方式为宜 ( ) E、全身麻醉

219. 男性患者，37 岁，68kg。右手被机械挫伤，食指至无名指皮肤破损，肌腱及神经损伤，急诊行清创、肌腱和神经吻合术。既往体健。20 分钟后麻醉效果仍不完善，锁骨上入路注入 2%利多卡因 15ml 与 0.5%布比卡因 15ml 的混合液，5 分钟后患者诉憋气，心慌，烦躁不安，最可能的状况是 ( ) B、局麻药中毒

220. 女患者，48 岁，因发现乳腺癌拟全麻下行乳腺癌改良根治术。既往哮喘，每年春季发作频繁，吸入激素和沙丁胺醇治疗，症状可以控制。为防止麻醉诱导气管插管引起的心血管反应，哪项措施应慎用 ( ) D、静注  $\beta$  受体阻滞剂

221. 有关重度 HIE 的临床体现，下列哪项对的 ( ) C、昏迷、新生儿反射均消失

222. 新生儿寒冷损伤综合征硬肿发生的次序為 ( ) B、下肢→臀部→面部→上肢→全身

223. 小儿热性惊厥病理生理变化中哪项是不對的 ( ) D、局部体现较明显

224. 有关风疹的描述，下列錯誤的是 ( ) D、风疹病毒耐热，在 38°C 室温能存活 4 小时

225. 不符合新生儿生理性黄疸的原因是 ( ) A、紅细胞内酶发育不成熟

226. 有关人乳的长处，下列哪项是錯誤的 ( ) C、具有较多的维生素 K

227. 有关麻疹的皮疹特点，下列哪项是錯誤的 ( ) B、疹退后四肢有大片状脱皮

228. 有关维生素 D 缺乏性手足搐搦症的促发原因，如下哪项錯誤 ( ) C、母乳喂养儿

229. 有关新生儿胆紅素代谢的特点，如下哪项是錯誤的 ( ) D、肠道内  $\beta$ -葡萄糖醛酸苷酶活性较低

230. 有关早产儿的生理特点，下述哪项是錯誤的 ( ) E、免疫球蛋白水平与足月儿相似

231. 如下哪项不是初期佝偻病的临床体现 ( ) E、囟门迟闭

232. 不属于 1 岁以内婴儿计划免疫的是 ( ) B、肺炎链球菌疫苗

233. 蛋白质-能量营养不良患儿出现水肿的原因是 ( ) B、血浆白蛋白减少
234. 室间隔缺损血流动力学变化首先引起 ( ) B、左心室增大
235. 有关佝偻病初期诊断, 如下哪项指标最可靠 ( ) E、血清 25-(OH)D 测定
236. 有关小朋友脑脊液检查, 如下哪项不正常 ( ) C、Pandy 试验(±)~(+)
237. 佝偻病性手足搐搦在痉挛发作时哪项处理最对的 ( ) C、先用镇静剂再用钙剂
238. 有关法洛四联症, 不应存在下述哪种状况 ( ) E、动脉血氧饱和度 > 95%
239. 下列哪项不是小儿体格生长规律 ( ) A、由远及近规律
240. 生后 2~4 周的新生儿进食呕吐, 疑似 ( ) B、幽门狭窄
241. 学龄前小朋友重症菌痢特点有 ( ) E、肠道症状不明显
242. 重症小儿肺炎最常并发 ( ) E、心力衰竭
243. 下列哪项不是新生儿溶血病换血指征 ( ) E、新生儿呼吸窘迫综合症
244. 先天愚型最具有诊断价值的是 ( ) B、染色体检查
245. 小儿白细胞分类中, 粒细胞与淋巴细胞的两次交叉发生于生后 ( ) C、4~6 天, 4~6 岁

246. 小儿結核病最严重的播散方式是 ( ) C、血行播散

247. 小儿接种麻疹疫苗後出現发热， $T38.5^{\circ}\text{C}$ ，烦躁，吃奶少，其最也許的原由于 ( )

B、疫苗反应

248. 小儿紅细胞膜上 AB 抗原位點数何時完全发育 ( ) C、2~4 岁

249. 下列哪项检查是每一例急性化脓性脑膜炎患儿皆应做的检查 ( ) A、血培养

250. 小儿惊厥紧急处理原则首先应当 ( ) A、迅速止痉

251. 散发性甲状腺功能減低症的体既有 ( ) E、以上都是

252. 新生儿易患大肠杆菌脑膜炎的重要原因是 ( ) D、体内缺乏 IgM

253. 小儿肺炎最重要的病理机制是 ( ) A、缺氧和二氧化碳潴留

254. 小儿腹瀉脱水無明显循环障碍時，前 8~12 小时最合适的补液速度 $[\text{ml}/(\text{kg}\times\text{h})]$ 是 ( ) C、8~10

255. 诊断缺铁性贫血第二阶段的特性性指標是 ( ) B、紅细胞游离原卟啉增高

256. 有关新生儿壞死性小肠結肠炎的描述，如下哪项對的 ( ) D、确诊後立即禁食，腹胀明显者行胃肠減压

257. 有关小儿結核治疗，如下哪项不對的 ( ) D、半效杀菌药选用异烟肼

258. 有关猩紅热病後抗毒免疫的论述，如下對的是 ( ) C、免疫持久，會患第 2 次
259. 糖皮质激素治疗先天性肾上腺皮质增生的机制是 ( ) D、运用靶腺激素對促激素的负反馈作用
260. 3 岁男孩，開始出現频繁呛咳，後发生面部青紫。首先要考虑 ( ) C、气管异物
261. 新生儿甲状腺功能減低症筛查的最佳时间是 ( ) B、生後 2~3 天
262. 新生儿溶血病也許发生于 ( ) C、Rh - 母亲再次妊娠，胎儿血型為 Rh +
263. 新生儿 ABO 溶血病最易发生在 ( ) A、母血型 "O"，子血型 "A" 或 "B"
264. 新生儿肺透明膜病最重要見于 ( ) B、早产儿
265. 新生儿缺氧缺血性脑病的临床体现是 ( ) A、神志变化，肌张力异常
266. 水痘发热後几日開始出皮疹 ( ) C、1~2 天
267. 早产儿呼吸暂停的重要原因是 ( ) B、呼吸中枢发育不成熟
268. 在营养不良的治疗中，如下哪项是錯誤的 ( ) C、重度营养不良应初期供应足够的热量

269. 有关小儿上呼吸道解剖特点，如下错误的是（ ） E、婴儿易患化脓性扁桃体炎
270. 小儿支气管肺炎时常用鼻前庭导管持续吸氧，氧浓度一般不超过（ ） C、0.4
271. 有关小儿心脏骤停复苏时胸外按压，如下哪一项是错误的（ ） A、双掌按压法：合用于 <1 岁小儿
272. 有关新生儿败血症的检查，下列哪项无诊断价值（ ） E、白细胞总数  $8 \times 10^9/L$
273. 有关佝偻病的发病机理，下述哪项不对的（ ） C、增进肾小管对磷的重吸收
274. 小儿初次感染结核分枝杆菌 4~8 周后，有关免疫与变态反应的概念，不对的是（ ） B、免疫为体液免疫，变态反应为细胞免疫
275. 先天性心脏病不也许并发肺动脉高压的疾病是（ ） D、肺动脉口狭窄
276. 一法洛四联症患者，剧烈哭闹后出现晕厥，处理错误的是（ ） C、地高辛
277. 患者，男性，5 岁。因头晕、纳差入院，入院后确诊为川崎病。应首选下列哪种治疗（ ） C、静脉注射免疫球蛋白
278. 男性，14 岁，近半月全身水肿。检查：尿蛋白（+++），透明管型 2~3/HP，血红蛋白 12g/L，血压正常，24 小时尿蛋白 > 3.5g。最也许的诊断是（ ） D、肾病综合征
279. 患儿 1 岁，发热、腹泻 3 天。体检：面色苍白，气促，心前区 I~II 级收缩期

杂音，心率 60 次/分，律齐。ECG 示三度房室传导阻滞，X 线示心脏扩大。最也許的诊断為 ( ) D、病毒性心肌炎

280. 1 岁小儿，曾多次患肺炎，不发绀。查体：胸骨左缘第 2 肋间Ⅲ级粗糙收缩期杂音，肺動脉瓣区第 2 音亢進。X 线检查示肺動脉段突出，肺野充血，左心室及左心房增大，积极脉結影增宽。诊断考虑 ( ) D、動脉导管未闭

281. 10 個月男孩，牛奶喂养，面色苍白 2 個月，烦躁。查体：肝肋下 2cm，脾肋下刚及。血象：血紅蛋白 80g/L，紅细胞  $3.6 \times 10^{12}/L$ ，网织紅细胞 0.01，外周血涂片紅细胞大小不等，中心淡染。初步诊断是 ( ) E、营养性缺铁性贫血

282. 10 岁男孩，发热，关节肿痛，皮肤出現环形紅斑，心率增快出現奔馬律，血沉增快。經治疗上述症状、体征消失後，需继发性防止的措施是 ( ) D、長期有效青霉素肌注

283. 1 岁患儿，呕吐、腹瀉 3 天入院，大便每日 20 次以上，水样便。查体：T37.9°C，P140 次/分，嗜睡，皮肤弹性极差，皮肤发花，四肢凉。目前恰當的诊断是 ( ) B、肠炎、重度脱水、休克

284. 患儿，女，8 岁。于 4 個月前開始不规则发热，体温 38~39°C。2 個月前出現气促、咳嗽、下肢水肿，抗結核治疗後無效，1 岁时诊断為先心病。体检：T38.5°C，心率 114 次/分，呼吸 48 次/分，颈静脉怒张，心前区隆起，于胸骨左缘 2、3 肋间可闻及持续杂音，伴震顫，肝肋下 4.0cm，尿蛋白(+)。本例应诊断為 ( ) E、先心病(動脉导管未闭)合并心力衰竭，亚急性细菌性心内膜炎

285. 2 岁男孩，因智能低下查染色体核型為 46，XY，-14，+t(14q21q)，查其母為平衡易位染色体携带者，核型应為 ( ) A、45，XX，-14，-21，+t(14q21q)

286. 女，7 岁，持续发热 1 周，体温高达 39.6°C ~ 40.2°C，每天最低温度為 37.8°C 左右。此热型属于 ( ) D、弛张热

287. 9 岁男孩，午餐時突发神志丧失，手中持碗失落，碗打碎後即醒。脑電图示 3HZ 棘波规律性和對称性发放。最也許的诊断是 ( ) D、失神发作

288. 一小朋友吃花生米，忽然出現惊恐，气促，抱送急诊发现患儿吸气极度困难，出現“三凹征”。推荐使用什么措施清除气道异物 ( ) A、減小的腹部冲击法.

289. 患者，男，2 岁。啼哭時可見腹股沟上段内侧由外上向内下前斜行突現一圓形囊性包块，平卧時可自行回纳。应首先考虑的是 ( ) D、腹股沟斜疝

290. 女患童，14 岁，发热伴皮下出血點 3 天。检查：颈部及腋下淋巴結肿大，肝脾肿大。化验：Hb95g/L，WBC12×10<sup>9</sup>/L，原始细胞 0.30，PLT50×10<sup>9</sup>/L。最也許的诊断是 ( A、急性淋巴细胞白血病

291. 患儿，男，5 岁。睡眠時张口呼吸，打鼾，双侧扁桃体 III 度肿大，拟手术治疗。為明确局部状况，术前尚需要做的检查是 ( ) C、鼻咽侧位片检查

292. 有一名 6 岁男孩，3 天前右额碰在桌子角上，當時能哭。現右额颞部頭皮隆起，局部触之有 12cm×12cm 波動区。無神經系统定位症状，頭颅 CT 片示右额颞頭皮肿胀。诊断是 ( ) D、帽状筋膜下血肿



293. 16 個月女孩，忽然出現极度烦躁不安，呼吸困难加重。查体：心率 191 次/分，呼吸 69 次/分，精神不振，唇周明显发绀，面色苍白，心音低钝，双肺叩诊正常，可闻及较密集的细湿啰音，肝肋下 3.5cm，中度硬。本病例诊断最大的也許是 ( ) C、支气管肺炎合并心力衰竭

294. 2 岁患儿，因近 1 個月咳嗽来诊，無发热。結核菌素试验 1:，紅硬，直径 20mm，X 线胸片未見异常，血沉 15mm/h。你将怎样处理 ( ) E、需用异烟肼、利福平和 ( 或 ) EMB9 ~ 12 個月

295. 第一胎新生儿，胎膜早破 29 小時，生後第 2 天開始发绀、拒奶，体温不升，黄疸。试验室检查：白细胞  $15 \times 10^9/L$ ，血小板  $70 \times 10^9/L$ ，血型 O，胆紅素  $205 \mu\text{mol/L}$ 。最也許的诊断是 ( ) E、败血症

296. 患儿 6 岁，近 2 個月反复出現发作性咳嗽，尤其在夜间或清晨為著，痰少，运动後加重，無发热。一直使用先锋霉素和利君沙治疗，效果不明显，近日使用舒喘灵，却有很好的疗效。此病应作哪种诊断 ( ) E、咳嗽变异性哮喘

297. 男孩，11 岁，体格检查心脏有杂音而就诊。查体：血压 14/10kPa，胸骨左缘未扪及震颤，在左侧第 2 肋间闻及 II ~ III 级收缩期喷射性杂音，P2 亢進。胸片示梨形心脏，右心房、右心室增大，肺動脉段饱满，积极脉結小，肺纹理增多。ECG 示電轴右偏，V1 呈 rsR'型。最也許的诊断是 ( ) B、房间隔缺损

298. 女孩，1 岁，不會走，不會叫父亲、媽媽。查体：眼距宽，鼻梁宽平，唇厚、舌大，反应差，皮肤粗糙，脐疝，下部量短。為了确诊，应首先做下列哪项检查 ( ) E、T3、T4、TSH

299. 10 月龄男婴，10 月突发水样便腹泻，每天 10 余次，伴呕吐、发热、轻度脱水。大便性状开始为蛋花状，后为水样。该患者所患胃肠炎的致病因子如下哪种最有也许（ ）

B、A 组轮状病毒

300. 2 岁男孩子于 5 月因发热伴手心、足底、臀部和口腔疱疹就诊。追问病史，这些部位的红疹几乎在同一时间出现。发热 38°C，水疱有绿豆样大小，呈圆形或椭圆形，周围有红晕，无明显瘙痒感。采集其咽拭子，将标本接种于 RD 和 HEP-2 细胞，盲传至第 3 代 RD 细胞展现明显 CPE。根据以上成果，可初步诊断该男孩患有（ ） D、手足口病

301. 有关宫外孕，下述哪项是对的的（ ） C、子宫内膜也发生蜕膜变化

302. 妊娠 60 天终止妊娠，最常用的措施是（ ） D、负压吸宫术

303. 最常见的子宫肌瘤变性是（ ） A、玻璃样变

304. 下列哪项提醒胎儿宫内窘迫（ ） D、头位，羊水胎粪污染Ⅲ°

305. 第二产程延长是指（ ） B、经产妇第二产程时间超过 1 小时

306. 第一产程活跃期停滞是指宫口不再扩张（ ） D、2 小时以上

307. 子宫病理性收缩环是指（ ） A、子宫上下段之间形成缩窄环并随宫缩渐次上升

308. 有关阴道纵隔的论述，如下哪项是错误的（ ） E、一旦明确诊断，应尽早手术切除

309. 有关子宫腺肌病的症状，下列哪项是最经典的（ ） C、进行性痛经
310. 有关子宫内膜异位症的防止，如下哪项错误（ ） E、输卵管通液术应在月经前进行
311. 有关月经的论述，下列哪项是对的（ ） A、月经周期的长短重要与卵泡期有关
312. 有关胎盘的功能，下列哪项是错误的（ ） B、产生羊水
313. 下列哪些概念是错误的（ ） C、产力包括子宫收缩力、腹肌及膈肌收缩力
314. 先兆流产与难免流产的鉴别要点是（ ） D、宫口开大与否
315. 下列哪项是确诊妊娠期病毒性肝炎的根据（ ） E、血中谷丙转氨酶增高，HBsAg 阳性
316. 下列哪项不是妊娠期正常乳房变化（ ） C、乳房较坚硬，可触及肿块，是乳汁淤积所致
317. 有关胎盘早剥的处理，下列哪项是错误的（ ） B、发现子宫胎盘卒中，立即行子宫切除术
318. 如下除哪项外，均为人工负压吸引术的禁忌证（ ） A、月经不凋
319. 下列哪种状况不是中期妊娠引产的禁忌证（ ） D、有低热，体温 37.2℃

320. 下列哪种疾病约 1/4 继发于自然流产者 ( ) C、绒毛膜癌
321. 有关孕激素生理作用，如下錯誤的是 ( ) B、加强输卵管节律性收缩的振幅
322. 引起妇女腹部膨隆的常見原因有 ( ) E、腹膜後巨大肿块；過度肥胖；腹水；巨大的卵巢囊肿
323. 妊娠 12 周，需终止妊娠。常用的终止妊娠措施是 ( ) A、钳刮术
324. 有关子宫腺肌病的描述，下列哪项是對的的 ( ) D、检查時子宫呈均匀性增大或結节性隆起，硬而压痛，經期尤甚
325. 子宫脱垂的诊断原则是 ( ) E、子宫颈下垂到坐骨棘如下
326. 有关子宫肉瘤的分期原则，如下哪项不對的 ( ) E、FIGO 初次對子宫肉瘤作出分期
327. 子宫内膜异位症患者行+E43:E48 根治性手术的切除范围為 ( ) C、子宫、双附件及盆腔内所有内膜异位病灶
328. 子宫颈癌重要播散的方式 ( ) D、直接蔓延和淋巴转移
329. 重症肝炎产妇产後出血的常見原因是 ( ) D、凝血功能障碍
330. 中央性前置胎盘大出血的治疗措施哪项是對的的 ( ) D、剖宫产

331. 治疗子宫内膜异位症，需切除子宫保留卵巢功能的手术合用于（ ） A、年龄在 45 岁如下，無生育规定者

332. 初期妊娠药物性流产的禁忌证不包括（ ） B、有近期人流史者

333. 羊水穿刺行染色体核型分析的最佳孕周為（ ） D、16~24 周

334. 有关晚期产後出血的治疗，如下哪项是錯誤的（ ） A、阴道大量出血，立即行子宫全切术

335. 為減少心脏病孕产妇的死亡率，下列哪项防治措施不合适（ ） A、為防止体重增長過多，宜減少脂肪的摄入，并進低蛋白饮食

336. 有关阴道炎，下列哪项是對的的（ ） C、绝經後雌激素水平減少易引起萎缩性阴道炎

337. 下列何种現象不能提醒胎儿窘迫（ ） E、宫缩時出現初期減速

338. 下述何项不是重度妊高征临床体现（ ） E、尿量 800ml/24h

339. 诊断侵蚀性葡萄胎的可靠根据是（ ） C、葡萄胎清宫後 5 個月肺部出現转移灶

340. 使子宫底保持前倾位置的韧带是（ ） A、圆韧带

341. 胎盘初期剥离是指（ ） C、正常位置胎盘在胎儿未娩出前部分或所有從子宫壁剥离

342. 有关正常产褥的论述，下列哪项是错误的（ ） C、子宫复旧重要是肌细胞数目减少及体积缩小

343. 初孕妇自觉胎动多数开始于（ ） C、妊娠 18~20 周

344. 为判断胎儿肾成熟度，应测孕妇的（ ） D、羊水中肌酐值

345. 能产生雌激素的卵巢肿瘤是（ ） D、颗粒细胞瘤

346. 更年期内分泌最早变化的是（ ） A、卵巢功能衰退

347. 子宫输卵管碘油造影成果不符合生殖道结核的是（ ） A、宫腔增大，有充盈缺损

348. 盆腔炎性疾病的最低诊断原则是（ ） D、宫颈举痛

349. 下述哪种状况不是急性生殖器炎的后遗症（ ） C、卵巢巧克力囊肿

350. 有关孕妇支原体感染，下列描述错误的是（ ） D、有明显的临床症状

351. 西醫目前认为妊娠剧吐与何种激素急剧上升有关（ ） A、绒毛膜促性腺激素

352. 下列除哪一项外均为妊娠高血压综合征的体现（ ） D、血尿

353. 下列哪项不是正常妊娠期常见症状（ ） A、高血压

354. 下列哪项不是妊娠期子宫变化 ( ) D、妊娠中期引起子宫肌壁逐渐增厚直至足月

355. 鉴别子宫肌瘤与卵巢囊肿选用 ( ) A、腹腔镜

356. 下列哪项成果不提醒胎儿窘迫 ( ) B、宫缩时超声多普勒检查胎心率不小于120/分

357. 羊水栓塞出现初期 DIC 高凝期，最先选用下述哪种措施 ( ) A、肝素

358. 下列诊断输卵管妊娠的辅助检查措施中，至少用的是 ( ) D、宫腔镜检查

359. 下述哪项次数提醒胎儿缺氧 ( ) A、胎动 < 10 次/12 小时

360. 下列有关产褥期急性子宫内膜炎、子宫肌炎的临床体现，哪一项是错误的 ( ) C、出现“冰冻骨盆”

361. 有关产褥感染血栓性静脉炎，下列对的是 ( ) A、感染可迅速扩散至卵巢静脉、髂内静脉、髂总静脉等

362. 女性月经期体内多种激素的状况是 ( ) A、雌激素水平更低，无孕激素

363. 下列哪项不属于辅助生育技术 ( ) A、人工周期

364. 下列哪项不能用妊娠时心血管系统变化解释 ( ) C、下肢浮肿，卧床休息后不消退

365. 下列哪项可诊断糖尿病合并妊娠 ( ) C、妊娠中晚期空腹血糖 8.3mmol/L(150mg/dl)

366. 下列哪项不是重度子痫前期的体现 ( ) C、下肢水肿

367. 有关更年期功血，如下哪项不对的 ( ) B、卵巢内卵泡完全耗尽

368. 青春期原发性闭经是指 ( ) A、年满 18 岁的女性尚未月经初潮

369. 妇女骨矿含量达高峰的年龄是 ( ) D、35 岁

370. 理想的受精时间是卵细胞从卵巢排出后 ( ) C、15~18 小时

371. 某妇女，47 岁，月经异常。经检查如下哪项不符合更年期功能性子宫出血的体现 ( ) D、基础体温呈双相型

372. 初产妇，规律宫缩 5 小时，宫口开 3cm，行人工破膜后 9 小时宫口开 9cm，先露坐骨棘下 2cm。诊断为 ( ) A、活跃期延长

373. 女性，24 岁，既往月经规则，未避孕。末次月经 1 月 2 日，1 月 8 日受凉发热达 38.6℃，服退烧药及抗感冒药物，1 后来烧退，服药 3 天停止。2 月 10 日仍未来月经，并出现恶心不适，去医院诊为早孕。医生应给什么提议或处理 ( ) D、常规产前检查

374. 某产妇分娩，胎儿娩出后 35 分钟阴道出血约 400ml，胎盘未娩出，会阴 II 度扯破伤，产妇血压 90/60mmHg，脉搏 98 次/分，稍感冷。对该产妇的立即处理应为 ( ) A、输血或血浆代用品



375. 患者，女，30岁。孕25周，出现口周麻木感3天，间歇性双侧上肢和手部肌肉强直性痉挛。Chvostek征和Trousseau征阳性。该患者的临床诊断最有也许是（ ）

A、低钙性抽搐

376. 38岁初孕妇，妊娠2个月，合并半拳大小的卵巢囊肿，何时可手术治疗（ ） D、1个月後肿瘤不缩小或反增大，可行手术或保胎治疗

377. 某妇女，45岁，已绝育。既往月经正常，近1年不规律，经期10~20天，1年前曾诊刮未见癌变。本次又有阴道流血20天，血红蛋白50g/L，盆腔检查(-)。应选用什么措施止血妥當（ ） E、再次诊刮

378. 40岁妇女，自诉宫颈糜烂数年，近2个月性交後白带中带血。本例為确诊，第一步辅助检查措施是（ ） A、宫颈刮片细胞學检查

379. 女性患者，38岁，阴道排液及接触性出血2个月。妇科检查：宫颈轻度糜烂，宫体前位，大小、质地正常，活动好，双附件(-)。宫颈涂片Ⅱ级，阴道镜下宫颈活检為细胞呈泪滴状向间质浸润，深度<3mm，無病灶融合及脉管侵犯。其诊断哪项對的（ ） B、Ia期

380. 女，48岁，外阴瘙癢3年。检查发现大阴唇、阴唇间沟处出现皮肤增厚，色素增长，肤纹理突出，并伴散在性皸裂、溃疡。局部应用皮质激素软膏，症状缓和，该女也许有（ ） C、外阴鳞状上皮细胞增生

381. 女性，42岁，已婚。因外阴白色病变而做外阴活检，病理汇报為“外阴上皮非經典轻度增生”，是指下列哪种状况（ ） E、异型细胞局限于表层深部下1/3

382. 患者，女，58岁。卵巢癌Ⅲc期，3年前行满意肿瘤细胞减灭手术，术后用泰素、铂类化疗9个疗程，临床完全缓解。1个月前出现复发表现，下一步治疗措施是（ ）

A、先进行复发肿瘤分型和定位

383. 33岁孕妇，妊娠2个月，家务劳动后感心悸、气短、胸闷。查体：心率119/分，呼吸22次/分，心尖区有Ⅲ级收缩期杂音，肺底部有湿啰音，下肢水肿(+)。对的处理是（ ） C、心衰控制后行人工流产

384. 25岁患者，剖宫产术后18天，阴道突然出现大量出血。入院测体温：36℃，超声检查：子宫7cm×8cm×5cm，宫腔内未见占位。考虑产后出血最可能的原因为（ ）

D、子宫切口出血

385. 某妇女，35岁，孕3产2。流产后月经失调，9~10/28~30天，量中等，无不适，基础体温为双相但下降缓慢。其诊断应为（ ） D、子宫内膜脱落不全

386. 某女患者，26岁，月经周期为22~23天，量较多，测基础体温为双相。此患者可由于何种原因而引起不孕或流产（ ） A、黄体功能不全

387. 患者，女，28岁，哺乳期闭经。体检：宫颈著色，子宫如孕3个月大小，质软，双附件正常。做钳刮术，术中夹出黄色脂肪样组织，患者感到有剧烈牵拉性疼痛，伴恶心、呕吐。该患者的诊断是（ ） B、子宫穿孔

388. 患者，女性，24岁。婚后2次自然流产，均为停经40~50天。初期流产最常见的病因是（ ） C、染色体异常

389. 患者，女性，28岁。产後第4天出現寒战、高热，腰痛，下腹痛。查体：肾区有叩痛，耻骨上压痛(+)。化验：尿白细胞20~30個/HP，尿蛋白(+)，血白细胞 $18 \times 10^9/L$ 。应考虑产後并发( ) C、急性肾盂肾炎

390. 某女，第一胎，停經38周。1月前血压正常，近1周出現下肢水肿，伴頭昏，眼花，视力模糊。查：血压160/100mmHg，尿蛋白(+)，尿雌三醇10mg/24h，胎心好。产科处理应是( d

) C、积极治疗24~48小時，考虑终止妊娠

391. 某女，25岁，停經10周。阴道少許流血1周，大量流血3天，伴下腹胀痛，昨日起有畏寒发热。查体：血压80/60mmHg，脉搏120次/分，面色苍白，神清。妇科检查：外阴有活動性流血，子宫如50天孕大，软，宫口松，可容1指，宫口外仍有组织堵塞，子宫压痛明显，双侧穹隆未触及肿块，但有压痛。化验：血紅蛋白80g/L，白细胞 $18 \times 10^9/L$ ，中性85%。除立即抗休克抗炎治疗外，应作何恰当处理( ) A、立即钳夹出残留之胚胎组织

392. 女患者，26岁，停經50天。因骑車不慎摔倒，阴道少許出血，伴右下腹扯破样疼痛，惡心呕吐，肛门坠胀。查尿HCG(+)，後穹窿穿刺抽出不凝血。首选哪项治疗方案( ) B、立即手术

393. 孕36周先兆子痫，突发腹痛後子宫底升高，子宫硬，無松弛，阴道少許出血，胎心、胎動不清。可考虑為( ) A、胎盘早剥

394. 女性病人，41岁，3周来阴道排出物有惡臭。体检示宫颈外口有3cm大小包块，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/836055050005011003>