



主要诊断编码选择原则

湖北省病历质量控制中心

2021.5.28



住院病案首页数据填写质量规范

第二十四条 临床医师应当按照本规范要求**填写诊断及手术操作等诊疗信息**，并对填写内容负责

主要诊断定义、选择总则及特殊情况下13条选择细则

第十条 主要诊断一般是患者住院的理由，原则上应选择本次住院对患者健康危害**最大**、消耗医疗资源**最多**、住院时间**最长**的疾病诊断。

第十一条 主要诊断选择的一般原则

(一) 病因诊断能包括疾病的临床表现，则选择病因诊断作为主要诊断。

(二) 以手术治疗为住院目的的，则选择与手术治疗相一致的疾病作为主要诊断

(三) 以疑似诊断入院，出院时仍未确诊，则选择临床高度怀疑、倾向性最大的疾病诊断作为主要诊断。

(四) 因某种症状、体征或检查结果异常入院，出院时诊断仍不明确，则以该症状、体征或异常的检查结果作为主要诊断。

(五) 疾病在发生发展过程中出现不同危害程度的临床表现，且本次住院以某种临床表现为诊治目的，则选择该临床表现作为主要诊断。

疾病的临终状态原则上不能作为主要诊断。

(六) 本次住院仅针对某种疾病的并发症进行治疗时，则该并发症作为主要诊断

第十二条 住院过程中出现比入院诊断更为严重的并发症或疾病时，按以下原则选择主要诊断：

(一) 手术导致的并发症，选择原发病为主要诊断；

(二) 非手术治疗或出现与手术无直接相关性的疾病，按第十条选择主要诊断。

第十三条 肿瘤类疾病按以下原则选择主要诊断：

(一) 本次住院针对肿瘤进行手术治疗或进行确诊的，选择肿瘤作为主要诊断

(二) 本次住院针对继发肿瘤进行手术治疗或进行确诊的，即使原发肿瘤依然存在，选择继发肿瘤为主要诊断。

(三) 本次住院仅对恶性肿瘤进行放疗或化疗的，选择恶性肿瘤放疗或化疗为主要诊断。

(四) 本次住院针对肿瘤并发症或肿瘤以外的疾病进行治疗的，选择并发症或该疾病为主要诊断。

第十四条 产科的主要诊断应选择产科的主要并发症或合并症。没有并发症或合并症的，主要诊断应由妊娠、分娩情况构成，包括宫内妊娠周数、胎数(G)、产次(P)、胎方位、胎儿和分娩情况等。

第十五条 多部位损伤，以对健康危害最大的损伤或主要治疗的损伤作为主要诊断。

第十六条 多部位灼伤，以灼伤程度最严重部位的诊断为主要诊断。在同等程度灼伤时，以面积最大部位的诊断为主要诊断。

第十七条 以治疗中毒为主要目的的，选择中毒为主要诊断，临床表现为其它诊断。

住院病案首页数据填写质量规范



原则一 · 金标准

主要诊断一般是患者住院的理由，原则上应选择本次住院对患者健康危害最大、消耗医疗资源最多、住院时间最长的疾病诊断。

案例1：

患儿5岁，患有**法洛\ [法乐\] 三联症**，本次住院确诊并治疗**病毒性脑膜炎**。

错误主要诊断名称：法洛\ [法乐\] 三联症

正确主要诊断名称：病毒性脑膜炎

！ 解析：

患者住院的理由和主要治疗的疾病是病毒性脑膜炎。

！ 扩展：

若在院期间明确了导致病毒性脑膜炎的病原，应将主要诊断修正为更准确的病毒性脑膜炎类型，例如：柯萨奇病毒性脑膜炎、腺病毒性脑膜炎……

原则二 · 病因

病因诊断能包括疾病的临床表现，则选择病因诊断作为主要诊断。

案例2：

中年男性，以反复发热伴畏寒、寒战10余天入院，入院后查血常规及其他炎症指标明显升高，血培养为肺炎克雷伯菌，住院治疗期间出现脓毒性休克。诊断**肺炎克雷伯菌败血症**、**脓毒性休克**。后依据血培养药敏结果抗感染治疗，病愈出院。

错误主要诊断名称：脓毒性休克

正确主要诊断名称：肺炎克雷伯菌败血症

！ 解析：

1. 有明确的血培养结果，败血症诊断明确；
2. 脓毒性休克只是肺炎克雷伯菌败血症的临床表现。

原则三 · 手术

以**手术治疗**为住院目的的，则选择**与手术治疗相一致**的疾病作为主要诊断。

案例3：

患者因“体检发现**甲状腺肿物**一周”入院。有高血压病史。在全麻下行“**双侧甲状腺全切**+中央区淋巴结清扫+喉返神经探查+甲状旁腺负染保护术”，术后病检示甲状腺乳头状癌伴周围淋巴结转移。术后恢复好，转入心**内科治疗高血压**，后好转出院。

错误主要诊断名称：高血压3级高危组

正确主要诊断名称：**甲状腺乳头状癌**

！ 解析：

本案例患者的住院目的是甲状腺手术，根据“以手术治疗为住院目的的，则选择与手术治疗相一致的疾病作为主要诊断”的原则，主诊选择“甲状腺乳头状癌”。

原则四 · 疑似

以疑似诊断入院，出院时仍未确诊，则选择**临床高度怀疑、倾向性最大的疾病**诊断作为主要诊断。

案例4：

患者因“间断咯血10天”入院。门诊以“肺部感染：**结核可能性大**”收住入院。结核菌涂片检查未找到抗酸杆菌；细菌培养、纤支镜检查及肺泡灌洗均正常；CT检查考虑肺部感染性病变，结核可能性大。**按抗结核治疗**后患者好转出院。

错误主要诊断名称：肺部感染

正确主要诊断名称：肺结核？

！ 解析：

本案例患者因疑似诊断“肺部感染：肺结核”入院，做了检查后出院时仍不能确诊，而根据CT结果及抗结核治疗有效，临床上仍高度怀疑肺结核，故根据本条原则，主诊应选择疑似诊断“肺结核”。

原则五 · 症状、体征、异常结果

因某种**症状、体征或检查结果异常**入院，出院时诊断仍**不明确**，则以该**症状、体征或异常的检查结果**作为主要诊断。

案例5：

患者因“间断**胸闷**1月”入院。有**糖尿病**病史4年，**痛风**病史6年。入院后行**冠状动脉造影**，提示未见明显狭窄。其余检查均**未查出胸闷原因**，行对症治疗后好转出院。

错误主要诊断名称：糖尿病

正确主要诊断名称：胸闷

！ 解析：

本案例患者因“胸闷”入院，经检查包括冠状动脉造影未查出胸闷原因，根据本条原则，主诊选择其就诊症状——“胸闷”。

? 思考：

若同时对糖尿病进行了降糖治疗，主要诊断如何选择？

原则六 · 临床表现

疾病在发生发展过程中出现不同危害程度的临床表现，且本次住院**以某种临床表现为诊治目的**，则选择该临床表现作为主要诊断。疾病的临终状态原则上不能作为主要诊断。

案例6：

患者以“**呕血**1日”入院。有高血压病史20余年，**慢性丙型病毒性肝炎病史**。胃镜检查示：**食管静脉曲张破裂出血**。行胃镜下食管静脉曲张破裂出血**组织胶注射术**。出院诊断：1. 丙肝肝硬化失代偿期；2. 食管静脉曲张破裂出血；3. 脾肿大 脾功能亢进；4. 腹腔积液。

错误主要诊断名称：丙型肝炎肝硬化失代偿期

正确主要诊断名称：**肝硬化伴食管静脉曲张破裂出血**

！ 解析：

本案例中食管静脉曲张破裂伴出血是丙肝肝硬化发展到失代偿期的临床表现，且本次住院也是针对该临床表现所做的治疗，根据本条原则，故选择“肝硬化伴食管静脉曲张破裂出血”为主诊。

原则七 · 并发症

本次住院仅**针对**某种疾病的**并发症**进行**治疗**时，则该并发症作为主要诊断。

案例7：

患者因“**股骨骨折**切开复位内固定**术后一月余**，创面不愈合、有渗出”入院。入院查体，考虑**伤口愈合不良**，择期行“**大腿清创+VSD术**”，术后给予**抗感染**对症支持治疗，后患者恢复可予以出院。

错误主要诊断名称：股骨骨折术后

正确主要诊断名称：手术后伤口愈合不良

！ 解析：

本案例中伤口愈合不良是患者进行股骨骨折切开复位内固定手术后的并发症，本次入院主要是针对并发症伤口愈合不良进行了手术治疗，因此主要诊断应该选择“手术后伤口与和不良”。

原则八 · 入院后出现的并发症

住院过程中出现比入院诊断更为严重的并发症或疾病时，按以下原则选择主要诊断：

(一) **手术导致的并发症**，选择**原发病**作为主要诊断。

案例8：

患者因“摔伤致**股骨干骨折**”入院。入院后行“**股骨骨折切开复位钢板内固定术**”，术后患者伤口红肿渗液，考虑**手术后伤口愈合不良**，择期行“**大腿清创+VSD术**”，术后给予抗感染对症支持治疗，后患者恢复可予以出院。

错误主要诊断名称：手术后伤口愈合不良

正确主要诊断名称：**股骨干骨折**

！解析：

本案例患者入院目的为行股骨骨折的复位手术，术后伤口愈合不良为术后并发症，虽然二者均进行了手术治疗，但据本条原则中的第一条“手术导致的并发症，选择原发病作为主要诊断”原则，故主诊选择“股骨骨折”。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/836124051023011004>