

2024 年广西壮族自治区上林县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题（培优 B 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 伴有过敏性鼻炎、阿司匹林哮喘可选用的药物是

- A: 异丙托溴铵
- B: 沙美特罗
- C: 孟鲁司特
- D: 沙丁胺醇

答案：C

2. 缺铁性贫血、铅中毒贫血是由于

- A: 血红蛋白生成减少
- B: 红细胞生成减少
- C: 红细胞生成过多
- D: 红细胞丢失过多

答案：A

3. 随着社会的发展，生活的节奏越来越快，科技给我们带来便利的同时，也给我们的生活和工作增添了不少压力，焦虑、抑郁、失眠等病症的发生率随之上升。

- A: 唑吡坦
- B: 阿普唑仑
- C: 艾司唑仑
- D: 地西泮

答案：A

4. 药品不良反应 (ADR) 的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑 ADR 时，需要进行因果关系评价

A: 可能无关

B: 肯定

C: 很可能

D: 可能

答案：C

5. 属于脂溶性维生素的是

A: 维生素 B12

B: 维生素 B1

C: 维生素

D: 维生素

答案：D

6. 血栓的发生率增加的指标是

A: $INR < 3$

B: $INR < 1.5$

C: $INR > 5$

D: $INR > 3$

答案：B

7. 下列药物中，驾驶员服用后可能出现定向力障碍的是

A: 氟桂利嗪

B: 哌替啶

C: 双氯芬酸

D: 金刚烷胺

答案：B

8. 茶碱、咖啡因、可卡因等容易引起癫痫发作，属于

A: 药源性肝损害

B: 药源性肾损害

C: 药源性血损害

D: 药源性神经损害

答案：D

9. 部分药品的中文药名容易混淆，药师在审核处方时应格外小心，防止处方出现用药错误。下列处方中符合适应证的是

A: 为闭塞性脑血管病、中心性视网膜炎患者开具曲克芦丁

B: 为疱疹病毒患者开具阿糖胞苷

C: 为社区获得性肺炎患者开具柔红霉素

D: 为肿瘤患者开具氟胞嘧啶

答案：A

10. 可导致儿童昏迷及惊厥的药物是

A: 抗组胺药

B: 维生素 A

C: 氯霉素

D: 苯妥英钠

答案：A

11. 适用于 L-dopa 治疗伴疗效减退、症状波动的患者

A: 司来吉兰

B: 恩托卡朋

C: 左旋多巴

D: 苯海索

答案: B

12. 目前，临床用药的单剂量药盒主要应用于

A: 住院患者

B: 自购药品患者

C: 家庭患者

D: 门诊患者

答案: A

13. (2019 年真题) 患者，女，29 岁，孕 25+6 周近日出现乏力、困倦食欲不振、恶心等症状，化验结果为 Hb71g/L，诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

A: 先少量缓慢静滴，观察无过敏反应后，再继续静脉滴注余下剂量

B: 口服每次 5ml，一日 3 次

C: 快速静脉注射

D: 先静脉注射负荷剂量，再静脉滴注余下剂量

答案: A

14. 应用格列本脲时，应注意的事项是

A: 用药期间宜吃高蛋白食物

B: 用药期间不宜食用富含组胺类的食物

C: 服药期间不宜饮茶

D: 服药期间不宜饮酒

答案: D

15. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

- A: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎
- B: 口服避孕药致阿米替林清除率下降
- C: 氯霉素在新生儿体内蓄积可导致灰婴综合征
- D: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

答案：B

16. 患儿，男，1 岁 3 个月，因仍不能独立行走而就诊。经询问其母亲，该患儿一直睡眠不好，夜哭较多，非常容易出汗，数次罹患呼吸道感染。查体：头部有“枕秃”。实验室检查：血钙水平低于正常值。诊断为“佝偻病”。

- A: 少饮水
- B: 泼尼松 2mg/（kg·d）口服
- C: 立即停止使用维生素 D
- D: 降钙素 50~100U/d 肌注

答案：A

17. 人体健康参数：肥胖的腰围标准是

- A: 男性>85cm，女性>80cm
- B: 男性>90cm，女性>85cm
- C: 男性>90cm，女性>80cm
- D: 男>95cm，女性>85cm

答案：D

18. 可用于氟乙酰胺中毒的药物是

- A: 碘解磷定
- B: 亚硝酸钠
- C: 维生素 K1
- D: 乙酰胺

答案：D

19. (2017 年真题) 患者男, 65 岁, 身高 170cm, 体重 60kg, 经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测 (肌酐清除率 45ml/min), 诊断为 2 型糖尿病、肾功能不全, 该患者应首选的药物是

- A: 格列本脲
- B: 格列吡嗪
- C: 格列喹酮
- D: 格列齐特

答案：C

20. 视疲劳所呈现的显著临床特征是

- A: 眼睑沉重、痉挛
- B: 复视
- C: 泪液减少
- D: 视物时症状加重

答案：D

21. 可减轻鼻窦、鼻腔黏膜血管充血, 解除鼻塞症状, 有助于保持咽鼓管和窦口通畅的鼻黏膜血管收缩药是

- A: 阿司匹林
- B: 伪麻黄碱
- C: 菠萝蛋白酶
- D: 颠茄浸膏片

答案：B

22. 可用于习惯性流产的药物是

- A: 依普黄酮
- B: 他莫昔芬
- C: 司坦唑醇
- D: 甲羟孕酮

答案：D

23. 为细菌感染性腹泻患者开具小檗碱片、盐酸地芬诺酯片与双八面体蒙脱石散的处方，应评判为

- A: 联合用药不适宜
- B: 无正当理由超适应证用药
- C: 过度治疗用药
- D: 有禁忌证用药

答案：A

24. 不属于治疗痔疮的外用非处方药的是

- A: 麝香痔疮栓？
- B: 普济痔疮栓？
- C: 肛泰膏（栓）？
- D: 复方片仔癀软膏？

答案：B

25. 非甾体类抗炎药引起的典型药源性疾病是

- A: 神经系统疾病
- B: 血液系统疾病
- C: 胃肠道反应

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 肌病

答案: C

26. 在乳汁中较难排泄的弱酸性抗生素是

A: 四环素

B: 青霉素 G

C: 红霉素

D: 氯霉素

答案: B

27. (2016 年真题) 医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握和解释

A: 左眼

B: 适量

C: 立即

D: 右眼

答案: A

28. 下列方法中不属于制定和调整给药方案基本方法的是

A: CTP 评分

B: 一点法和重复一点法

C: PK/PD 参数法

D: 稳态一点法

答案: A

29. 阿昔洛韦可导致

A: 阻塞肾小管、肾小球

B: 前列腺素合成障碍

C: 肾小管坏死

D: 肾间质纤维化

答案：A

30. 用药后可出现痛风、面色潮红的抗结核药是

A: 利福平

B: 吡嗪酰胺

C: 链霉素

D: 乙胺丁醇

答案：B

31. 峰值一般在清晨 7~8 时，谷值则在午夜 0 时，是指

A: 肝脏合成胆固醇的规律

B: 糖皮质激素的分泌规律

C: 胰岛 B 细胞的分泌规律

D: 胃酸的分泌规律

答案：B

32. (致畸药物的种类与危害)可能导致胎儿泌尿生殖系统异常、指趾畸形的是

A: 氮芥类

B: 沙利度胺

C: 孕激素

D: 雄激素

答案：A

33. 长期服用苯妥英钠，可能导致

A: 丙氨酸氨基转移酶升高

B: 血清碱性磷酸酶升高

C: A / G 比值<1

D: γ -谷氨酰转移酶升高

答案：D

34. (引起药源性肾病的药物) 大剂量或连续使用顺铂可导致

A: 不可逆性肾小管坏死

B: 肾小管阻塞

C: 直接肾毒性

D: 肾间质纤维化

答案：A

35. 用于消渴的中成药中可能添加的化学药成分是

A: 阿卡波糖

B: 格列本脲

C: 吡嗪酰胺

D: 苯巴比妥

答案：B

36. 为配制有效氯浓度为 500mg/L 的消毒剂 10L, 需要次氯酸钠溶液（有效氯浓度为 6. 0%）和纯化水的量分别是（）

A: 120mL 和 9880mL

B: 830mL 和 9170mL

C: 83mL 和 9917mL

D: 150mL 和 9850mL

答案：C

37. 应用铁剂的影响因素正常人对铁剂的吸收率为

- A: 0.4
- B: 10%~30%
- C: 0.3
- D: 10%~20%

答案：D

38. 治疗皮肤疾病适宜选择

- A: 注射剂
- B: 软膏剂
- C: 片剂
- D: 栓剂

答案：B

39. 饮酒后酒精除了影响神经系统、心血管系统的功能外，还会影响药物的疗效作用和毒副作用。因此，在服用药物时应该考虑酒精对药物的影响。

- A: 出现蛋白尿
- B: 嗜睡
- C: 血压升高
- D: 痛风急性发作

答案：D

40. 痛风慢性发作期间为促进尿酸排泄可选用

- A: 泼尼松龙
- B: 苯溴马隆
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

答案：B

41. 可沉淀大部分有机物及无机物的洗胃液是

- A: 药用炭混悬液
- B: 3%~5%鞣酸溶液
- C: 鸡蛋白
- D: 1%氯化钠溶液

答案: B

42. 经肝或相当药量经肝清除，肝功能减退时其清除或代谢物形成减少，可致明显毒性反应的药物在有肝病时

- A: 需增加给药剂量
- B: 一般无须调整剂量
- C: 尽可能避免使用
- D: 须谨慎使用，必要时减量给药

答案: C

43. 在药物信息咨询服中，二级信息资料最突出的优势是

- A: 读者能够自己评价信息，免受他人观点影响
- B: 能够很方便地对所需要的一级信息资料进行筛选
- C: 对某一个具体问题提供的信息全面、详实
- D: 提供的信息最新

答案: B

44. 药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

- A: 没有临床症状，无需治疗
- B: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害
- C: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗
- D: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

答案：D

45. 就餐时随第一、二口食物给药的是

- A: 阿卡波糖
- B: 二甲双胍
- C: 瑞格列奈
- D: 胰岛素

答案：A

46. 能增加感染和肿瘤风险的抗风湿药物是

- A: 肿瘤坏死因子(TNF- α)拮抗剂
- B: 雷公藤多苷
- C: 白芍总苷
- D: 青藤碱

答案：A

47. 关于腹泻下列说法正确的是

- A: 急性腹泻病程小于 2 周
- B: 慢性腹泻病程大于 1 个月
- C: 迁延性腹泻病程为 2 周至 1 个月
- D: 排便一日超过 4 次

答案：A

48. #NAME?

- A: #NAME?
- B: #NAME?
- C: #NAME?
- D: #NAME?

答案：D

49. 男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 利伐沙班
- B: 氯吡格雷
- C: 肝素
- D: 华法林

答案：B

50. 可帮助人短时间内急速降低体重

- A: 肽激素类
- B: 利尿剂
- C: 蛋白同化制剂
- D: 麻醉药品

答案：B

51. 在药师应该具备的诸项专业技能中，作为药师的最基本工作的是

- A: 药品警戒技能
- B: 处方审核
- C: 处方点评
- D: 处方调剂

答案：D

52. 骨性关节炎伴轻-中度疼痛患者通常首选的药物是

- A: 氨基葡萄糖
- B: 透明质酸钠
- C: 对乙酰氨基酚

D: 布洛芬

答案：C

53. 中度支气管哮喘的临床表现为

A: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失

B: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉

C: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率 >30 次 / 分，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，常见心率增快 >120 次 / 分，奇脉， $PaO_2<60\text{mmHg}$ ， $PaCO_2>45\text{mmHg}$ ， $SaO_2>190\%$ ，pH 可降低

D: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常

答案：B

54. 解救有机磷中毒的是

A: 盐酸戊乙奎醚

B: 单价抗毒血清

C: 二巯丁二钠

D: 亚硝酸异戊酯

答案：A

55. (2015 年真题) 痛风急性发作期应禁用的药物 ()。

A: 秋水仙碱

B: 布洛芬

C: 碳酸氢钠

D: 别嘌醇

答案：D

56. 患者，男，58 岁，高血压病史 5 年；吸烟史 40 年，日均 40 支。2 小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立；家属发现其说话迟钝、言语含混，左侧鼻唇沟变浅；意识清楚。急送医院急诊，BP170/100mmHg；血常规基本正常；头颅 CT 检查未见高密度病灶。诊断为脑梗死。

- A: 氯吡格雷片 75mgqdp0
- B: 阿司匹林肠溶片 100mgqdp0
- C: 阿司匹林肠溶片 300mgqdp0
- D: 华法林片 3mgqdp0

答案：B

57. 患者，女，31 岁，产后 3 个月，哺乳期。因“尿路感染”需给予抗生素治疗，首选的药物是

- A: 复方磺胺甲□唑
- B: 左氧氟沙星
- C: 阿米卡星
- D: 头孢曲松

答案：D

58. 正常人的体温在 37℃左右，但各个部位的温度不尽相同，内脏温度最高，头部次之，皮肤和四肢末端的温度最低。发热是指人体体温升高，超过正常范围。发热是人体对致病因子的一种全身性防御反应，是患病时常伴发或主要表现的一种症状。

- A: 41℃以上
- B: 37℃以上
- C: 37.4℃~38℃
- D: 38.1℃~39℃

答案：D

59. 以下所列药物中，最可能引起血小板减少的是

- A: 阿司匹林
- B: 维生素 E
- C: 硝酸甘油
- D: 呋噻米

答案：A

60. (2015 年真题) 下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是 ()。

- A: 服用过量可能出现甲状腺功能亢进症状
- B: 需要终身服药
- C: 妊娠期父母必须联合使用丙硫氧嘧啶
- D: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用

答案：C

61. 有关尿酸及尿淀粉酶的叙述正确的是

- A: 急性胰腺炎发作期可引起尿淀粉酶增高
- B: 尿酸增高即代表有病理性病变
- C: 人体尿酸主要来自于食物的分解代谢
- D: 尿酸为体内嘧啶类代谢分解的产物

答案：A

62. 药师接待医师咨询问题时，常见的咨询内容不包括

- A: 药品的适应证、用法与用量
- B: 新药临床评价
- C: 药物的药效学与药动学有关问题

D: 国内外新药动态

答案：A

63. 归属专业学术机构网站的是

A: www.ashp.org

B: [www.google](http://www.google.com)

C: www.cmt.tom.cn

D: www.merck.com

答案：A

64. 高血压伴痛风的患者慎用的药物是()

A: 卡托普利

B: 硝苯地平

C: 氢氯噻嗪

D: 普萘洛尔

答案：C

65. 早餐前半小时服用的药物是（）

A: 枸橼酸铋钾

B: 吉法酯

C: 瑞巴派特

D: 雷贝拉唑

答案：D

66. 可用于紫癜辅助治疗的药物是

A: 维生素 C

B: 维生素 A

C: 复合维生素 B

D: 维生素

答案：A

67. 与二、三级信息源相比一级信息源的特点是

A: 对一个具体的问题提供的信息全面详实（简明扼要）

B: 内容更新

C: 对于查询的药物信息可以提供丰富的内容供读者参考

D: 内容广泛，使用方便

答案：B

68. 李女士，40 多岁，来药店咨询皮肤瘙痒用药。经询问和查看后得知：李女士手心皮肤干燥、脱皮，没有破裂，没有水疱和渗出（无感染征象），瘙痒严重，尤其是夜间。自述症状在逐渐加重，之前有过类似症状，但都很轻微。进一步询问得知，她最近开始在餐厅厨房工作，每天需要清洗大量碗筷。

A: 复方樟脑软膏

B: 氢化可的松软膏

C: 异维 A 酸软膏

D: 复方片仔癀软膏

答案：B

69. 连续规律用药 2 日以上方能充分发挥作用的药品是

A: 短效 β

B: 非甾体抗炎药

C: 吸入型糖皮质激素

D: β 受体拮抗剂

答案：C

70. 能早期发现患者用药伤害、尽快地采取干预措施的方法是

- A: 病历审查
- B: 直接观察
- C: 计算机检测方法
- D: 岗位工作问责

答案：C

71. 治疗艾滋病的非核苷类逆转录酶抑制剂是（）

- A: 阿昔洛韦
- B: 拉米夫定
- C: 依非韦伦
- D: 利巴韦林

答案：C

72. 引起急性细菌性扁桃体炎最常见的致病菌是

- A: A 组 β 溶血性链球菌（化脓性链球菌）
- B: 金黄色葡萄球菌
- C: 肺炎链球菌
- D: 大肠埃希菌

答案：A

73. 患者，男，体检发现尿血红蛋白阳性，特向药师咨询，怀疑为药物所致，以下可导致尿血红蛋白阳性的药物是

- A: 氯丙嗪
- B: 两性霉素 B
- C: 秋水仙碱
- D: 庆大霉素

答案：C

74. 脑梗死的分期，急性期

- A: 1 个月内
- B: 15 天
- C: 1~6 个月
- D: 2~3 个月

答案：A

75. 华法林不会在乳汁中出现的机制是

- A: 在母体血浆中处于结合状态
- B: 呈弱碱性
- C: 解离度大
- D: 呈弱酸性

答案：A

76. 患者女性，40 岁，既往有风湿性心脏病史，近 2 年来出现劳力性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳痰、咯血，头晕、心悸，不能平卧，查体：半卧位，口唇发绀，肺部湿性啰音。心脏体征：肺动脉瓣听诊区第二心音亢进及舒张期奔马律。

- A: 支气管哮喘
- B: 大叶性肺炎
- C: 急性心肌炎
- D: 急性左心衰竭

答案：D

77. 患者，男，43 岁，患有家族性痛风，既往有磺胺类药物过敏史为防止尿酸结晶和痛风结石的产生，药师应建议患者在服用上述药物时加服

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 碳酸氢钠
- B: 丙磺舒
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 别嘌醇

答案：A

78. 患者，男，28 岁。咳嗽、咳痰，血常规提示白细胞及中性粒细胞正常，予阿奇霉素抗感染为

- A: 过度治疗用药
- B: 联合用药不适宜
- C: 有禁忌证用药
- D: 无适应证用药

答案：D

79. 癫痫的药物治疗癫痫强直一阵挛性发作首选

- A: 丙戊酸钠
- B: 拉莫三嗪
- C: 苯妥英钠
- D: 卡马西平

答案：C

80. 根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别属于妊娠毒性 A 级的药物是

- A: 沙利度胺
- B: 葡萄糖
- C: 阿莫西林
- D: 万古霉素

答案：B

81. 中度贫血，Hb 为（）

A: 60~90g/L

B: 小于 60g/L

C: 90~120g/L

D: 60~120g/L

答案：A

82. 患者，男性，68 岁，患 2 型糖尿病 5 年，检查：餐前血糖 5.8mmol/L，餐后 12.4mmol/L，糖化血红蛋白 7.2%，应首选的降糖药为

A: 罗格列酮？

B: 二甲双胍？

C: 格列苯脲？

D: 阿卡波糖？

答案：D

83. 可加重老年人慢性便秘的药物是

A: H

B: 异丙嗪

C: 麻黄碱

D: 氯丙嗪

答案：B

84. 属于医师用药咨询的是

A: 减肥、补钙、补充营养素

B: 栓剂、气雾剂的正确使用方法

C: 抗菌药物的合理应用

D: 注射剂溶媒的正确选择

答案：C

85. 下列止咳药中，夜间咳嗽患者宜选用的是

- A: 氨溴索
- B: 右美沙芬
- C: 喷托维林
- D: 可待因

答案：B

86. 有关尿酮体和尿肌酐的叙述正确的是

- A: 如酮体产生的速度小于组织的利用速度，则血液中的酮体增加出现酮血症
- B: 尿酮体包括乙酰乙酸、 β -丁酸、丙酮，是体内糖氧化的中间产物
- C: 酮体在肾脏产生，在血液中循环
- D: 尿肌酐是体内肌酸代谢的最终产物，是脱水缩合物

答案：D

87. 甲氨蝶呤归属

- A: D 级
- B: X 级
- C: C 级
- D: B 级

答案：B

88. 欧洲药物管理局(EMA)提议“限制临床使用多潘立酮”的主要原因是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 易发生严重的口腔溃疡

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/836152104101011030>