

2024 年广西壮族自治区龙胜各族自治县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题王牌题库带答案（完整版）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列药物中，不能增强他莫西芬活性和疗效的是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 长春新碱
- C: 西咪替丁
- D: 氟尿嘧啶

答案：C

2. 与克拉霉素和兰索拉唑联合治疗幽门螺杆菌感染的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 大观霉素
- C: 替考拉宁
- D: 羟氨苄青霉素

答案：D

3. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年，体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。

- A: 光过敏
- B: 水肿
- C: 干咳
- D: 低血糖

答案：C

4. 庚酸炔诺酮()

- A: 促进蛋白质合成
- B: 抑制排卵作用
- C: 减少精子数目
- D: 抗着床

答案：B

5. (2020 年真题) 不具有磺酰胺基结构，更容易引起耳毒性的药物是

- A: 呋塞米
- B: 依他尼酸
- C: 布美他尼
- D: 托拉塞米

答案：B

6. 使血小板内环磷酸腺苷(cAMP)增多的抗血小板药物是

- A: 替格瑞洛
- B: 双嘧达莫
- C: 阿司匹林
- D: 替罗非班

答案：B

7. 窄谱抗菌药是

- A: 头孢菌素
- B: 氯霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 异烟肼

答案：D

8. 以下不属于胰岛素不良反应的是

- A: 高钾血症
- B: 低血糖
- C: 脂肪萎缩与肥厚
- D: 皮下硬结

答案：A

9. 可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药品是()

- A: 硫酸镁
- B: 乳酸钠
- C: 氯化钾
- D: 谷氨酸

答案：B

10. 使用奥沙利铂后最需要关注的典型不良反应是

- A: 肾毒性
- B: 神经毒性
- C: 消化道反应
- D: 肝毒性

答案：B

11. 属于第一代抗精神病药物的是

- A: 氯丙嗪
- B: 氯氮平
- C: 奥氮平
- D: 利培酮

答案：A

12. 高效抑菌药是

- A: 异烟肼
- B: 头孢菌素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 氯霉素

答案：C

13. 能治疗强心苷中毒引起的异位心律的是

- A: 阿托品
- B: 哌替啶
- C: 利血平
- D: 苯妥英钠

答案：D

14. 患者，男，15 岁，因咳嗽、咳痰，发热 3 天入院，确诊为社区获得性肺炎，给予静滴青霉素钠 10 分钟后出现头昏，面色苍白，呼吸困难，血压下降等症状，对该患者首选的抢救药物是（）

- A: 去甲肾上腺素
- B: 地塞米松
- C: 肾上腺素
- D: 多巴胺

答案：C

15. 聚乙二醇干扰素 α 2a 可抑制的肝药酶是

- A: CYP2C9
- B: CYP2C19
- C: CYP2D6

D: CYP1A2

答案：D

16. 帕罗西汀用于治疗抑郁症、社交恐怖障碍，成人的起始剂量为每日

A: 60mg

B: 100mg

C: 50mg

D: 20mg

答案：D

17. 地高辛的 $t_{1/2}=33$ 小时，按每日给予治疗量，血药浓度何时可达到稳态

A: 9 天

B: 3 天

C: 12 天

D: 6 天

答案：D

18. (2017 年真题) 属于抗雄性激素的肿瘤药是 ()

A: 炔雌醇

B: 阿那曲唑

C: 他莫昔芬

D: 氟他胺

答案：D

19. 维生素 A 缺乏时可引起

A: 脚气病

B: 坏血病

C: 成人佝偻病

D: 角膜软化

答案: D

20. (2015 年真题) 属于胰岛素增敏剂的是 ()。

A: 罗格列酮

B: 二甲双胍

C: 阿卡波糖

D: 西格列汀

答案: A

21. 适宜餐前嚼服的助消化药是 ()。

A: 乳酸菌素

B: 雷尼替丁

C: 前列地尔

D: 泮托拉唑

答案: A

22. (2018 年真题) 中致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐, 宜选用的止吐治疗方案是 ()

A: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦, 化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

B: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松, 化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

C: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

D: 化疗前使用昂丹司琼, 化疗后不需要继续使用止吐药

答案: B

23. (2021 年真题) 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 粪肠球菌
- B: 双歧杆菌
- C: 梭状芽孢杆菌
- D: 嗜酸乳杆菌

答案：C

24. 喷托维林为中枢性镇咳药。

- A: 氨溴索
- B: 噻托溴铵
- C: 喷托维林
- D: 沙丁胺醇

答案：C

25. 多柔比星的异构体，适应证同多柔比星，疗效相等或略高，但对心脏毒性及脱发都明显低于多柔比星的药物是

- A: 柔红霉素
- B: 表柔比星
- C: 多柔比星
- D: 吡柔比星

答案：B

26. 需停 5 周才能换用单胺氧化酶抑制剂的药物是

- A: 文拉法辛
- B: 氟西汀
- C: 吡拉西坦

D: 吗氯贝胺

答案: B

27. 毛果芸香碱的作用特点不包括

- A: 用于白内障人工晶状体植入手术中缩瞳
- B: 术后以抵消睫状肌麻痹剂或散瞳药的作用
- C: 收防止激光手术后的反应性眼压升高
- D: 减少房水生成

答案: D

28. 主要经胆汁排泄的是

- A: 庆大霉素
- B: 阿莫西林
- C: 头孢噻肟
- D: 头孢哌酮

答案: D

29. 二磷酸果糖注射液禁用的人群是

- A: 高钾血症者
- B: 高尿酸血症者
- C: 高磷血症者
- D: 高镁血症者

答案: C

30. 支气管哮喘急性发作气雾吸入

- A: 去甲肾上腺素
- B: 异丙肾上腺素
- C: 多巴胺

D: 去氧肾上腺素

答案: B

31. 治疗急性阿米巴痢疾和阿米巴肝脓肿应首选

A: 甲硝唑

B: 氯喹

C: 二氯尼特

D: 依米丁

答案: A

32. 用 1%麻黄素液滴鼻的主要目的是

A: 收缩鼻黏膜，抑制腺体分泌

B: 收缩鼻黏膜，改善鼻通气和鼻窦引流

C: 收缩血管，降低其通透性

D: 收缩血管，减轻炎症反应

答案: B

33. 可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

A: 他莫昔芬

B: 红霉素

C: 氯丙嗪

D: 维生素 C

答案: A

34. 维 A 酸联合过氧苯甲酰治疗寻常痤疮的正确用法是

A: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶

B: 晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏，睡前应用过氧苯甲酰凝胶

C: 将两药的凝胶或乳膏充分混合后应用

D: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用

答案: A

35. 主要结构与雄激素颇为相似，但雄性化作用甚弱，蛋白同化作用很强，临床上可作为升白药物使用的是

A: 小檗胺

B: 鲨肝醇

C: 维生素 B4

D: 丙酸诺龙

答案: D

36. 对于万古霉素，描述错误的是

A: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成

B: 快速静滴会出现红人综合征

C: 可用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

D: 对革兰阴性杆菌和真菌有一定作用

答案: D

37. 青霉素用于()

A: 钩端螺旋体病

B: 鼠疫、土拉菌病

C: 伤寒、副伤寒

D: 布鲁菌病

答案: A

38. 属于靶向抗肿瘤药物的是

A: 多柔比星

B: 昂丹司琼

C: 紫杉醇

D: 吉非替尼

答案：D

39. 有机磷酸酯中毒的解救宜选用

A: 足量阿托品+胆碱酯酶复活药

B: 阿托品+新斯的明

C: 胆碱酯酶复活药

D: 阿托品

答案：A

40. 下述药物中用于拮抗肝素过量的是

A: 鱼精蛋白

B: 维生素 K1

C: 氨甲苯酸

D: 维生素

答案：A

41. (2021 年真题) 水溶性他汀类药物能够选择性抑制肝脏胆固醇合成，而对肾上腺、性腺、心脏、大脑等部位的胆固醇合成影响极低，既有效降低了血清胆固醇水平，又减少了肝脏以外组织不良反应的发生。水溶性较强的他汀类药物是 ()

A: 氟伐他汀

B: 辛伐他汀

C: 普伐他汀

D: 洛伐他汀

答案：C

42. (2021 年真题) 可用于治疗蛔虫病、蛲虫病、钩虫病和鞭虫病的广谱驱虫药物是 ()

- A: 甲硝唑
- B: 乙胺嗪
- C: 甲苯咪唑
- D: 氯硝柳胺

答案: C

43. (2019 年真题) 以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者，宜使用的药物是 ()

- A: 多烯磷脂酸胆碱
- B: 葡醛内酯
- C: 甘草酸二铵
- D: 还原型谷胱甘肽

答案: A

44. 适应证为仅用于治疗失眠的药物是

- A: 氟西汀
- B: 卡马西平
- C: 佐匹克隆
- D: 地西泮

答案: C

45. 左旋多巴除了用于抗震颤麻痹外，还可用于

- A: 心血管疾病
- B: 肝性脑病
- C: 脑膜炎后遗症
- D: 乙型肝炎

答案：B

46. 以下哪个选项不是二磷酸果糖的不良反应

- A: 尿潜血、血色素尿
- B: 低钠及低磷血症
- C: 低钾血症
- D: 乳酸中毒

答案：B

47. 留钾利尿药若每日服用 1 次，最宜的服用时间是

- A: 午餐时
- B: 早餐时
- C: 早餐前 1 小时
- D: 午餐前 1 小时

答案：B

48. 氟替卡松吸入气雾剂用于中度哮喘时的用法和用量为

- A: 一次 50~100 μg ，一日 2 次
- B: 一次 100~250 μg ，一日 2 次
- C: 一次 250~500 μg ，一日 2 次
- D: 一次 500~1000 μg ，一日 2 次

答案：C

49. 属于 β 受体激动剂的非强心苷类的正性肌力药是()

- A: 米力农
- B: 多巴酚丁胺
- C: 地高辛
- D: 依那普利

答案：B

50. 对于急性白血病在一线耐药时使用，但作为二线用药的药物是

- A: 多柔比星
- B: 吡柔比星
- C: 表柔比星
- D: 柔红霉素

答案：A

51. 华法林应用过量可选用的拮抗药是

- A: 维生素 K1
- B: 氨基己酸
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 鱼精蛋白

答案：A

52. 属于超长效胰岛素/胰岛素类似物的是

- A: 精蛋白锌胰岛素
- B: 门冬胰岛素
- C: 甘精胰岛素
- D: 普通胰岛素

答案：C

53. 以下属于第三代头孢菌素的是

- A: 头孢噻吩
- B: 头孢羟氨苄
- C: 头孢噻肟
- D: 头孢克洛

答案：C

54. 作用机制是抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶Ⅳ的药物是()

- A: 红霉素
- B: 阿莫西林
- C: 氧氟沙星
- D: 异烟肼

答案：C

55. 奥司他韦对下列哪种病毒有效

- A: 疱疹病毒
- B: 甲型肝炎病毒
- C: 巨细胞病毒
- D: 甲型、乙型流感病毒

答案：D

56. 可替代氯霉素用于治疗伤寒的药物是()

- A: 氟喹诺酮类
- B: 氨基糖苷类
- C: 青霉素类
- D: 四环素类

答案：A

57. 抑制雄激素对前列腺生长的刺激作用

- A: 昂丹司琼
- B: 亚叶酸钙
- C: 氟他胺
- D: 地塞米松

答案：C

58. 磺胺的抗菌机制是

- A: 影响叶酸代谢
- B: 抑制细菌细胞壁的合成
- C: 抑制蛋白质合成的全过程
- D: 影响胞浆膜的通透性

答案：A

59. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润行导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+)。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列哪项不属于多柔比星的禁忌证()

- A: 骨髓功能抑制
- B: 腰椎间盘突出
- C: 严重心脏病
- D: 妊娠及哺乳期妇女

答案：B

60. 以下维生素在注射前需要进行皮肤敏感试验的是

- A: 维生素 B2
- B: 维生素 B6
- C: 维生素
- D: 维生素 B1

答案：D

61. (2019 年真题) 患者，男，64 岁，因“慢性肾脏病、肾性高血压”入院，血压 203/110mmHg，该患者宜首选（如果疗程超过 2 小时需密切监测血中硫氰酸盐水平）的降压药物是（）

- A: 氨氯地平
- B: 硝普钠
- C: 美托洛尔
- D: 贝那普利

答案：B

62. 与促皮质激素合用，能促进尿钾排泄，降低钾盐疗效的是

- A: 枸橼酸钾
- B: 氯化钠
- C: 氯化钾
- D: 氯化钙

答案：C

63. 治疗阵发性室上性心动过速的最佳药物是（）

- A: 维拉帕米
- B: 苯妥英钠
- C: 普鲁卡因胺
- D: 奎尼丁

答案：A

64. 可加速毒物排泄的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 氨苯蝶啶
- C: 呋塞米
- D: 乙酰唑胺

答案：C

65. 具有耳毒性的是()

- A: 呋塞米
- B: 螺内酯
- C: 氨苯蝶啶
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

66. 代谢产物为选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂的药物是

- A: 阿昔洛韦
- B: 奥司他韦
- C: 阿糖腺苷
- D: 干扰素

答案：B

67. 关于容积性泻药的叙述，错误的是

- A: 促进钙和铁的吸收
- B: 服用容积性泻剂的同时应摄入足够水分
- C: 可能会影响华法林的吸收
- D: 主要用于轻度便秘患者的治疗

答案：A

68. 不宜口服给药的药物是

- A: 硝苯地平
- B: 普萘洛尔
- C: 洛伐他汀

D: 硝酸甘油

答案：D

69. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

A: 热带念珠菌

B: 克柔念珠菌

C: 新型隐球菌

D: 白色念珠菌

答案：B

70. 属于还原酶抑制剂的是()

A: 他达拉非

B: 度他雄胺

C: 西地那非

D: 坦洛新

答案：B

71. 硫脲类药物的不良反应不包括()

A: 发热

B: 诱发甲亢

C: 粒细胞减少

D: 过敏反应

答案：B

72. 膦甲酸钠不能与静脉滴注喷他咪联合使用，以免发生

- A: 低钾血症
- B: 低钙血症
- C: 高钾血症
- D: 高钙血症

答案：B

73. 关于苯丙哌林与可待因镇咳作用强度比较，正确的是

- A: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的 2 倍
- B: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的 2 倍
- C: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的 2~4 倍
- D: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的 2~4 倍

答案：C

74. （2021 年真题）属于微管蛋白活性制剂的抗肿瘤药物是（）

- A: 长春新碱
- B: 来曲唑
- C: 厄洛替尼
- D: 环磷酰胺

答案：A

75. 维 A 酸软膏治疗痤疮时，合理的用法是

- A: 一日一次，固定时间使用
- B: 一日一次，晨起使用
- C: 一日二次，早、晚使用
- D: 一日一次，睡前使用

答案：D

76. 可与催化肽聚糖合成的磷酸烯醇丙酮酸转移酶不可逆性结合，使该酶灭活，阻断细菌细胞壁的合成，从而导致细菌死亡的是

- A: 利奈唑胺
- B: 万古霉素
- C: 美罗培南
- D: 磷霉素

答案：D

77. 血浆半衰期较短的治疗阴茎勃起功能障碍的 5 型磷酸二酯酶抑制剂的是

- A: 他达拉非
- B: 甲睾酮
- C: 西地那非
- D: 丙酸睾酮

答案：C

78. 下列治疗恶性肿瘤的药物中，对骨髓造血功能几乎没有抑制作用的是

- A: 泼尼松
- B: 长春碱
- C: 顺铂
- D: 表柔比星

答案：A

79. 林可霉素类的主要作用靶点是

- A: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

B: 核糖体的 30S 亚基

C: 核糖体的 50S 亚基

D: 细胞内膜 PBP

答案：C

80. 可使前者作用加强或延长的是

A: 他莫昔芬

B: 氯丙嗪

C: 维生素 C

D: 红霉素

答案：B

81. 患者男性，29 岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压 85/60mmHg，脉率 110 次/分。

A: 给药方式错误

B: 使用药物缺乏针对性

C: 药物剂量过大

D: 未做皮肤过敏试验

答案：D

82. 弥散性血管内凝血早期可选用()

A: 维生素 K

B: 尿激酶

C: 肝素

D: 叶酸

答案：C

83. 与普通肝素相比，低分子肝素的抗凝作用特点是

- A: 对凝血因子 Xa、XIa 灭活作用强，对 IIa 作用弱
- B: 对凝血因子 IIa、VIIa 灭活作用强，对 Xa 作用弱
- C: 对凝血因子 Xa、XIIa 灭活作用强，对 IIa 作用弱
- D: 对凝血因子 IIa、IXa 灭活作用强，对 Xa 作用弱

答案：C

84. 雷尼替丁在使用中应注意

- A: 糖尿病患者避免使用
- B: 对食管有刺激性，需整片吞服
- C: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗
- D: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用

答案：A

85. 按作用时间分类，属于速效的胰岛素的是()

- A: 地特胰岛素
- B: 短效胰岛素
- C: 甘精胰岛素
- D: 谷赖胰岛素

答案：D

86. 不属于茶碱适应证的是

- A: 过敏性鼻炎
- B: 支气管哮喘
- C: 阻塞性肺气肿
- D: 喘息型支气管炎

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/837110161052010024>