2024年广西壮族自治区龙州县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库附参考答案（典型题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.患者，女，51岁，临床诊断为“胃食管反流病”，CrCl：45ml／min，以下哪种药物需要调整给药剂量

A：多潘立酮

B：法莫替丁

C：兰索拉唑

D：硫糖铝

答案：B

2.在人体血中白细胞群体中，中性粒细胞(DC)的正常比例范围是

A：0.50～0.70

B：0.20～0.40

C：0.01～0.05

D：0.03～0.08

答案：A

3.用于估算透析清除率的是（）

A：CoCkroft-GAut公式

B：CoChrAnE分级

C：CLHD公式

D：NCEMERP标准

答案：C

4.S一兰索拉唑在体内代谢的主要肝药酶是

A: CYP1A2

B: CYP2C19

C: CYP2C8

D: CYP2C9

答案：B

5.以下临床联合用药中，药物相互作用主要影响药效学的是

A: 四环素同服硫酸亚铁降低疗效

B: 昆布片同服异烟肼导致药效降低

C: 氢氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用

D: 维生素C与多潘立酮同服吸收减少

答案：C

6.以下对"调配处方四查十对"的叙述中，最正确的是

A: 查处方，对临床诊断

B: 查临床诊断，对用药合理性

C: 查配伍禁忌，对药品性状、规格、数量

D: 查药品，对药名、剂型、规格、数量

答案：D

7.下列哪个不是慢性咽炎的临床表现

A: 清晨起床后常会吐出微量的稀痰，伴有声嘶

B: 咽喉部不适、干燥、发痒、疼痛或有异物感

C: 常伴有发热

D: 有刺激性咳嗽

答案：C

8.规范处方行为与操作流程，归属于用药错误预防策略中的

A：人员培训

B：管理规范到位

C：环境与流程的优化与持续改进

D：科学发展

答案：B

9.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A：月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强

B：假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

C：慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至2～4.5小时

D：肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重的中枢神经系统疾病

答案：D

10.依药品采购-验收-入库-出库-调配-使用过程，从发现问题的环节开始追踪即

A：查找供货方

B：药品召回

C：对可疑药品进行封存

D：反向追踪

答案：D

11.有助于提高医、护、药专业人员对ADR的警惕性和识别能力

A：促进新药的研制开发

B: 促进临床合理用药

C: 为临床药物评价提供依据

D: 减少ADR的危害

答案：B

12.原发性高血压的临床表现中错误的是

A: 初期即有明显症状

B: 绝大多数原发性高血压属于缓进型

C: 可出现靶器官损害的临床表现

D: 诊断标准是血压高于140/90mmHg

答案：A

13.抗结核治疗中，主要针对细胞内有抗菌杀菌作用的是

A: 异烟肼

B: 利福平

C: 吡嗪酰胺

D: 乙胺丁醇

答案：C

14.氰化氢中毒呈现

A: 抽搐、进行性加重

B: 恶心、呕吐、口内有金属味

C: 出血、凝血时间延长

D: 呼出气体中可有苦杏仁气味

答案：D

15.用于治疗前列腺增生症的高选择性a1A受体阻断剂为

A: 索利那新

B：坦索罗辛

C：托特罗定

D：特拉唑嗪

答案：B

16.因体内肝酶不足，易发生灰婴综合征

A：米诺环素

B：氯霉素

C：阿奇霉素

D：庆大霉素

答案：B

17.伴有Q—T间期延长的过敏性鼻炎患者不宜使用的治疗药物是

A：鼻用抗组胺药

B：口服抗组胺药

C：白三烯受体阻断剂

D：口服糖皮质激素

答案：B

18.氨基糖苷类抗生素肾毒性大小的次序为.()。

A：新霉素＞阿米卡星＞妥布霉素＞链霉素

B：新霉素＞阿米卡星＞链霉素＞妥布霉素

C：阿米卡星＞新霉素＞妥布霉素＞链霉素

D：庆大霉素＞新霉素＞妥布霉素＞链霉素

答案：A

19.甲状腺功能亢进症患者服用丙硫氧嘧啶，可引起的典型药源性疾病是

A：慢性肾衰竭

B：消化性溃疡

C：溶血性贫血

D：粒细胞减少症

答案：D

20.（2019年真题）患者，女，27岁，孕32周，因尿急、尿痛就诊，诊断为尿路感染，应选用的药物是

A：阿奇霉素片

B：复方磺胺甲噁唑片

C：莫西沙星片

D：阿莫西林胶囊

答案：D

21.属于抗胆碱药的是

A：司来吉兰

B：普拉克索

C：苯海索

D：恩托卡朋

答案：C

22.季节性过敏性鼻炎主要的诱因是

A：季节

B：尘埃

C：花粉

D：真菌

答案：C

23.收录22000多种处方药和6000多种OTC药物的药学综合信息是

A：《马丁代尔药物大典》

B：《药物信息手册》

C：《药物事实与比较》

D：《医师案头参考》

答案：C

24.向患者发放合理用药宣传材料是

A：主动方式

B：教育方式

C：指令方式

D：协商方式

答案：A

25.可导致血中胆固醇水平升高的药品是

A：二甲双胍

B：氟伐他汀

C：避孕药

D：非诺贝特

答案：C

26.（2018年真题）患者,男,80岁,临床诊断为前列腺增生，给予多沙唑嗪治疗。药师对该患者的用药指导正确的是（）

A：睡前服用,起床站立时应缓慢,预防体位性低血压

B：睡前服用,定期监测肝功能

C：睡前服用,注意监测肾功能

D：每日服用一次,定期监测血糖,防止发生低血糖反应

答案：A

27.人体健康参数：体重指数(BMI)正常区间是

A: 18.0～22.0

B: 18.0～23.0

C: 18.5～23.0

D: 18.5～23.9

答案：D

28.季节性过敏性鼻炎主要的诱因是（）

A: 光线

B: 花粉

C: 热

D: 冷

答案：B

29.较易导致中毒性肝炎、肝衰竭的药物是

A: 比沙可啶

B: 环孢素

C: 酮康环孢素唑

D: 布洛芬

答案：C

30.成人末梢血白细胞(WBC)计数正常参考区间是

A: (15.0～20.0)×

B: 170～200g/L

C: (4.0～10.0)×10

D: 180～220g/L

答案：C

31.根据药物对胎儿的危害，美国FDA将妊娠用药分为A、B、C、D、X五个级别属于妊娠毒性A级的药物是

A: 葡萄糖

B: 沙利度胺

C: 阿莫西林

D: 万古霉素

答案：A

32.滥用抗菌药物、糖皮质激素、人血白蛋白、二磷酸果糖及肿瘤辅助治疗药物

A: 超适应证用药

B: 过度治疗用药

C: 无适应证用药

D: 有禁忌证用药

答案：B

33.患者，男，54岁，患冠心病3年，长期服用阿司匹林。近几天肢体多处出现瘀斑，故前来就诊。实验室检查：PLT70×109/L。下列药物中不会引起血小板减少的药物是

A: 阿司匹林

B: 噻氯匹定

C: 氯霉素

D: 碳酸锂

答案：D

34.下列药物中不按兴奋剂管理的是

A: 精神刺激剂

B：钙通道阻滞剂

C：利尿剂

D：蛋白同化激素

答案：B

35.主要用于吗啡、哌替啶急性中毒解救的是

A：盐酸烯丙吗啡

B：亚硝酸钠

C：双解磷

D：谷胱甘肽

答案：A

36.关于微生态制剂，下列说法不正确的是

A：对促进营养物质的吸收没有帮助

B：清除对人体具有潜在危害的细菌

C：补充人体正常生理细菌

D：调节肠道菌群平衡

答案：A

37.可吸附砷、沉淀汞的是

A：鸡蛋白

B：药用炭混悬液

C：1%氯化钠溶液

D：3%～5%鞣酸溶液

答案：A

38.医嘱：万古霉素0．5g溶解至100ml生理盐水中，滴注时间不得少于75分钟。已知所用输液器的滴系数为15，试问每分钟滴数最多为

A：15滴

B：23滴

C：20滴

D：26滴

答案：C

39.剧烈频繁干咳宜选用的药物是

A：吗啡

B：阿司匹林

C：多奈哌齐

D：可待因

答案：D

40.中毒时可采用催吐处理方法的患者

A：患有严重心脏病的患者

B：中毒引起抽搐，惊厥被控制之后的清醒病人

C：昏迷状态病人

D：孕妇患者

答案：B

41.关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是（）

A：应个体化用药

B：提倡无创给药方式，尽量口服

C：疼痛时用药，不痛时无需用药

D：按阶梯给药

答案：C

42.以下选项中，属于长效类巴比妥类镇静催眠药的是()。

A：异戊巴比妥
B：苯巴比妥
C：异丁巴比妥
D：戊巴比妥
答案：B

43.30g/L≤Hb量＜60g/L可诊断为
A：基本正常
B：重度贫血
C：轻度贫血
D：中度贫血
答案：B

44.毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。
A：10～20分钟
B：20～30分钟
C：5～10分钟
D：15～30分钟
答案：D

45.以下所列治疗咳嗽的药物中，属于处方药物的是
A：可待因
B：喷托维林
C：美酚伪麻
D：苯丙哌林

答案：A

46.引起"苯妥英钠半衰期为30～40h，羟化酶缺乏者一半剂量即出现神经毒性"是

A: 基础疾病

B: 遗传因素

C: 性别

D: 年龄

答案：B

47.超常处方

A: 无适应证用药

B: 无正当理由不首选国家基本药物

C: 二甲双胍用于糖尿病患者

D: 黄连素用于细菌性腹泻

答案：A

48.胃黏膜保护药硫糖铝应该

A: 在餐后1～2小时服用

B: 在早、晚餐前1.5小时服用

C: 在餐前1小时服用

D: 在餐前15分钟服用

答案：C

49.易产生过敏反应，如出现全身反应需要给予抗组胺药和激素进行处理的是

A: 氨氯地平

B: 紫杉醇

C: 顺铂

D: 多柔比星

答案：B

50.患者在使用丙戚酸钠时应监测血药浓度,适宜的血药浓度范围是（）

A: 10~20ug/ml

B: 10~40ug/ml

C: 50~150ug/ml

D: 4~12ug/ml

答案：C

51.异环磷酰胺的主要毒副作用是（）

A: 出血性膀胱炎

B: 心脏毒性

C: 肺纤维化

D: 溶血性尿毒症

答案：A

52.（2017年真题）下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法,错误的是（）

A: 随餐服用,并大量饮水,可增加吸收、减少胃肠道刺激

B: 口服后30分钟内应保持立位或坐位

C: 应避免同时使用两种双膦酸盐

D: 食管炎为典型不良反应

答案：A

53.儿科用药中，对新生儿或婴儿最常用的给药途径是

A：肌内注射
B：静脉滴注
C：静脉注射
D：口服给药
答案：B

54.药物治疗管理（MTM）是由美国多家药师协会学会共同定义：通过重整患者的医嘱药物或药疗方案，评估药物治疗的有效性、安全性和经济性，核查患者的用药依从性。旨在提高患者的生命质量，目前在我国药学服务行业也属于热门话题。下列人群中最需要提供药物治疗管理的是
A：糖尿病患者
B：沙眼患者
C：肺炎患者
D：湿疹患者
答案：A

55.审核后判为合理处方，应该
A：拒绝调配处方
B：依照处方调配药品
C：拒绝调配处方，依照有关规定报告
D：调配处方并发药
答案：D

56.患者女性，40岁，既往有风湿性心脏病史，近2年来出现劳力性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳痰、咯血，头晕、心悸，不能平卧，查体：半卧位，口唇发绀，肺部湿性啰音。心脏体征：肺动脉瓣听诊区第二心音亢进及舒张期奔马律。

A: 急性心肌炎

B: 大叶性肺炎

C: 急性左心衰竭

D: 支气管哮喘

答案：C

57.连续使用不应超过10日，并在使用期间定期测量眼压的滴眼液是

A: 磺胺醋酰钠滴眼液

B: 硫酸锌滴眼液

C: 泼尼松滴眼液

D: 阿昔洛韦滴眼液

答案：C

58.可引发周围神经疾病，需同服维生素B6进行防止

A: 乙胺丁醇

B: 利福平

C: 异烟肼

D: 链霉素

答案：C

59.某女性，19岁，2年前因上呼吸道感染后逐渐出现甲状腺肿大，伴多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁，根据血T

A: 甲状腺功能减退

B: 亚急性甲状腺炎

C: 甲状腺功能亢进

D: 单纯性甲状腺肿

答案：C

60.(新生儿期的药动学特点)肾脏的有效循环血量与肾小球滤过率较成人低30%～40%可影响

A: 药物排泄

B: 药物吸收

C: 药物中毒

D: 药物代谢

答案：A

61.是否增加房颤患者死亡率尚无定论，可谨慎地用于房颤的心室率控制的是()

A: 普罗帕酮

B: 美托洛尔

C: 地尔硫

D: 地高辛

答案：D

62.万络（罗非昔布）撤市是发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了3倍；此例体现了药物警戒的作用包括

A: 发现与规避假、劣药流入市场

B: 发现药品说明书问题

C: 药品上市前风险评估

D: 药品上市后风险评估

答案：D

63.某女性，19岁，2年前因上呼吸道感染后逐渐出现甲状腺肿大，伴多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁，根据血T

A: 丙硫氧嘧啶

B: 碳酸锂

C：放射性

D：碘化钾

答案：A

64.镇咳作用强度为可待因的1/3,咳嗽较弱者宜选用，同时可使痉挛的支气管平滑肌松弛，降低气道阻力的是

A：可待因

B：喷托维林

C：羧甲司坦

D：苯丙哌林

答案：B

65.切勿嚼碎、咀嚼，宜在进餐时用水吞服，不宜睡前吞服的IBS治疗药物是

A：匹维溴铵

B：环孢素A

C：地芬诺酯

D：蒙脱石散

答案：A

66.药物相互作用包括发生在体内的药动学、药效学方面的作用；以及发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

A：异烟肼

B：红霉素

C：利福平

D：伊曲康唑

答案：C

67.具有临床耐受性良好、无戒断效应特点的治疗失眠症药物为（）

A：阿戈美拉汀

B：艾司唑仑

C：低剂量的多塞平

D：小剂量米氮平

答案：C

68.提示并不存在风险，目前不需采取措施的信号属于

A：尚不确定的信号

B：部分确认信号

C：确认的信号

D：驳倒的信号

答案：D

69.对购药患者讲授安全用药常识是

A：指令方式

B：协商方式

C：教育方式

D：主动方式

答案：D

70.目前推荐的绝经激素治疗窗口期是

A：60岁以后

B：绝经后5年之内

C：绝经后15年之内或60岁以后

D：绝经后10年之内或60岁以前

答案：D

71.老年人服用可能出现锥体外系反应的药物是

A：苯二氮革类药

B：双嘧达莫

C：甲氧氯普胺

D：哌替啶

答案：C

72.（2019年真题）患者，男，78岁，实施右侧髋关节置换术，术后第10日，患侧下肢出现肿胀、疼痛，诊断为深静脉血栓。该患者应选用的药物是

A：氯吡格雷

B：依诺肝素

C：阿司匹林

D：血凝酶

答案：B

73.胶囊壳染料可引起固定性药疹

A：药物的使用

B：药物制剂因素

C：生理因素

D：生活和饮食习惯

答案：B

74.患者，男性，58岁，患有膀胱肿瘤，经常出现不能控制的尿频、尿急、夜尿增多。确诊为急迫性尿失禁，给予托特罗定治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

A：卧位和坐位时高血压

B: 直立性低血压

C: 口干、便秘、尿潴留

D: 鼻咽炎和尿路感染

答案：C

75.单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的2型糖尿病患者宜选用

A: 胰岛素

B: 大剂量碘剂

C: 格列本脲

D: 二甲双胍

答案：D

76.男性，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 氯吡格雷

B: 肝素

C: 利伐沙班

D: 华法林

答案：A

77.患者，女，39岁，有哮喘病史。1天前因发热服用阿司匹林250mg，用药后30分钟哮喘严重发作，大汗、发绀、强迫坐位。

A: 这是阿司匹林中毒的表现

B: 这是由于发热引发了哮喘

C: 可用肾上腺素治疗

D: 这是由于阿司匹林诱发了哮喘

答案：D

78.患者，男，52岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

A: 雷米普利

B: 左旋氨氯地平

C: 比索洛尔

D: 氟伐他汀

答案：C

79.最常用的解热镇痛药为

A: 阿司匹林

B: 谷维素

C: 对乙酰氨基酚

D: 塞来昔布

答案：C

80.患者，女，65岁，间断腹胀、纳差6年，因病情加重伴精神恍惚3天为主诉入院，实验室检查:ALT200UL，AST320UL，诊断为肝硬化失代偿期、肝性脑病。患者乙肝病史20年，间断服用中药（具体不详）治疗。糖尿病史10年，便秘多年，3~4天排便一次。

A: 辅酶A

B: 多烯磷脂酰胆碱

C: 水溶性维生素

D: 维生素B1

答案：B

81.热程持续4周以上，体温持续在37.5-38℃间波动，其属于

A: 超高热

B: 长期低热

C: 中低等度热

D: 不明原因发热

答案：B

82.药品通用名容易混淆的抗病毒药是

A: 阿糖腺苷

B: 阿糖胞苷

C: 氟尿嘧啶

D: 氟胞嘧啶

答案：A

83.用于前列腺增生症的高选择性 α1A 受体阻断剂是（）

A: 托特罗定

B: 特拉唑嗪

C: 坦索罗辛

D: 索利那新

答案：C

84.属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是

A: 文拉法辛

B: 阿米替林

C: 氟西汀

D: 吗氯贝胺

答案：C

85.患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 3.7×109/L。医生为患者开具的处方如下：

A: 3日
B: 2日
C: 4日
D: 5日
答案：C

86.女性，32岁，3年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞7×109/L，血小板120×109/L，血清铁300μg/L。
A: 溶血性贫血
B: 再生障碍性贫血
C: 缺铁性贫血
D: 巨幼细胞性贫血
答案：C

87.惠者男56岁因出现面色苍白、乏力、肢体麻木、共济失调等症状就诊查体舌面光滑,呈牛肉样舌”。化验结果提示血清叶酸和维生素B12水平下降，下列药物中不会影响维生素B12吸收的是()
A: 二甲双胍
B: 奥美拉唑
C: 对氨基水杨酸
D: 氨氯地平
答案：D

88.以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛的首选处方药是
A: 地西泮
B: 舒马曲坦

C：苯噻啶

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/837110165052010024