

口腔颌面外科学考试题库含答案

161、患者，女性，32岁，因关节区疼痛，开口受限2个月就诊，既往有左侧关节弹响病史1年。临床检查见开口度1.8cm，开口型左偏，关节区疼痛，关节区无弹响，无摩擦音。左侧颞下颌关节造影侧位体层闭口位显示关节盘后带位于髁突横嵴前方，开口位见髁突前方的关节盘压迫变形，临床检查被动开口时开口度不能增大，正确的诊断为0.42分

- A. 翼外肌痉挛
- B. 咀嚼肌群痉挛
- C. 可复性关节盘前移位
- D. 不可复性盘前移位
- E. 关节盘附着松弛

正确答案：D

答案解析：不可复性盘前移位根据病程，6个月以内为急性，6个月以上为慢性。大多数患者有关节弹响的病史。可复性盘前移位以保守治疗为主。牙合垫治疗是或消除弹响的一种较好方法，但在症状好转的许多患者中，关节盘并为恢复正常位置。不可复性盘前移位早期可通过患者下颌运动使关节盘复位。

162、脓肿切开后建立引流时不需考虑的因素有0.42分

- A. 脓肿位置
- B. 脓腔大小
- C. 脓肿的深浅
- D. 脓肿的致病菌
- E. 脓肿形成的时间

正确答案：E

答案解析：脓肿切开后建立引流时需考虑的因素有：脓肿位置、大小、深浅及致病菌。

163、长期使用肾上腺皮质激素的患者拔牙后，最容易出现危象的时间是0.42分

- A. 术后6小时左右
- B. 术后12小时左右

- C. 术后 20 小时左右
- D. 术后 24 小时左右
- E. 术后 48 小时左右

正确答案：C

答案解析：长期使用肾上腺皮质激素的患者拔牙后，术后 20 小时左右最容易出现危象。

164、牙片上牙邻面颈部所呈现的三角形透明区是 0.42 分

- A. 邻面龋
- B. 正常牙颈部
- C. 牙槽嵴吸收
- D. 牙颈部脱钙
- E. 投照角度不正确所致

正确答案：B

答案解析：X 线牙片上牙齿邻面颈部所呈现的三角形透明区是正常牙颈部。

165、华氏位常用来观察 0.42 分

- A. 上颌窦病变
- B. 颧骨
- C. 颌间间隙
- D. 颧弓
- E. 以上皆是

正确答案：E

答案解析：颧骨、颧弓、颌间间隙及上颌窦病变常用滑石位来观察。

166、患者女性，43 岁，因开口严重受限 3 个月就诊。临床检查开口度 10mm，无明显疼痛，无弹响和杂音，右侧升颌肌群发硬有压痛，听诊器可听到肌杂音。最可能的诊断是 0.42 分

- A. 右侧翼外肌亢进
- B. 右侧翼外肌痉挛
- C. 右侧咀嚼肌群痉挛
- D. 右侧肌筋膜痛

E. 右颞下颌关节炎性疾病类

正确答案：C

答案解析：咀嚼肌群痉挛常见的是闭颌肌群痉挛。病人常常有明显的精神因素影响，有严重的神经衰弱等病症。主要症状是开口受限，开口度仅 0.5~1.5cm，因此开口痛和咀嚼痛反而不明显，也无弹响和杂音。不少病人还伴有头痛。病程很长，症状可持续数月甚至年余。如长期得不到适当的治疗，功能性肌肉痉挛可以发展成肌肉挛缩，以致难以恢复正常。检查时可触到肌痉挛处发硬并有压痛。即使在肌肉静止期，用听诊器也可听到“营营”的肌杂音。有的病人有扳机点，压迫扳机点可引起远处牵涉痛。

167、气管切开的部位应位于气管的 0.42 分

A. 第 1~2 环间

B. 第 2~4 环间

C. 第 5~6 环间

D. 第 7~8 环间

E. 第 6~7 环间

正确答案：B

答案解析：气管切开的部位应位于气管的第 2~4 环间。

168、对颞下颌关节上腔造影正常图像的描述，错误的是 0.42 分

A. 关节上腔呈“S”形态

B. 许勒位片造影剂影像比体层片小

C. 开口位前上隐窝造影剂可能减少

D. 闭口位关节盘后带后缘平髁突横嵴

E. 开口位关节盘中带正对髁突横嵴

正确答案：C

答案解析：对颞下颌关节上腔造影，开口位前上隐窝造影剂无留存，基本消失。

169、以下哪项不是中厚皮片的优点 0.42 分

A. 较柔软

B. 能耐受摩擦

C. 色素沉着轻

- D. 可生长在轻微感染经过适当处理的肉芽创面上
- E. 挛缩较少

正确答案：D

答案解析：中厚皮片包括表皮和部分真皮；依据包含真皮多少不同，又分为厚，薄两种。中厚皮片的厚度介于全厚和表层皮片之间，兼有两者的优点，较柔软，色素沉着轻，易于成活，能耐受摩擦，挛缩较少，应用范围广泛，为成形术中最常使用的皮片。但在供皮区常有增厚的瘢痕遗留，称为增生性疤痕，是其主要缺点。

170、作口腔颌面 X 线检查时，下列选择正确的是 0.42 分

- A. 根尖周囊肿常用横断牙合片检查
- B. 下颌较大的囊肿首选根尖片
- C. 观察关节间隙改变首选用髁突经咽侧位
- D. 鼻腭囊肿常用牙合翼片
- E. 怀疑上颌窦炎首选华氏位片检查

正确答案：E

答案解析：作口腔颌面 X 线检查时，怀疑上颌窦炎首选华氏位片检查。

171、腭咽肌环组成的肌肉不包括 0.42 分

- A. 舌肌
- B. 腭帆张肌
- C. 腭帆提肌
- D. 咽上缩肌
- E. 咽中缩肌

正确答案：E

答案解析：舌肌、腭帆张肌、腭帆提肌、咽上缩肌参与构成腭咽肌环。

172、无张力的颈部整形手术切口拆线时间可提前至 0.42 分

- A. 术后 3 天
- B. 术后 4 天
- C. 术后 5 天
- D. 术后 6 天

E. 术后 7 天

正确答案：E

答案解析：无张力的颈部整形手术切口拆线时间可提前至术后 7 天。

173、感染是什么在宿主体内繁殖或侵袭而导致的疾病 0.42 分

A. 各种生物因子

B. 细菌

C. 微生物

D. 病毒

E. 衣原体

正确答案：A

答案解析：感染是各种生物因子在宿主体内繁殖或侵袭而导致的疾病。

174、临床III期 0.42 分

A. T1N2M1

B. T1N0M0

C. T2N0M0

D. T1N2M0

E. T2N1M0

正确答案：E

答案解析：肿瘤的分期 TNM 分期法根据肿瘤的大小，浸润，淋巴转移情况，远处脏器转移情况来划分的，需要根据具体的肿瘤，一般的 T 是只肿瘤的大小，浸润，N 是淋巴转移情况。N0 无淋巴转移，N1 区域淋巴转移，N2 远处淋巴结转移。M 是指脏器的转移情况。临床 I 期是 T1N0M0，临床 II 期是 T2N0M0，临床III期是 T2N1M0，临床IVA 期是 T1N2M0。

175、患者，女性，25 岁，右下颌埋伏第三磨牙，近中倾斜，全景片示远中牙根向近中弯曲明显，根尖近下颌管。无冠周炎病史，正畸治疗前要求拔除。若已出现神经损伤，正确的处理是 0.42 分

A. 严密缝合创口，促进创口愈合

B. 给予足量抗生素，预防感染

C. 给予持续冰敷，减少组织水肿

- D. 给予地塞米松和维生素 B1、B6、B12
- E. 24 小时后给予热敷，加速局部血运，促进神经愈合

正确答案：D

答案解析：拔牙时若发现已出现神经损伤，给予地塞米松和维生素 B1、B6、B12 是正确的处理措施。

176、可复性关节盘移位的临床特征，描述不正确的是 0.42 分

- A. 开口弹响
- B. 薛氏位可见关节前间隙变窄后间隙变宽
- C. 造影可以证实关节盘移位
- D. 可伴发翼外肌痉挛和关节滑膜炎
- E. 关节区可有压痛

正确答案：B

答案解析：关节盘移位在下颌关节紊乱病中是较常见的。由于关节盘前方的肌肉过度牵拉，或后方韧带松弛及髁突后退等原因导致关节盘向前方移位，甚至脱出关节窝，闭口时一般表现为盘前移位的状态。开口时髁突须撞击并越过关节盘后带，而出现关节弹响，之后关节盘的位置恢复正常；而闭口时有时会再次撞击而出现弹响，闭口时回复为盘前移位的状态。这种闭口时盘位置前移，开口时盘位置恢复的病变情况，称为可复性关节盘前移位。

177、表层皮片的厚度约为 0.42 分

- A. 0.1~0.15mm
- B. 0.2~0.25mm
- C. 0.3~0.35mm
- D. 0.35~0.4mm
- E. 0.45~0.5mm

正确答案：B

答案解析：表层皮片约厚 0.2~0.25mm，薄中厚皮片约厚 0.35~0.5mm，厚中厚皮片约厚 0.6~0.75mm。

178、最易进入上颌窦的断根是 0.42 分

- A. 第一磨牙近中颊根、腭根

- B. 第一磨牙近中颊根、第二磨牙近中颊根
- C. 第一磨牙腭根、第二磨牙近中颊根
- D. 第二磨牙远中颊根、第二磨牙龈根
- E. 第一磨牙腭根、第二磨牙腭根

正确答案：C

答案解析：第一磨牙腭根、第二磨牙近中颊根是最易进入上颌窦的断根。

179、患者，女性，32岁，因关节区疼痛，开口受限2个月就诊，既往有左侧关节弹响病史1年。临床检查见开口度1.8cm，开口型左偏，关节区疼痛，关节区无弹响，无摩擦音。颞下颌关节造影侧位体层闭口位片的正常影像是0.42分

- A. 关节盘后带恰位于髁突横嵴前方
- B. 关节盘后带恰位于髁突横嵴之上
- C. 关节盘后带恰位于髁突横嵴后方
- D. 关节盘后带的后缘位于髁突横嵴之上
- E. 关节盘中带恰对髁突横峰

正确答案：B

答案解析：关节盘后带恰位于髁突横嵴之上是颞下颌关节造影侧位体层闭口位片的正常影像。

180、翼外肌痉挛的主要临床特征是0.42分

- A. 弹响和开口受限
- B. 开口型歪曲
- C. 疼痛和开口受限
- D. 翼外肌相应的面部红肿
- E. 关节区压痛

正确答案：C

答案解析：疼痛和开口受限是翼外肌痉挛的主要临床特征。

181、恶性肿瘤患者拔牙时，错误的操作是0.42分

- A. 对于恶性淋巴瘤患者，必须与有关专家配合，在治疗有效、病情稳定后方可拔牙
- B. 恶性肿瘤侵犯患牙，引起受累牙疼痛时，为减轻患者的痛苦，应及时拔除受累

牙

C. 恶性肿瘤侵犯病区牙，引起症状时，为避免拔牙造成肿瘤扩散，应与肿瘤一同行根治性手术

D. 恶性肿瘤化疗期间，若需拔牙应对化疗药物的毒副作用有清楚的了解，以权衡拔牙的时机

E. 恶性肿瘤放疗前，应对口腔内可能引起炎症且不能保留的患牙先行拔除，避免放疗后引起放射性颌骨骨髓炎

正确答案：B

答案解析：恶性肿瘤侵犯病区牙，引起症状时，为避免拔牙造成肿瘤扩散，应与肿瘤一同行根治性手术而非拔出累牙。

182、口腔颌面部中、小型组织缺损的修复最常用的是 0.42 分

A. 胸大肌皮瓣

B. 胸三角皮瓣

C. 前臂皮瓣

D. 上臂内侧皮瓣

E. 管状皮瓣

正确答案：C

答案解析：前臂皮瓣是口腔颌面部中、小型组织缺损的修复最常用的皮瓣。

183、以下关于良性肿瘤特点的叙述，错误的是 0.42 分

A. 永不威胁生命

B. 细胞分化程度高

C. 膨胀性生长，不发生转移

D. 有包膜，界限清，少数可恶变

E. 肿瘤细胞与来源组织相似

正确答案：A

答案解析：良性肿瘤具有以下特点：1、有包膜，界限清，少数可恶变 2、细胞分化程度高 3、膨胀性生长，不发生转移 4、肿瘤细胞与来源组织相似 5、极少威胁生命。

184、皮样囊肿穿刺物 0.42 分

- A. 红褐色血样液体，经久不凝
- B. 微浑浊的黄色黏稠性液体
- C. 淡黄色清亮液体，含淋巴细胞
- D. 黄色或棕色的清亮液体，含胆固醇结晶
- E. 乳白色豆腐渣样分泌物

正确答案：E

答案解析：鳃裂囊肿穿刺液的特征是黄色或棕色的清亮液体，含胆固醇结晶；囊性水瘤穿刺液的特征是淡黄色清亮液体，含淋巴细胞；神经鞘瘤穿刺液的特征是红褐色血样液体，经久不凝；甲状舌管囊肿穿刺液的特征是微浑浊的黄色黏稠性液体；皮样囊肿穿刺物的特征是乳白色豆腐渣样分泌物。

185、关于牙源性中央性颌骨骨髓炎弥散破坏期特点，错误的是 0.42 分

- A. 破坏以病源牙为中心，边界不清
- B. 病灶周围小梁逐渐增粗变密
- C. 线状骨膜反应位于破坏严重区的密质骨外
- D. 骨质呈弥散点、片状破坏
- E. 骨小梁模糊不清乃至破坏消失

正确答案：C

答案解析：牙源性中央性颌骨骨髓炎弥散破坏期特点是：骨小梁模糊，骨质弥散性点状、斑片状破坏，破坏以病源牙为中心，边界不清，灶周围小梁逐渐增粗变密，线状骨膜反应位于破坏严重区的密质骨以内。

186、以上属于动脉干网状皮瓣的是 0.42 分

- A. 胸大肌皮瓣
- B. 胸三角皮瓣
- C. 前臂皮瓣
- D. 上臂内侧皮瓣
- E. 管状皮瓣

正确答案：C

答案解析：胸三角皮瓣属于直接皮肤血管皮瓣；前臂皮瓣属于动脉干网状皮瓣；胸大肌皮瓣属于肌皮血管皮瓣；上臂内侧皮瓣属于复合组织瓣。

187、患者女性，26岁，因开口受限左颞下颌关节区疼痛3个月就诊。临床检查开口度2.2cm，上颌结节后上方有压痛，被动开口度可大于自然开口度；未闻及开闭口弹响声，开口型偏向左侧。咀嚼时，左侧关节周围区深部疼痛，但不能触及，疼痛性质为钝痛，无自发痛。最可能的诊断是0.42分

- A. 左侧翼外肌亢进
- B. 左侧翼外肌痉挛
- C. 左侧不可复性关节盘前移位
- D. 左侧可复性关节盘前移位
- E. 左侧咀嚼肌群痉挛

正确答案：B

答案解析：翼外肌痉挛：1. 关节或关节周围疼痛，可以指出痛处在关节区深部但不能触及，无自发痛。疼痛性质为剧痛。2. 开口受限。检查时可见开口中度受限，开口型偏斜，开口时下颌偏向患侧。前伸、侧向运动受限。作被动开口度检查时仍可继续大开口。3. 患侧乙状切迹中点的下方及上颌结节后上方有压痛，但不红肿。4. 髁突滑动度明显减小，一般无关节弹响。5. 严重者可以出现急性牙颌关系紊乱。一旦痉挛解除，以上症状均可消失。

188、X线照片上正常牙槽嵴顶的形态是0.42分

- A. 均为尖顶形
- B. 均为平顶形
- C. 均为不规则形
- D. 前牙为尖顶形，后牙为平顶形
- E. 前牙为平顶形，后牙为尖顶形

正确答案：D

答案解析：X线片上正常牙槽嵴顶的形态表现为前牙为尖顶形，后牙为平顶形。

189、骨纤维异常增殖症典型的X线表现是0.42分

- A. 骨膜成骨呈日光放射状排列
- B. 大小不等的圆形或椭圆形透影区
- C. 不规则骨质破坏
- D. 单囊透影区

E. 毛玻璃样变

正确答案：E

答案解析：毛玻璃样变是骨纤维异常增殖症典型的 X 线表现。

190、发生液性变时可穿刺出不凝固血性液体的是 0.42 分

A. 神经纤维瘤

B. 神经鞘瘤

C. 骨肉瘤

D. 成釉细胞瘤

E. 血管内皮瘤

正确答案：B

答案解析：神经鞘瘤发生液性变时可穿刺出不凝固血性液体。

191、临床 II 期 0.42 分

A. T1N2M1

B. T1N0M0

C. T2N0M0

D. T1N2M0

E. T2N1M0

正确答案：C

答案解析：肿瘤的分期 TNM 分期法根据肿瘤的大小，浸润，淋巴转移情况，远处脏器转移情况来划分的，需要根据具体的肿瘤，一般的 T 是只肿瘤的大小，浸润，N 是淋巴转移情况。N0 无淋巴转移，N1 区域淋巴转移，N2 远处淋巴结转移。M 是指脏器的转移情况。临床 I 期是 T1N0M0，临床 II 期是 T2N0M0，临床 III 期是 T2N1M0，临床 IV A 期是 T1N2M0。

192、下列对颞下颌关节上腔造影正常图像的描述，错误的是 0.42 分

A. 开口位前上隐窝造影剂基本消失

B. 开口位前上隐窝造影剂仍存留

C. 关节上腔呈“S”形

D. 中段造影剂较窄

E. 关节盘后带位于髁突横嵴之上

正确答案：B

答案解析：颞下颌关节上腔造影,可见关节上腔呈“S”形,中段造影剂较窄,关节盘后带位于髁突横嵴之上,开口位前上隐窝造影剂无存留,基本消失。

193、为了显示下颌下腺导管结石,采用的检查技术是 0.42 分

- A. 下颌牙合片
- B. 曲面体层片
- C. 根尖片
- D. 牙合翼片
- E. 下颌下腺造影片

正确答案：A

答案解析：下颌牙合片可显示下颌下腺导管结石。

194、皮肤移植分为 0.42 分

- A. 全厚皮片、中厚皮片、表层皮片
- B. 断层皮片及全厚皮片
- C. 全厚皮片、中厚皮片、表层皮片及带脂肪的全厚皮片
- D. 游离皮片移植和皮瓣移植
- E. 游离皮片移植和带蒂皮瓣移植

正确答案：D

答案解析：皮肤移植分为游离皮片移植和皮瓣移植两种。

195、最常见的多发性唾液腺肿瘤 0.42 分

- A. 多形性腺瘤
- B. 腺样囊性癌
- C. 黏液表皮样癌
- D. 腺泡细胞癌
- E. 沃辛瘤

正确答案：B

答案解析：腺样囊性癌是最常见的多发性唾液腺肿瘤。

196、患者,女,55岁,以“右眶下肿痛2周就诊”。查:右上颌尖牙残根,叩痛(+),唇颊沟饱满,压软。右眶下区弥漫性肿胀,皮肤红,发亮,鼻唇沟消

失。该患者的诊断首先考虑 0.42 分

- A. 眶下间隙感染
- B. 上颌囊肿
- C. 唇部疖痈
- D. 上颌根尖周炎
- E. 第三磨牙冠周炎

正确答案：A

答案解析：眶下间隙感染是指眶下间隙急性化脓性感染，主要临床表现有眶下区皮肤发红、张力增大，眼睑水肿、睑裂变窄、鼻唇沟消失。眶下间隙蜂窝组织炎阶段可从局部外敷中药及针对感染病灶牙的处理着手；一旦脓肿形成应及时作切开引流术。

197、患者，男性，36 岁，因左下颌第一磨牙拔除后创口持续疼痛而就诊。患者 4 天前曾行左下颌第一磨牙残冠拔除术，术中断根，拔牙时间较长。拔牙后创口疼痛明显，术后 1 天稍有好转，术后 2~3 天疼痛加剧，并向颌下区和耳颞部放射，拔牙后一直口服抗生素和镇痛药，症状无法控制。临床检查：拔牙窝内空虚，创面成灰白色，触痛明显，棉签擦拭后有恶臭。正确的处理方法是 0.42 分

- A. 大剂量抗生素治疗
- B. 局部过氧化氢溶液和生理盐水反复冲洗，配合抗生素及镇痛治疗
- C. 拔牙窝内涂布碘酚，配合抗炎镇痛治疗
- D. 局麻下彻底清洗拔牙窝，刮出新鲜血液，待血液充满牙槽窝后横过牙槽嵴置消毒面卷，咬紧半小时。医嘱同首次拔牙，继续抗炎镇痛治疗
- E. 局麻下彻底清创，过氧化氢溶液和生理盐水反复冲洗至拔牙窝清洁无味，严密填塞碘仿纱条，缝合固定

正确答案：E

答案解析：下颌第一磨牙残冠拔除术的具体操作为局麻下彻底清创，过氧化氢溶液和生理盐水反复冲洗至拔牙窝清洁无味，严密填塞碘仿纱条，缝合固定，去除碘仿纱条后，约 2~3 周创面可大致愈合。

198、X 线片示根尖部有约豌豆大的圆形透射影，边界清楚、光滑，有骨白线围绕，中心密度均匀，最可能的诊断为 0.42 分

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/838012070044007040>