

2023-24 年黑龙江省友谊县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题通关秘籍题库及答案（有一套）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 妇女绝经后骨质疏松症的激素替代治疗方案为

- A: 钙剂+维生素 D+雌激素
- B: 钙剂+维生素 D+降钙素
- C: 钙剂+维生素 D+双磷酸盐
- D: 钙剂+维生素 D+甲状旁腺激素

答案：D

2. 国际标准化比值是血栓性疾病患者实施抗凝治疗的依据，其正常参考区间是

- A: >1.5
- B: <0.8
- C: 2
- D: $0.8 \sim 1.5$

答案：D

3. 磺酰脲类促胰岛素分泌剂

- A: 罗格列酮
- B: 瑞格列奈
- C: 格列吡嗪
- D: 伏格列波糖

答案：C

4. 下列口服降糖药中，最适宜餐后血糖 (PBG) 高者选用的口服降糖药是

- A: 格列齐特
- B: 格列吡嗪
- C: 格列本脲
- D: 格列美脲

答案：B

5. 目前治疗低 HDL-C 血症，较为有效的药物是

- A: 烟酸类
- B: 他汀类
- C: ω -3 脂肪酸制剂
- D: 贝特类

答案：A

6. 减轻前列腺张力和膀胱出口梗阻

- A: 索利那新
- B: 度他雄胺
- C: 哌唑嗪
- D: 特拉唑嗪

答案：D

7. (2021 年真题) 哺乳期妇女使用，可致男婴乳房增大的药物是 ()

- A: 依那普利
- B: 胰岛素
- C: 复方炔诺酮
- D: 复方磺胺甲噁唑

答案：C

8. 应在睡前服用，疗效较好的是

- A: 噻氯匹定
- B: 硫酸镁
- C: 沙丁醇胺
- D: 维生素 B1

答案：C

9. 感冒初出现卡他症状，如鼻黏膜充血、打喷嚏、流眼泪、流鼻涕，宜选服

- A: 含氢溴酸右美沙芬制剂
- B: 含中枢兴奋剂咖啡因制剂
- C: 含伪麻黄碱及氯苯那敏制剂
- D: 含非甾体抗炎药制剂

答案：C

10. 以下"规范应用白三烯受体拮抗剂治疗慢性阻塞性肺疾病"的叙述中，不正确的是

- A: 不适用于轻、中度哮喘和稳定期的控制
- B: 不宜首选治疗急性哮喘
- C: 在治疗 COPD 时不宜单独应用
- D: 不宜用于急性发作

答案：A

11. 其含量用生育酚当量(RE)表示的是

- A: 维生素 E
- B: 维生素 D
- C: 维生素 B

D: 维生素 C

答案：A

12. (2017 年真题) 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

A: 可待因

B: 溴己新

C: 右美沙芬

D: 乙酰半胱氨酸

答案：C

13. 发现处方存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施

A: 治疗药物监测

B: 处方点评

C: 静脉药物配置

D: 处方审核

答案：B

14. 能提示患者大量或长期应用广谱抗生素的粪便细胞显微镜检出物是

A: 真菌

B: 上皮细胞

C: 吞噬细胞增多

D: 红细胞

答案：A

15. 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院、目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是()

- A: 肝素
- B: 阿司匹林
- C: 利伐沙班
- D: 氯吡格雷

答案：B

16. 血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的 8%~9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

- A: >90g/L
- B: 31~60g/L
- C: <30g/L
- D: 61~90g/L

答案：C

17. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mgtidpo，阿托伐他汀钙片 20mgqdpo 等药物治疗。

- A: 每次调整 1~4 单位
- B: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量
- C: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存
- D: 每 3~5 天调整 1 次

答案：C

18. 预激综合征伴房颤患者，控制心室率时慎用的药物为

- A: 硝苯地平
- B: 去乙酰毛花苷
- C: 利伐沙班
- D: 胺碘酮

答案：B

19. 振奋精神增加供氧能力的兴奋剂是

- A: 阿托品
- B: 苯丙胺
- C: 甲睾酮
- D: 呋塞米

答案：B

20. 患儿，男，2 岁，患有尿路感染，适宜的治疗药物是

- A: 阿莫西林
- B: 链霉素
- C: 左氧氟沙星
- D: 复方磺胺甲噁唑

答案：A

21. （2016 年真题）对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是（）。

- A: 雷美尔通
- B: 佐匹克隆
- C: 地西泮
- D: 米氮平

答案：D

22. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是

- A: 剂量递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最小
- B: 当单药治疗无效时，可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药
- C: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判定疗效
- D: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗

答案：C

23. 题]可影响幼儿软骨发育，导致承重关节损伤的药物是

- A: 米诺环素
- B: 头孢唑林
- C: 阿米卡星
- D: 诺氟沙星

答案：D

24. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病，而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有用药物治疗，接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅三成左右。高血压死亡率不断升高。熟悉高血压及相关用药，对更有效地治疗高血压非常重要。

- A: 卡托普利口服
- B: 硝普钠静滴
- C: 哌唑嗪口服
- D: 硝苯地平口服

答案：B

25. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

- A: 17β 一雌二醇
- B: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片
- C: 雌二醇一屈螺酮片
- D: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片

答案：B

26. 二氢吡啶类钙通道阻滞药硝苯地平引起的主要不良反应是

- A: 水肿
- B: 多毛症
- C: 低钾血症
- D: 高钾血症

答案：A

27. 以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛患者的首选处方药是

- A: 山莨菪碱
- B: 地西泮
- C: 苯噻啶
- D: 卡马西平

答案：D

28. 下列药品可以申请医疗机构制剂的是

- A: 生物制品（变态反应原除外）
- B: 中药、化学药的复方制剂
- C: 中药颗粒剂
- D: 中药注射剂

答案：C

29. 服用时应多饮水，同时应碱化尿液以防止尿酸结石形成的药物是

- A: 苯溴马隆
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 氨苄西林
- D: 氨茶碱

答案：A

30. 目前唯一被批准用于治疗类风湿关节炎的 IL-1 拮抗剂类生物制剂为

- A: 阿达木单抗
- B: 英夫利昔单抗
- C: 阿巴西普
- D: 阿那白滞素

答案：D

31. 大剂量易引起碱血症的抗酸药是

- A: 莫沙必利
- B: 西沙必利
- C: 奥美拉唑
- D: 碳酸氢钠

答案：D

32. IV 期新药临床试验样本数要求

- A: 20~30 例
- B: 主要病种 $\geq$ 300 例
- C: $\geq$ 300 例
- D: 常见病 $\geq$ 12000 例

答案：D

33. 患者,男,21 岁因过敏性鼻炎就诊。关于过敏性鼻炎药物治疗及用药教育的说法,错误的是()

- A: 治疗过敏性鼻炎使用口服糖皮质激素,首选地塞米松
- B: 过敏性鼻炎的典型症状和感冒症状相似,应注意鉴别
- C: 过敏性鼻炎患者应尽量避免接触已知的过敏原
- D: 治疗过敏性鼻炎可局部使用糖皮质激素鼻喷剂

答案: A

34. 同时使用 5 种药物, 药物不良事件的发生率为

- A: 0.58
- B: 0.38
- C: 0.13
- D: 0.72

答案: B

35. 患儿,女,4 岁半,身高 110cm,体重 15KG,一天前发热(39℃),咽喉痛,无咳嗽、吐血,家长主诉在家中应用退烧药治疗,发病左右出现腹泻,约 2~5 次大便,量少,黄色粘液便,呕吐一次。体格检查: T38.8℃, P118 次/分, R28 次/分。咽微充血,出现轻脱水症状。双肺呼吸音清,腹平软,肝脾未触及,肠鸣音活跃,实验室检查: WBC: 5×10

- A: 腹泻可致电解质丢失,故须特别注意补充
- B: 首选口服补液,必要时静脉补液
- C: 小柴碱和鞣酸蛋白不宜同时服用
- D: 药用炭可吸附细菌和毒素,可与抗生素同时服用

答案: D

36. (2016 年真题) 患者到药店购买“扑尔敏片”,药师应给予()。

- A: 奥司他韦片
- B: 阿昔洛韦片
- C: 更昔洛韦片
- D: 氯苯那敏片

答案：D

37. 甲状旁腺制剂

- A: 骨吸收抑制剂
- B: 骨形成刺激剂
- C: 激素替代剂
- D: 促进骨矿化剂

答案：B

38. 解救中毒的肾衰竭者（）

- A: 不能用强利尿剂
- B: 不能催吐
- C: 不能导泻
- D: 禁止洗胃

答案：A

39. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%，尿分析见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素
- B: 选用肾毒性小、副作用少的抗菌药物
- C: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高
- D: 首选针对革兰氏阳性菌的药物

答案：D

40. 下列金属解毒剂中，对铅中毒疗效最好的是

- A: 二巯丙醇
- B: 依地酸钙钠
- C: 硫代硫酸钠
- D: 二巯丁二钠

答案：B

41. 轻度支气管哮喘疾病的临床表现为

- A: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率 >30 次 / 分，常有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常 >120 次 / 分，奇脉， PaO_2
- B: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常
- C: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉
- D: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失

答案：B

42. 患者溃疡治愈后，因膝关节痛，需要长期服用非甾体抗炎药。为降低溃疡发生风险，首选的预防药物是（）

- A: 奥美拉唑
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 替普瑞酮
- D: 多潘立酮

答案：A

43. 有助于提高医、护、药专业人员对 ADR 的警惕性和识别能力

- A: 促进临床合理用药
- B: 促进新药的研制开发
- C: 为临床药物评价提供依据
- D: 减少 ADR 的危害

答案：A

44. 选择性 GABAA 复合受体拮抗剂

- A: 米氮平
- B: 阿戈美拉汀
- C: 唑吡坦
- D: 艾司唑仑

答案：C

45. 糖尿病合并肾病者宜首选的药物是

- A: 阿卡波糖
- B: 罗格列酮
- C: 二甲双胍
- D: 格列喹酮

答案：D

46. 从饮食、运动上严格管理，最适合于

- A: 骨质疏松
- B: 焦虑障碍
- C: 高血压
- D: 糖尿病

答案：D

47. 氢氯噻嗪与地高辛同服出现心律失常的机制是

- A: 敏感化作用
- B: 协同作用
- C: 竞争性拮抗作用
- D: 减少不良反应

答案：A

48. 用于中度疼痛和癌性疼痛宜选用的药物是

- A: 吗啡
- B: 多奈哌齐
- C: 可待因
- D: 阿司匹林

答案：C

49. 关于处方书写要求，错误的是

- A: 化学药、中成药可以开在一张处方纸上，但每种药品必须分行书写，药品总数不得超过 5 种
- B: 处方如果修改，需要在修改处有医师签名和日期
- C: 一张处方最多可以为 2 名患者开具药品
- D: 处方上需要标明临床诊断结果

答案：C

50. 患者，男，66 岁，身高 170cm，体重 85kg，以“头晕、胸闷、乏力 1 周”为主诉入院治疗。空腹血糖 11.2mmol / L，餐后血糖 16.5mmol / L。诊断结果：2 型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍 0.5gbid、消渴丸 10 丸（规格 30g / 120 丸）bid、罗格列酮 4mgqd 治疗。

- A: 空腹血糖

B: 糖化血红蛋白 (HbA1c)

C: 餐后血糖

D: 白细胞计数

答案: B

51. 一新生儿确诊感染乙型肝炎病毒，提示其生母妊娠期间血清免疫学检查结果应为

A: HBsAb, HBeAg 均为阳性

B: HBsAg 为阳性

C: HBeAg 为阳性

D: HBsAg, HBeAg 均为阳性

答案: D

52. 下列白细胞计数中，成人静脉血的正常参考值为

A: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9/L$

B: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$

C: $(4.3 \sim 10.0) \times 10^9/L$

D: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

答案: B

53. 主要用于青光眼急性发作短期控制的药物是

A: 乙酰唑胺

B: 氢氯噻嗪

C: 布美他尼

D: 依他尼酸

答案: A

54. 患者，女，16 岁，近两日因排尿困难就医。经医生询问，患者有尿急、尿频、尿痛、排尿不适、下腹痛等症状，且尿液比平时浑浊且有异味，医生测量体温为 37.4℃，确诊为尿路感染。

- A: 金黄色葡萄球菌
- B: 铜绿假单胞菌
- C: 大肠埃希菌
- D: 白色念珠菌

答案：C

55. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 分泌性腹泻
- B: 感染性腹泻
- C: 消化不良性腹泻
- D: 动力性腹泻

答案：B

56. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，HR108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 支气管哮喘?
- B: 肺动脉栓塞?
- C: 肺结核?

D: 急性左心衰竭?

答案: D

57. 排便在一日内超过 3 次，或粪便中脂肪成分增多，或带有未消化的食物、黏液、脓血者称为腹泻。腹泻是由多种不同病因所致，在应用止泻药治疗的同时，实施对因治疗不可忽视。

A: 黄连素

B: 谷维素

C: 天麻素

D: 磷霉素

答案: A

58. 成人末梢血白细胞(WBC)计数正常参考区间是

A: $(15.0 \sim 20.0) \times$

B: $180 \sim 220 \text{g/L}$

C: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$

D: $170 \sim 200 \text{g/L}$

答案: C

59. (2019 年真题) 患者，男，62 岁，无吸烟饮酒史，患高血压、高脂血症数年，未治疗。半年前就诊，查肝肾功能正常，按医嘱服用阿托伐他汀、氨氯地平。服药一个月后复查肝功能结果显示：AST145U/L，ALT134U/L，排除了其他疾病因素后，停用阿托伐他汀，肝功能逐步恢复正常。一个月后改用普伐他汀，再次出现肝功能异常。肝功能异常的不良反应该与他汀类药物之间的因果关系应评价为

A: 很可能

B: 肯定

C: 可能

D: 可能无关

答案: B

60. 与阿莫西林配伍，可提高治疗的是()

A: 奥美拉唑

B: 叶酸

C: 克拉维酸钾

D: 苄丝肼

答案: C

61. 会引起头晕、心动过缓、低血压，严重者可诱发支气管哮喘

A: β -受体阻断剂

B: 利尿剂

C: 精神刺激剂

D: 蛋白同化激素

答案: A

62. 通过抑制白细胞趋化、吞噬作用及减轻炎性反应而发挥止痛作用的药品是

A: 秋水仙碱

B: 苯溴马隆

C: 别嘌醇

D: 吲哚美辛

答案: A

63. 患者，男，58 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 停用瑞格列奈片
- B: 停用阿托伐他汀钙片
- C: 停用二甲双胍肠溶片
- D: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

答案：C

64. 属于润滑性泻药的是

- A: 乳果糖
- B: 硫酸镁
- C: 开塞露
- D: 番泻叶

答案：C

65. 可能导致 γ -谷氨酰转移酶升高的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 胰岛素
- C: 氯氮平
- D: 苯妥英钠

答案：D

66. 用于铜中毒的解毒剂是

- A: 青霉胺
- B: 乙酰胺
- C: 维生素 K1
- D: 硫酸阿托品

答案：A

67. 增加胃肠蠕动，影响同服药物吸收

- A: 四环素+硫酸亚铁
- B: 多潘立酮+维生素 C
- C: 青霉素+丙磺舒
- D: 西咪替丁+格列本脲

答案：B

68. 以下对"调配处方四查十对"的叙述中，最正确的是

- A: 查处方，对临床诊断
- B: 查临床诊断，对用药合理性
- C: 查配伍禁忌，对药品性状、规格、数量
- D: 查药品，对药名、剂型、规格、数量

答案：D

69. 以下药物中，可用于蛇咬伤中毒解救的是

- A: 胰蛋白酶？
- B: 胃蛋白酶？
- C: 凝血酶？
- D: 门冬酰胺酶？

答案：A

70. IV期临床试验样本数为

- A: 常见病 ≥ 2000 例
- B: 常见病 ≥ 1000 例
- C: 20~30 例
- D: 100~300 例

答案：A

71. 选择合适药物的首要标准是

- A: 药物治疗的方便性
- B: 药物治疗的有效性
- C: 药物治疗的规范性
- D: 药物治疗的安全性

答案：B

72. 以下咨询问题的分类属于用药方法的是

- A: 这次拿的"×××"(商品名)是我以前一直服用的"格列齐特"吗
- B: 中午忘吃药了怎么办
- C: 这种药需要服用多久
- D: 这药能治我这种病吗

答案：B

73. 患者，女，55 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的 NSAID 类药物是

- A: 吲哚美辛
- B: 布洛芬
- C: 双氯芬酸
- D: 塞来昔布

答案：D

74. 过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

- A: 米泔水样便
- B: 稀糊状或水样粪便
- C: 黏液便
- D: 冻状便

答案：D

75. 患者，男，53 岁。因心前区疼痛 6 年，加重伴呼吸困难 10 小时入院。入院前 6 年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

- A: β 受体阻断药、钙拮抗剂、ACEI
- B: ACEI、AR
- C: 硝普钠、利尿药、ACEI
- D: 利尿药、长效二氢吡啶类钙通道阻滞药、ACEI

答案：A

76. 不可震荡的是

- A: 甘露醇注射剂
- B: 乙醚
- C: 重组人促红素
- D: 降钙鼻喷雾剂

答案：C

77. 可引起嗜睡的是

- A: 东莨菪碱
- B: 阿米洛利
- C: 抗过敏药
- D: 右美沙芬

答案：C

78. (2018 年真题) 患者，男，67 岁，慢性哮喘 20 余年，现因哮喘急性发作就诊，首选的药物是 ()

- A: 氨茶碱片

- B: 二羟丙茶碱片
- C: 异丙托溴铵气雾剂
- D: 沙丁胺醇气雾剂

答案: D

79. 下列药物中,可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是()

- A: 口服避孕药
- B: 叶酸
- C: 阿司匹林
- D: 银杏叶片

答案: A

80. 血清丙氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 成人 $<50\text{U/L}$
- B: 成人 $<40\text{U/L}$
- C: 男性 $<40\text{U/L}$
- D: 男性 $11\sim50\text{U/L}$

答案: B

81. 用于治疗溃疡性结肠炎,应多饮水,保持高尿流量,以防结晶尿的发生,必要时服用碳酸氢钠碱化尿液的药物是

- A: 阿卡波糖
- B: 格列吡嗪
- C: 二甲双胍
- D: 西格列汀

答案: B

82. 给予(透析患者)铁剂的依据是

- A: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D
- B: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛
- C: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素
- D: 有助于机体合成红细胞

答案：D

83. 适用于年轻、震颤突出的患者

- A: 苯海索
- B: 恩托卡朋
- C: 司来吉兰
- D: 左旋多巴

答案：A

84. 患者，男，67 岁，患有糖尿病、冠心病、高血压，服用的药物包括二甲双胍、阿卡波糖、美托洛尔、阿司匹林、福辛普利。近期使用优维显（碘普罗胺注射液，一种碘化对比剂）做腹部增强 CT 扫描，须告知患者检查前数日应停用的药物是

- A: 福辛普利
- B: 美托洛尔
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案：D

85. 某患者的肝功能检查结果是：ALT 与 AST 均超过正常值，且 AST / ALT 比值大于 1。此结果提示病人可能患有

- A: 肝硬化
- B: 急性胰腺炎

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 缺铁性贫血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/838017125051007022>