

2025 年山西省阳泉市护士执业资格考试《专业实务》模拟试题及答案解析

毕业院校：_____姓名：_____考场：_____考号：_____

一、选择题

1. 为昏迷患者进行口腔护理时，不需准备的用物是

- A、棉球
- B、吸水管
- C、张口器
- D、压舌板
- E、血管钳

答案：

B

2. 患儿女，9 岁。患有先天性心脏病，应用强心苷类药物治疗，护士对其家长进行有关饮食营养的健康教育时，应强调多给患儿进食

- A、富含钠的食物
- B、富含钾的食物
- C、富含钙的食物

D、富含镁的食物

E、富含铁的食物

答案：

B

3. 患者女，18 岁。因失血性休克给予特级护理，不符合特级护理要求的是

A、严密观察病情变化

B、实施床旁交接班

C、每 2 小时监测生命体征 1 次

D、基础护理由护理人员完成

E、保持患者的舒适和功能体位

答案：

C

4. 慢性阻塞性肺疾病病变的主要部位是

A、气管

B、上呼吸道

C、支气管

D、肺间质

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

E、小细支气管

答案：

E

5. 患者女，41 岁，疑患甲状腺功能亢进，需做甲状腺 I 摄取率测定，护士应该在检查前 2 周禁食

A、海带

B、白菜

C、豆腐

D、土豆

E、西红柿

答案：

A

6. 系统性红斑狼疮的诱因中，不包括

A、紫外线照射

B、精神创伤

C、服用异烟肼

D、高蛋白饮食

E、感染

答案：

D

7. 患者女，32 岁。行剖宫产手术，术后第一天医生告知患者晚上可能拔除尿管，但未开具医嘱，次日晨，护士因未给患者拔除尿管而受到患者及其家属抱怨，护士因此指责该医生，导致这次医护关系冲突的原因是

A、角色心理差位

B、角色理解欠缺

C、角色压力过重

D、角色权利争议

E、角色期望冲突

答案：

E

8. 由厌氧菌所致的蜂窝织炎做创面清洁时，最常用的清洁液是

A、0.1% 碘伏

B、0.2% 过氧化氢

C、外用生理盐水

D、3% 过氧化氢

E、75% 酒精

答案：

D

9. 患者女，54 岁，行痔疮手术后给予热水坐浴，不正确的叙述是

A、坐浴时间 30～45 分钟

B、坐浴后更换敷料

C、坐浴前需排空膀胱

D、浴盆和溶液要求无菌

E、具有消炎，止痛作用

答案：

A

10. 患儿，7 岁，寒性哮喘，服用中药汤剂适宜的方法是

A、温服

B、热服

C、冷服

D、慢服

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

E、急服

答案：

A

11. 为患者翻身时不妥的是

A、手术后患者应先换药再翻身

B、骨牵引的患者翻身时先放松牵引

C、有导管的患者翻身时不能扭曲导管

D、根据病情及皮肤受压情况决定翻身间隔时间

E、体重较重的患者可采用两人翻身

答案：

B

12. 皮内注射法用于药物过敏试验，正确的做法是

A、部位选择上臂三角肌下缘

B、2% 碘酊消毒 1 遍，70% 乙醇脱碘 2 遍

C、进针角度为 25°

D、拔针时勿按压

E、针尖斜面进入真皮下层

答案：

D

13. 在我国引起急性胰腺炎的最常见原因是

A、胆道梗阻

B、暴饮暴食

C、创伤因素

D、高脂血症

E、感染因素

答案：

A

14. 关于医疗机构临床用血的规定，正确的是

A、对同一献血者两次采集间隔不少于 3 个月

B、可将临床多余用血出售给血液制品生产单位

C、必须进行配型检查

D、献血者每次采集血液量一般为 600ml

E、主要动员家庭、亲友为患者献血

答案：

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

C

15. 患儿，2 个月。因腹泻住院，近 2 日臀部皮肤发红，伴有皮疹，护士进行臀部皮肤护理时错误的操作是

A、每次便后用温水洗净

B、洗后用小毛巾吸干水分

C、可用鹅颈灯照射臀部

D、烤灯前涂油

E、灯泡照射时间 15～20 分钟

答案：

D

16. 某护士准备对一间病室进行空气消毒，该病室长、宽、高分别为 5m、4m、3m，拟用纯乳酸，则乳酸的需要量是

A、48ml

B、3.6ml

C、7.2ml

D、100ml

E、17.4ml

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

答案：

C

17. 一级护理患者巡视的时间是

A、半小时

B、1 小时

C、2 小时

D、3 小时

E、随时

答案：

B

18. 患者女，28 岁。停经 40 天，下腹隐痛 2 天，加重 1 天入院。查体：面色苍白，四肢湿冷，体温不升，脉搏 126 次/分，血压 70/50mmHg。此时其最适宜的体位是

A、侧卧位

B、俯卧位

C、中凹卧位

D、半坐卧位

E、去枕仰卧位

答案：

C

19. 患者男，70 岁。2 年前被诊断为焦虑症，常因小事发脾气，护士下列用语不当的是

A、“您能谈谈您的焦虑感受吗？”

B、“请您在我的指导下进行放松。”

C、“您是因为胃炎可能癌变才觉得焦虑吗？”

D、“下面我给您介绍一下焦虑症的性质。”

E、“我们可以想一些办法来缓解身心不适。”

答案：

C

20. 静脉输液引起发热反应的常见原因是输入液体

A、量过多

B、速度过快

C、温度过低

D、时间过长

E、制剂不纯

答案：

E

21. 男孩，8 岁。参加学校的体能训练，为了了解其身体发育情况，对其进行相关指标测量。

按生长发育公式，该年龄儿童的体重是

A、18kg

B、20kg

C、24kg

D、28kg

E、30kg

答案：

C

22. 患者，女性，51 岁。身高 155cm，体重 75kg，因消化性溃疡少量出血入院检查。

进一步检查发现其血胆固醇含量明显高于正常，该患者适宜的食谱是

A、火腿、鱼、菠菜

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

B、咸蛋黄、豆腐、牛肉、青菜

C、青椒炒鸡杂、三黄鸡、豆腐

D、皮蛋豆腐、鲫鱼、青椒炒肉丝

E、土豆炒肉丝、滑炒鱼片、豆腐

答案：

E

23. 患儿女，7 岁。高热 3 天，腮腺肿大 2 天。经查诊断为流行性腮腺炎。其血清特异性抗体增高的是

A、IgA

B、IgD

C、IgE

D、IgG

E、IgM

答案：

E

24. 患者，男性，20 岁。淋雨受凉后出现寒战、高热和咳嗽，咳铁锈色痰，查血及胸部 X 线片示大叶性肺炎，提示可能的致病菌是

A、肺炎链球菌

B、肺炎克雷伯杆菌

C、铜绿假单胞菌

D、支原体

E、厌氧菌

答案：

A

25． 下列护患沟通中，属开放式提问的是（ ）

A、“您今天早上吃过药了吗？”

B、“您为什么不愿意选择手术治疗呢？”

C、“您的学历是本科吧？”

D、“您现在有疼痛的感觉吗？”

E、“您每天运动时间有 1 小时吗？”

答案：

B

26． 患者男，62 岁。吞咽困难一个月余，经检查后确诊食管癌并肝转移。患者哭泣、烦躁。目前该患者的心理反应是

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

A、否认期

B、愤怒期

C、协议期

D、抑郁期

E、接受期

答案：

B

27. 患者，男，19 岁。尿道损伤后出现排尿困难，护士遵医嘱为其置尿管。患者表情紧张问：“会不会很疼呀？”下列回答较妥当的是

A、“放心，一点儿也不疼！”

B、“当然会疼，谁让你受伤了呢！”

C、“不太清楚。”

D、“为了治病，疼也得忍着！”

E、“会有一些疼痛，我会尽量帮你减轻痛苦。”

答案：

E

28. 肝硬化失代偿期最突出的表现是（ ）

A、脾大

B、腹水

C、肝掌

D、贫血

E、出血

答案：

B

29. 关于衰老表现的叙述，正确的是

A、老年人眼睛近视程度随增龄而增加

B、老年人的血压随年龄的增加而降低

C、老年人的心率随年龄的增加而增加

D、老年人的生活自理能力随年龄的增加而降低

E、老年人的体重随年龄的增加而增加

答案：

D

30. 有关“护理程序”概念的解释不妥的是

A、是指导护士工作及解决问题的工作方法

- B、其目标是增进或恢复服务对象的健康
- C、是以系统论为理论框架
- D、是有计划、有决策与反馈功能的过程
- E、是由估计、诊断、计划、实施四个步骤组成

答案：

E

31. 患者，女性，69 岁，有冠心病史 3 年，胸痛 5 小时，诊断急性非 ST 段抬高心肌梗死。用吗啡、硝酸甘油、阿司匹林、低分子肝素等治疗 1 小时后，胸痛仍持续不缓解。查体：血压 110/78mmHg，心率 84 次/分，心脏不大，心律整，查血总胆固醇和低密度脂蛋白偏高。患者入院后的其他处理，正确的是

- A、绝对卧床至少 1 周
- B、加用抗生素预防感染
- C、加用氯吡格雷口服
- D、小剂量溶栓剂维持静滴 1~2 天
- E、硝酸甘油维持静滴 7 天

答案：

C

32. 支气管肺炎患儿停用抗生素的时间是抗生素用至体温正常后

A、1～2 天

B、3～4 天

C、5～7 天

D、8～10 天

E、10～15 天

答案：

C

33. 护士长为今天当班的护士小白、小兰、小于和小柯进行工作的安排，小白是处理医嘱的主班护士，小兰是治疗护士，小于是药疗护士，小柯是生活护理护士。每隔一段时间护士长安排她们进行调换岗位。这种工作方式被称为

A、个案护理

B、功能制护理

C、责任制护理

D、小组护理

E、临床路径

答案：

B

34. 患者女，45 岁。反复不规则发热 6 个月，半个月前出现左下肢酸痛，行走困难，伴胸闷、心悸，被诊断为“亚急性感染性心内膜炎，二尖瓣脱垂伴关闭不全”，建议手术治疗。患者对手术非常担心，适宜的护理措施是

- A、建议患者转院
- B、建议患者签字放弃治疗
- C、向患者介绍手术成功的例子
- D、告知患者手术很简单
- E、告知患者手术已经安排，无法更改

答案：

C

35. 患者女，59 岁。因间断咳嗽、咳痰 5 年，加重伴咯血 2 个月入院。入院后诊断为浸润型肺结核，给予肌注链霉素，口服利福平、异烟肼等治疗。

链霉素治疗的不良反应是

- A、肝脏损害
- B、眩晕、听力障碍
- C、胃肠道刺激
- D、球后视神经炎
- E、周围神经炎

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

答案：

B

36. 患者，女性，45 岁，患慢性肾炎 4 年。近日发现尿量减少，晨起眼睑肿胀，内生肌酐清除率为每分钟 35ml 。

内生肌酐清除率试验结果提示

A、肾衰竭

B、肾功能轻度损害

C、肾功能中度损害

D、肾功能重度损害

E、急性肾功能不全

答案：

C

37. 患者出现深昏迷，脑干反射消失，脑电波消失，无自主呼吸，属于

A、疾病晚期

B、脑死亡

C、濒死期

D、临床死亡期

E、生物学死亡期

答案：

B

38. 患者，男性，22 岁。骑车时与人相撞，会阴部骑在车梁上，自述伤后会阴部剧痛。约 20 分钟后尿道外口滴血，不能自行排尿，急诊就医。体检：面色苍白，心率 100 次 / 分，血压 100 / 60mmHg，呼吸急促；会阴部皮下淤血，尿道外口滴血；导尿管不能插入膀胱。血常规和下腹部 X 线平片未见异常。

受伤的类型是

A、撞伤

B、剪应力伤

C、骑跨伤

D、牵拉伤

E、骨刺切割伤

答案：

C

39. 患者男，54 岁。因上腹部钝痛，伴腹胀，反酸，暖气半年，近期出现消瘦，乏力入院。

护士应告知患者留便的时间为入院后

不飞则已，一飞冲天；一鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

A、第 1 天

B、第 2 天

C、第 3 天

D、第 4 天

E、第 5 天

答案：

C

40. 患者，女性，40 岁。因减肥过度造成严重营养不良。遵医嘱行深静脉输注全营养混合液。护士为患者行锁骨下静脉置管，应该警惕最严重的并发症是

A、气胸

B、血胸

C、神经损伤

D、血管损伤

E、空气栓塞

答案：

E

41. 患者，男性，30 岁，全身水肿 4 周。实验室检查：血浆白蛋白 22g/L，尿量 800ml/天，尿蛋白 5g/24 小时，尿红细胞(+)。患者水肿最主要的原因是

A、摄入盐分过多

B、抗利尿激素分泌过多

C、血管通透性下降

D、肾小球滤过率下降

E、血浆胶体渗透压下降

答案：

E

42. 患者，男性，36 岁，输液后沿静脉走行出现条索状红线、肿胀、疼痛，若用乙醇热湿敷宜选用的浓度是

A、10%

B、20%

C、45%

D、75%

E、95%

答案：

E

43. 患者女，55 岁。因急性有机磷农药中毒到急诊科进行抢救，经过洗胃等抢救，现患者病情稳定。护士在抢救结束后要及时据实补记抢救记录和护理病历，时间为

A、2 小时内

B、3 小时内

C、6 小时内

D、8 小时内

E、9 小时内

答案：

C

44. 患者，女性，37 岁。因肠粘连并肠梗阻需行手术治疗，患者的丈夫、父母、哥哥及 10 岁的儿子都到了医院。医务人员介绍完手术的重要性及风险后，要求签订手术协议书，签订人应首选

A、患者本人

B、患者的父母

C、患者的丈夫

D、患者的哥哥

E、患者的儿子

答案：

A

45．治疗厌氧菌感染的急性盆腔炎时需使用的抗生素是

A、四环素

B、甲硝唑

C、万古霉素

D、克拉霉素

E、阿奇霉素

答案：

B

46．患者，男，30 岁，饱餐后突发上腹持续性疼痛 4 小时，体检全腹有压痛，腹肌紧张，肝浊音界消失。对其诊断最有价值的检查是（ ）

A、血常规检查

B、腹部 CT 检查

C、立位腹部平片

D、血淀粉酶测定

E、纤维胃镜检查

答案：

C

47. 初产妇，妊娠 40 周，分娩过程中发现产程延长，行阴道检查发现宫口开大 6cm，胎位为 ROT，羊水清澈，胎心率无异常，孕妇继续试产过程中，错误的心理护理措施是

- A、医护人员处理产程时，为避免加重孕妇家属负担，分娩结束后再做相关解释
- B、及时回答孕妇及家属提出的疑问，尽量给予充分的解释
- C、可跟孕妇讨论育儿方面的知识或其他孕妇感兴趣的话题
- D、轻柔按摩孕妇腹部，以亲切的态度与孕妇交谈
- E、鼓励孕妇，增强信心

答案：

A

48. 医疗卫生法规的制定原则不正确的是

- A、预防为主原则
- B、公平原则
- C、保护医护人员原则
- D、以患者为主原则

E、促进健康原则

答案：

C

49. 患者，女性，40 岁，遵医嘱欲做中段尿细菌培养及药敏试验，护士对其做如下采集标本的指导，其中不正确的是

A、采集前清洁外阴，苯扎溴铵消毒尿道口

B、弃去前段尿液

C、尿液排尽前停止采集尿液

D、将尿液排到清洁干燥容器内

E、标本立即送检

答案：

D

50. 患者，男性，70 岁。脑血管意外后遗症，长期卧床，自理困难。今晨护理发现患者骶尾部皮肤发红，除去压力无法恢复正常肤色。根据病情，护士拟采取的护理措施应除外

A、加强晨晚间护理，增加背部按摩次数

B、每 2 小时变换体位 1 次

C、3% 过氧化氢冲洗

D、蘸 50% 乙醇按摩发红皮肤

E、酌情给予抗生素治疗

答案：

C

51. 初产妇，26 岁，产后发热 3 天，汗多伴下腹阵痛。查体：体温 37.5℃，子宫底脐下 3 指，无压痛，会阴伤口无肿胀及压痛，恶露暗红、有腥味，双乳胀、有硬结。

护士向该产妇解释发热的原因是

A、会阴伤口感染

B、乳汁淤积

C、急性乳腺炎

D、产褥感染

E、尿路感染

答案：

B

52. 患者，女性，77 岁，每当咳嗽等腹压增加时，尿液不随意地流出，此种尿失禁属于

A、充溢性

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

B、压力性

C、急迫性

D、真性

E、假性

答案：

B

53. 对血糖在正常范围者没有降血糖作用的药物是

A、胰岛素

B、格列本脲（优降糖）

C、格列吡嗪

D、格列喹酮

E、二甲双胍

答案：

E

54. 用已经制订的目标为依据来检查和评价目标完成情况的管理方法称为

A、过程管理

B、人员管理

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

C、统筹管理

D、目标管理

E、时间管理

答案：

D

55．医用滑石粉灭菌可采用的方法

A、压力蒸汽灭菌

B、煮沸消毒法

C、燃烧法

D、干烤法

E、电离辐射灭菌法

答案：

D

56．护士在与一位高血压患者交谈中，当患者说道：“我今天早上起床后感觉不舒服，头痛、头晕。”护士问道：“您刚才说您早上起床后头痛、头晕吗？”此护士主要运用了交谈技巧中的

A、倾听

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

B、核实

C、阐释

D、鼓励

E、提问

答案：

D

57. 患者女，36 岁。急性淋巴细胞白血病。医嘱浓缩红细胞 1U 和血小板 1U 输注。

在首先输注浓缩红细胞过程中患者出现全身皮肤瘙痒伴颈部、前胸出现荨麻疹。

护士在执行输注血小板的过程中，错误的是

A、采用双人核对法

B、输注前轻摇血袋

C、直接缓慢输注血小板

D、血液内不能加入其他药物

E、记录输注时间及血型、血量

答案：

C

58. 患儿，11 个月，10kg。因惊厥需用地西洋 2mg（1ml 含 10mg 地西洋）。护士应抽药液的剂量是

A、0.2ml

B、0.4ml

C、0.6ml

D、0.8ml

E、1ml

答案：

A

59. 患者，女性，40 岁，车祸致颅骨骨折，需行颅骨牵引。

护士应为患者安置的卧位是

A、仰卧位

B、俯卧位

C、头高足低位

D、健侧卧位

E、膝胸位

答案：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/838020015133007023>