# 2024年海南省昌江黎族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库【培优A卷】

## 第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.下列可增强华法林抗凝作用的药物是

A：阿司匹林

B：维生素K

C：苯巴比妥

D：雌激素

**答案：A**

2.患者，女，28岁，妊娠6个月，出现轻度外阴烧灼感、尿痛、尿急，就医后确诊为滴虫性阴道炎合并尿路感染，首选用药方案是

A：1：2服克林霉素300mg，每日2次，连用7日

B：咪康唑栓，阴道给药，每晚1粒（200mg），连用7日

C：口服甲硝唑400mg，每日2次，连服7日

D：甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚1次.连用7日

**答案：C**

3.痛风患者急性关节炎期间常见单个关节出现红、肿、热、痛，最常见的病变部位是

A：胸椎关节

B：颈椎关节

C：第一跖趾关节

D：腰椎关节

**答案：C**

4.1g葡萄糖可提供机体的能量是

A: 4kcal

B: 1kcal

C: 3kcal

D: 2kcal

**答案：A**

5.（2019年真题）患者，男，56岁，因出现面色苍白、乏力、肢体麻木、共济失调等症状就诊，查体:舌面光滑，呈“牛肉样舌”。化验结果提示血清叶酸和维生素B12水平下降，下列药物中不会影响维生素B12吸收的是

A: 氨氯地平

B: 二甲双胍

C: 对氨基水杨酸

D: 奥美拉唑

**答案：A**

6.处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要用颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

A: 临床诊断书

B: 病区领药单

C: 药品出库单

D: 病区用药医嘱单

**答案：D**

7.（2016年真题）患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是（）。

A：酮康唑软膏

B：复方苯甲酸软膏

C：联苯苄唑软膏

D：氢化可的松软膏

**答案：D**

8.能促使体格强壮、肌肉发达、增强爆发力，并缩短体力恢复时间的兴奋剂

A：蛋白同化激素

B：利尿剂

C：精神刺激剂

D：β-受体阻断剂

**答案：C**

9.适用于阿司匹林哮喘和伴有过敏性鼻炎哮喘患者预防和维护治疗的药物是

A：茶碱片

B：沙丁胺醇气雾剂

C：孟鲁司特钠咀嚼片

D：异丙托溴铵气雾剂

**答案：C**

10.如不良反应已经好转，后患者又死于原患疾病或与此不良反应无关的并发症，ADR报告表此栏应填“好转”；所对应的项目是

A：ADR／ADE过程描述

B：用药起止时间

C：用药原因

D：不良反应/事件的结果

**答案：D**

11.（2017年真题）用于评估癌痛患者疼痛程度的是（）

A：数字评分法

B：CTP评分标准

C：APACHE评分系统

D：Cochrane证据分级

**答案：A**

12.PDR是由美国医学经济公司和ThomsonHealthcare公司编辑出版的药品集，每年综合汇编1册，主要介绍

A：各国市场上的常用处方药

B：美国市场上的药品

C：美国临床常用的药品

D：美国市场上的常用处方药

**答案：D**

13.大量或长期使用抗生素可能导致

A：血清总胆固醇升高

B：血白细胞减少

C：血清血红蛋白升高

D：粪便细胞显微镜检查检出真菌

**答案：D**

14.审核处方的合法性、规范性与用药的适宜性，归属于

A: 处方点评
B: 治疗药物监测
C: 处方审核
D: 静脉药物配置
**答案：C**

15.临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径
A: 静脉滴注给药
B: 每日给药1次
C: 每2～3个半衰期给药1次
D: 每个半衰期给药1次
**答案：B**

16.在药物信息服务中，三级信息资料最突出的优势是
A: 能看到研究细节如实验设计方法、数据统计分析等
B: 提供的信息丰富、详实
C: 内容全面、细致
D: 内容广泛、使用方便
**答案：D**

17.关于透析患者使用磷结合剂的下列叙述错误的是
A: 透析患者服用磷结合剂的钙剂目的是为了补钙
B: 透析患者服用钙剂的量大时易出现高钙血症
C: 高磷血症会导致心脏、血管的钙化
D: 透析患者服用钙剂必须在进食的同时服用
**答案：A**

18.流行性出血性结膜炎可选用

A：0.1%羟苄唑滴眼剂

B：0.1%碘苷滴眼剂

C：四环素眼膏

D：2%色甘酸钠滴眼剂

**答案：A**

19.（2016年真题）患者，女，62岁，患有2型糖尿病，平时未规律监测血糖，今日来院复诊，欲了解近三个月的血糖总体控制情况，应检测的指标是（）。

A：餐后2小时血糖

B：血红蛋白

C：空腹血糖

D：糖化血红蛋白

**答案：D**

20.长期、大量使用可对肝脏造成不可逆性损伤的药物是

A：对乙酰氨基酚

B：阿司匹林

C：布洛芬

D：塞来昔布

**答案：A**

21.男性红细胞沉降率的正常范围值

A：0～10mm/h

B：0～15mm/h

C：0～5mm/h

D：0～20mm/h

**答案：B**

22.男性，45岁。反复发生夜间呼吸困难1个月，加重一天就诊，体格检查：血压180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率130次/分。

A: 双肺炎症还是肺间质纤维化

B: 肺心病还是冠心病

C: 支气管哮喘还是心源性哮喘

D: 慢性支气管炎还是急性支气管炎

**答案：C**

23.以下所列病症中，依据"血淀粉酶超过正常值"可以诊断的是

A: 高脂血症

B: 高血压

C: 肾病综合征

D: 急性胰腺炎

**答案：D**

24.消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

A: 乳腺癌、机械性肠梗阻患者禁用多潘立酮

B: 过量的干酵母和乳酶生可以引起腹泻

C: 微生态制剂不可用于消化不良的治疗

D: 胰酶片必须用肠溶衣片，口服时不可嚼碎，应整片吞下

**答案：C**

25.融合抑制剂

A: 利巴韦林

B: 齐多夫定

C：利托那韦

D：依非韦伦

**答案：A**

26.患者女45岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片20mgbid，甲硝唑片0.4gbid，克拉霉素片50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊0.6gbid。

A：枸橼酸铋钾胶囊

B：甲硝唑片

C：克拉霉素片

D：埃索美拉唑镁肠溶片

**答案：C**

27.哺乳期妇女应用后可使乳儿出现易激惹、尖叫、惊厥等神经系统症状，男婴则出现乳房增大的药物是

A：四环素

B：卡托普利

C：含雌、孕激素的避孕药

D：喹诺酮类药物

**答案：C**

28.治疗干眼症人工泪液合理的起始应用剂量是每只眼

A：二滴，一日4次

B：三滴，一日4次

C：一滴，一日2次

D：一滴，一日4次

**答案：D**

29.患者,女,31岁,因丙型病毒性肝炎使用∝干扰素联合利巴韦林治疗。下列关于用药期间避孕和备孕措施的说法,正确的是()

A: 干扰素、利巴韦林较为安全,停药后即可备孕

B: 干扰素、利巴韦林较为安全,停药3个月后可备孕

C: 干扰素、利巴韦林较为安全,不必停药,即可备孕

D: 干扰素、利巴韦林易引起畸胎或者胚胎致死效应,治疗期间和治疗后6个月内,必须采取避孕措施

**答案：D**

30.枸橼酸铋钾所致的主要不良反应是

A: 皮炎

B: 性功能减退

C: 腹痛

D: 神经毒性

**答案：D**

31.解救氰化物中毒的是

A: 亚硝酸异戊酯

B: 二巯丁二钠

C: 盐酸戊乙奎醚

D: 单价抗毒血清

**答案：A**

32.患者，男，58岁,有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊,开具药品如下:

A: 用药期间，应关注腹痛、柏油样便或呕血等消化道出血症状

B：阿司匹林肠溶片在进餐时服用，以减轻对胃肠道的刺激性

C：阿司匹林属于冠心病-级预防，长期使用方可获益

D：阿可匹林用药期间，需定期监测INR

**答案：A**

33.患者，男，68岁，肺癌晚期，平日清晨、晚间8点使用吗啡缓释片控制疼痛。目前出现暴发性疼痛，应采取的治疗措施是

A：即刻加用吗啡缓释片一次

B：即刻加用吗啡片一次

C：即刻加用可待因片一次

D：即刻加用芬太尼透皮贴剂

**答案：B**

34.在中国，具有"规范处方行为和指导合理用药的法规性和专业性文件"属性的药物专著是

A：中国国家处方集

B：中国药学文摘

C：新编药物学

D：国家基本药物处方集

**答案：A**

35.非霍奇金淋巴瘤的CHOP方案中不包括的治疗药物是

A：阿霉素

B：利妥昔单抗

C：长春新碱

D：环磷酰胺

**答案：B**

36.苯妥英、地塞米松、地西泮在妊娠26～29周时游离药物达高峰，是由于

A：血容量增加使血浆白蛋白浓度降低

B：激素分泌改变，药物代谢也受影响

C：胃肠活动减弱，使吸收减慢

D：妊娠晚期血流动力学发生改变

**答案：A**

37.因耐药率高而很少单独使用的肺炎治疗药物是

A：青霉素

B：克拉霉素

C：左氧氟沙星

D：亚胺培南

**答案：B**

38.二氢吡啶类钙通道阻滞药硝苯地平引起的主要不良反应是

A：多毛症

B：低钾血症

C：高钾血症

D：水肿

**答案：D**

39.患者，男，80岁，患有高血压、2型糖尿病、前列腺增生，近日出现暂时性尿失禁症状，怀疑与其服用的药物有关。复核其使用的药物，可能造成其尿失禁的药物是()

A：二甲双胍

B：非那雄胺

C：依那普利

D: 珍菊降压片(含氢氯噻嗪)

**答案：D**

40.静脉给药用于重度及危重度哮喘治疗的药品是

A: 氨茶碱

B: 噻托溴铵

C: 异丙托溴铵

D: 孟鲁司特

**答案：A**

41.解救经口急性铅中毒的洗胃液是

A: 1%氯化钠

B: 1%硫酸铜

C: 1%硫酸镁

D: 3%过氧化氢

**答案：C**

42.上市前药物临床评价阶段的临床试验分为

A: 3期

B: 2期

C: 4期

D: 1期

**答案：A**

43.(毒物及药物中毒解救)，烯丙吗啡用于解救

A: 水银中毒

B: 吗啡中毒

C: 氰化物中毒

D: 有机磷中毒

**答案：B**

44.用于铜中毒的解毒剂是

A: 硫酸阿托品

B: 维生素K1

C: 乙酰胺

D: 青霉胺

**答案：D**

45.长期高磷血症会导致心脏、血管钙化，腹膜透析者必须在进食的同时服用的药物是

A: 磷结合剂

B: 磷化物

C: 钙结合剂

D: 铁剂

**答案：A**

46.预激综合征伴房颤患者，控制心室率时须慎用的药物为

A: 胺碘酮

B: 利伐沙班

C: 去乙酰毛花苷

D: 硝苯地平

**答案：C**

47.开具新药或增加药物前需考虑患者总体情况和药物相互作用，是指

A: 修订医嘱及时沟通

B: 医嘱清楚准确

C: 医嘱完整不漏项

D: 实现个体化治疗

**答案：D**

48.口服或静滴艾司洛尔用于解救

A: 瘦肉精中毒

B: 氰化氢中毒

C: 有机磷杀虫药中毒

D: 氟乙酰胺中毒

**答案：A**

49.服用抗利尿药时

A: 宜多饮水

B: 忌用热水送服

C: 宜少饮水

D: 禁吸烟

**答案：C**

50.患者,女67岁出现认知功能障碍5年,诊断为阿尔茨海默病,予以美金刚治疗。下列药物中,可增加美金刚血药浓度的是（）

A: CYP3A4制剂

B: CYP2D6抑制剂

C: 氯化铵

D: 碳酸氢钠

**答案：D**

51.苯丙胺中毒的临床表现是（）

A: 明显的锥体外系症状

B：心血管毒性

C：肌肉震颤、抽搐

D：谵妄、躁狂、幻觉

**答案：D**

52.(常用的特殊解毒剂的适应证)，对乙酰氨基酚过量的特殊解毒剂

A：纳洛酮

B：二巯丁二钠

C：谷胱甘肽

D：乙酰半胱氨酸

**答案：D**

53.餐前服用，可以充分附着于胃壁粘膜的药品是

A：复方铝酸铋片

B：瑞舒伐他汀片

C：甲氧氯普胺片

D：二甲双胍片

**答案：A**

54.酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之对中枢神经出现抑制，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加发生不良反应的几率。

A：血压升高

B：血糖不降

C：低血糖反应

D：过敏反应

**答案：C**

55.“冷处”所指温度范围是

A：2℃～10℃

B：-5℃～10℃

C：2℃～4℃

D：10℃～30℃

**答案：A**

56.欲了解更多的药品不良反应信息，可优先查阅的文献是

A：《新编药物学》

B：《梅氏药物副作用》

C：《中国国家处方集》

D：《中华人民共和国药典》

**答案：B**

57.处方外文缩写OU代表()

A：左眼

B：双眼

C：右耳

D：左耳

**答案：B**

58.有关药学服务的叙述，正确的是

A：药学服务涵盖了患者用药相关的全部需求，但不包括对公众的健康教育

B：用药周期长的慢性病患者属于药学服务的重要人群

C：药学服务的社会属性仅限服务于治疗性药物

D：药学服务只涉及更高层次的临床实践，不包括处方调剂、药品检验、药品供应

**答案：B**

59.选择性5-羟色胺再摄取抑制剂

A：艾司唑仑

B：阿米替林

C：舍曲林

D：丁螺环酮

**答案：C**

60.（2017年真题）可能影响儿童骨骼发育的药物是（）

A：复方磺胺甲噁唑

B：阿莫西林

C：诺氟沙星

D：头孢克洛

**答案：C**

61.(有关物质中毒的特效解毒剂)，有机氟中毒的特效解毒剂是

A：氯解磷定

B：烯丙吗啡

C：维生素K

D：乙酰胺

**答案：D**

62.处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

A：无正当理由过度治疗用药

B：有禁忌证用药

C：无正当理由超适应证用药

D：无适应证用药

**答案：C**

63.（2016年真题）患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗结核药后，导致患者隐形眼镜染色的药物是（）。

A：利福平

B：吡嗪酰胺

C：异烟肼

D：乙胺丁醇

**答案：A**

64.(用药与尿液检查异常)甲氨蝶呤可能引起

A：尿液pH增高

B：尿蛋白

C：尿胆红素

D：尿液隐血

**答案：B**

65.不能用热水送服的药物是

A：磺胺类药物

B：胃黏膜保护剂

C：镇静催眠药

D：微生态制剂

**答案：D**

66.患者,男,52岁支气管哮喘病史10年。因间断喘息发作,长期自行服用泼尼松片20mgq

A: 该患者可能出现的不良反应中,不包括的是（）

B: 骨质疏松

C: 低血压

D: 消化性溃疡

**答案：A**

67.下尿路感染的最突出的表现是

A: 发热

B: 伴明显的腰痛

C: 膀胱刺激征

D: 肾区叩击痛

**答案：C**

68.适用于已切除子宫的妇女()

A: 单纯雌激素补充治疗

B: 雌孕激素连续联合用药

C: 单纯孕激素补充治疗

D: 雌孕激素序贯用药

**答案：A**

69.鼻窦炎的急性期应尽早采用足量的何种药物治疗

A: 局部血管收缩剂

B: 抗过敏药

C: 抗菌药

D: 解热镇痛药

**答案：C**

70.孕妇服用过量可诱发新生儿产生坏血病的药品是

A: 维生素AD复方制剂

B: 维生素A片

C: 复合维生素B片

D: 维生素C片

**答案：D**

71.（2018年真题）患者,男,57岁,化验结果:TC4.6mmol/L（参考值＜5.2mmol/L）,TG11.0mmol/L（参考值0.56——1.70mmol/L）尿酸508umol/L（参考值＜420umol/L）,应首选的调脂药物为（）

A: 非诺贝特

B: 考来烯胺

C: 烟酸

D: 依折麦布

**答案：A**

72.治疗轻症、慢性疾病用药持久，最适宜选用的给药途径是

A: 口服给药

B: 直肠给药

C: 舌下含服

D: 吸入给药

**答案：A**

73.血管扩张剂、α受体阻滞剂、抗抑郁药等可能会诱发或加重的反应是

A: β受体阻滞剂普萘洛尔等减慢心率的作用亦钝化

B: 肝脏合成凝血因子能力下降，对肝素及华法林非常敏感

C：心血管系统与维持水电解质平衡的内环境稳定功能减弱，易发生体位性低血压

D：对异丙肾上腺素的敏感性降低

**答案：C**

74.无吞噬功能，但细胞颗粒中含有许多生物活性物质如肝素、组胺、慢反应物质等的细胞为

A：嗜碱性粒细胞

B：嗜酸性粒细胞

C：中性粒细胞

D：淋巴细胞

**答案：A**

75.患者，男，48岁，患有青光眼3年。今日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗，应告知该患者用药后需漱口的药物是()

A：孟鲁斯特纳咀嚼片

B：布地奈德混悬液

C：沙丁胺醇气雾剂

D：多索茶碱注射液

**答案：B**

76.《中华人民共和国药典》、国家食品药品监督管理总局颁布标准收载的处方属于

A：医师处方?

B：急诊处方?

C：法定处方?

D：普通处方?

**答案：C**

77.（2016年真题）患者，女，64岁，患2型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片0.5gtidpo，瑞格列奈片1mgtidpo，阿托伐他汀钙片20mgqdpo等药物治疗。

A: 停用二甲双胍肠溶片

B: 停用阿托伐他汀钙片

C: 停用瑞格列奈片

D: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

**答案：B**

78.患者，女，55岁，诊断为混合型血脂异常，需联合应用他汀类和贝特类，最佳的给药方法是

A: 晚上联合服用他汀类和贝特类

B: 早晨服用贝特类，晚上服用他汀类

C: 早晨服用他汀类，晚上服用贝特类

D: 早晚联合服用他汀和贝特类

**答案：B**

79.应在每日的同一时间服用并且不能有一日间断，仅数小时的给药间隔变化也会降低避孕效果的药物是

A: 口服低剂量孕激素避孕药

B: 探亲避孕药

C: 甲地孕酮硅胶环

D: 长效复方口服避孕药

**答案：A**

80.可引起嗜酸性粒细胞减少的药物不包括

A：头孢氨苄

B：坎地沙坦

C：甲基多巴

D：氢化可的松

**答案：A**

81.肝肾两种途径清除的药物在严重肝功能减退时血药浓度升高

A：尽可能避免使用

B：必须减量应用

C：一般无须调整剂量

D：须谨慎使用，必要时减量给药

**答案：B**

82.禁止与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括

A：苯二氮

B：三环类药物

C：选择性5-羟色胺再摄取抑制剂

D：5-HT

**答案：A**

83.患者，男，72岁，既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。1个月前因出现哮喘症状就诊。医师处方：布地奈德气雾剂200μgbid吸入，沙丁胺醇气雾剂100pgpm吸入，氨氯地平片5mgqd口服及硝酸甘油片0.5mgpm舌下含服。

A：维拉帕米

B：普萘洛尔

C：非洛地平

D：缬沙坦

**答案：D**

84.复方樟脑酊中毒时，宜首选的特殊解毒剂为

A：氟马西尼

B：硫酸铜

C：纳洛酮

D：碳酸氢钠

**答案：C**

85.钙制剂

A：骨吸收抑制剂

B：促进骨矿化剂

C：激素替代剂

D：骨形成刺激剂

**答案：B**

86.非甾体抗炎药的典型不良反应是

A：肝毒性

B：胃肠道刺激出血

C：血液系统毒性

D：肾毒性

**答案：B**

87.老年人服用可能出现锥体外系反应的药物是

A：苯二氮革类药

B：双嘧达莫

C：哌替啶

D: 甲氧氯普胺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/838031006044007022