

颞肌贴敷术术后 护理



目 录

- 颞肌贴敷术简介
- 颞肌贴敷术术后护理的重要性
- 颞肌贴敷术术后护理的要点
- 颞肌贴敷术术后并发症的预防与处理
- 颞肌贴敷术术后护理的注意事项

01


CATALOGUE

颞肌贴敷术简介

颞肌贴敷术的定义

颞肌贴敷术是一种治疗颞下颌关节紊乱疾病的手术方法，通过将生物材料贴敷于颞肌表面，达到缓解疼痛、改善关节功能的目的。

颞肌贴敷术通常在全麻或局麻下进行，手术时间较短，术后恢复较快。





颞肌贴敷术的适应症

颞下颌关节紊乱疾病

颞肌贴敷术适用于治疗颞下颌关节紊乱疾病，如颞下颌关节疼痛、张口受限等。

其他相关疾病

颞肌贴敷术还可用于治疗与颞下颌关节紊乱疾病相关的其他疾病，如头痛、颈痛等。





颞肌贴敷术的禁忌症

颞下颌关节骨性强硬

颞肌贴敷术不适用于颞下颌关节骨性强硬的患者，因为生物材料无法贴敷于骨面上。



其他相关疾病

严重心、肝、肾疾病等全身情况差的患者不宜进行颞肌贴敷术。

颞下颌关节肿瘤

颞肌贴敷术不适用于颞下颌关节肿瘤的患者，因为手术可能会刺激肿瘤或导致肿瘤扩散。



02

CATALOGUE

颞肌贴敷术术后护理的重要性

预防感染

01



保持伤口清洁



术后定期清洁伤口，避免灰尘、污垢等污染物接触伤口，以降低感染风险。

02



避免触碰伤口



术后避免用手触碰伤口，以免将细菌带到伤口处，引发感染。

03



遵医嘱使用抗生素



根据医生建议，使用适当的抗生素，预防感染。



促进伤口愈合

保持充足营养

术后保证摄入足够的蛋白质、维生素和矿物质，以促进伤口愈合。



避免剧烈运动

术后避免剧烈运动，以免牵拉伤口，影响愈合。




定期换药

按照医生指示，定期更换敷料，保持伤口干燥、清洁，促进愈合。



减轻术后疼痛



冰敷缓解疼痛

术后初期，可以采用冰敷的方法缓解疼痛和肿胀。



口服止痛药

根据医生建议，适当使用口服止痛药，缓解术后疼痛。



放松心情

保持心情舒畅，有助于减轻术后疼痛和焦虑。

03

CATALOGUE

颞肌贴敷术术后护理的要点



伤口清洁与消毒



保持伤口清洁

术后应定期清洁伤口，使用生理盐水或温开水轻轻擦拭伤口周围的皮肤，避免使用酒精或碘伏等刺激性消毒剂。




定期消毒

在清洁伤口后，应使用碘伏或酒精对伤口进行消毒，以预防感染。消毒时应遵循无菌操作原则，避免交叉感染。



敷料的更换与处理



敷料的更换

根据医生建议定期更换敷料，一般建议在术后2-3天更换一次。更换敷料时应观察伤口情况，如发现异常应及时就医。

敷料的处理

敷料应选择透气性好、无菌的材质，避免使用胶布或绷带等对皮肤有刺激的物品。如发现敷料松脱或移位，应及时调整。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/838043035001006053>