
2024年最新卫生应急队伍准入理论考核试题及答案

卫生应急队伍准入理论考核试题

一、单选题

1、脑挫裂伤意识障碍下列哪项不正确（）[单选题]*

A、程度和持续时间与脑挫裂伤部位相关

B、中间清醒期是其特征 ✓

C、多在半小时以上

D、伤后立即出现

E、程度和持续时间与脑挫裂伤程度相关

2、肱骨髁上骨折并发正中神经损伤，会发生下列哪种畸形（）[单选题]*

A、杵状指

B、垂腕

C、猿手畸形 ✓

D、银叉畸形

E、枪刺刀畸形

3、男性，20岁，枕部外伤2小时来院就诊。X线平片示枕骨骨折，行CT检查时突然呼吸停止，昏迷，双瞳等大。此时病人最可能出现的情况是（）[单选题]*

A、休克

B、原发性脑干损伤

C、小脑幕切迹疝

D、脑挫伤

E、枕骨大孔疝 ✓

4、一工人上班骑自行车不慎跌倒，右颞部着地，当时昏迷达20分钟，醒后轻微头痛，四肢活动自如，次日感头痛加重，呕吐数次，伴嗜睡，来院就诊。首选何种检查（）[单选题]*

A、头颅CT ✓

B、头颅MRI

C、脑血管造影

D、脑池造影

E、腰穿检查

5、成年女性，左手掌切割伤2小时，检查示指可主动屈伸，固定示指中节，远侧指间关节无屈曲运动，最可能的诊断是（）[单选题]*

A、示指伸指肌腱断裂

B、示指远侧指间关节损伤

C、示指屈指浅肌腱断裂

D、示指屈指深肌腱断裂 ✓

E、示指屈指深浅肌腱均断裂

6、成年男性，车祸伤后10分钟，急救医师到现场后发现左股部伤口有大量鲜血涌出，此时最先应检查的是：（ ） [单选题]*

- A、触诊足背和胫后动脉 ✓
- B、检查肢体感觉
- C、检查膝腱或跟腱反射
- D、足部主动活动有无缺失
- E、骨盆是否存在功能障碍

7、胸部冲击伤最严重的并发症是：（ ） [单选题]*

- A、血胸
- B、气胸
- C、ARDS ✓
- D、肺不张
- E、肺破裂

8、成人胸外心脏按压，下列哪项正确（ ） [单选题]*

- A、按压部位在双乳头连线中点 ✓
- B、按压时以使胸廓下陷4cm为度
- C、应用冲击式猛压，下压时间与放松时间比为2：1
- D、放松时手掌根离开胸骨
- E、按压频率<100次/min

-
- 9、有关骨折急救处理，下列哪项错误（）[单选题]*
- A、首先应止血及包扎伤口
 - B、无夹板时，可用树枝、木棍（板）、步枪等作临时固定支架
 - C、可将伤员上肢缚于胸壁侧面，下肢两腿绑在一起固定
 - D、脊椎骨折患者可采取手法复位
 - E、搬动脊椎骨折患者时，应采取一人抱肩，一人抬腿的方法 ✓
- 10、判断胸外心脏按压是否有效最简便可靠的方法是（）[单选题]*
- A、触及大动脉搏动 ✓
 - B、观察皮肤颜色
 - C、观察尿量变化
 - D、观察瞳孔
 - E、观察神志
- 11、单位发现突发事件，向当地人民政府报告的时限为（）[单选题]*
- A、0.5小时内
 - B、1小时内
 - C、2小时内 ✓

D、3小时内

E、4小时内

12、严重创伤性休克后，首先应预防的是：（）[单选题]*

A、感染 ✓

B、输血并发症

C、急性心力衰竭

D、肠麻痹

E、急性呼吸窘迫综合征

13、自动电除颤（AED）的操作方法正确的是（）[单选题]*

A、接通电源-安放电极-分析心律-充电-电击除颤

B、安放电极-接通电源-分析心律-电击除颤

C、安放电极-接通电源-分析心律-充电-电击除颤

D、接通电源-安放电极-分析心律-电击除颤 ✓

E、安放电极-分析心律-接通电源-电击除颤

14、下列那一项不符合院前急救的特点（）[单选题]*

A、社会性及随机性强

B、急救环境差

C、紧急性和流动性大

D、先明确诊断后再开始治疗 ✓

E、病种多样且复杂

15、开放性气胸的现场急救为（）[单选题]*

A、立即给氧、输液

B、胸膜腔穿刺抽气

C、清创术

D、立即用清洁物品封闭伤口 ✓

E、镇静，注射止痛药

16、多根多处肋骨骨折，因反常呼吸导致呼吸困难时，主要措施是（）[单选题]*

A、肋间神经阻滞

B、骨折处局部封闭

C、胸膜腔闭式引流

D、使用呼吸兴奋剂

E、固定胸壁 ✓

17、判断腹腔内空腔脏器损伤最有价值的是（）[单选题]*

A、腹膜刺激征

B、脉率增快

C、呕血

D、气腹 ✓

E、腹胀

18、损伤的现场急救不包括（）[单选题]*

A、内脏复位 ✓

B、控制外出血

C、心肺复苏

D、骨折固定

E、解救窒息

19、头皮裂伤清创的最佳时限最迟应在（）[单选题]*

A、8小时内

B、12小时内

C、24小时内 ✓

D、48小时内

E、72小时内

20、从高空坠落，左枕着地，伤后进行性意识障碍，右侧瞳孔逐渐散大，诊断上首先考虑为（）[单选题]*

A、右侧顶枕部急性硬膜下血肿

B、左侧顶枕部急性硬膜下血肿

C、右侧额颞部挫伤伴急性硬膜下血肿 ✓

D、左侧额颞部挫伤伴急性硬膜下血肿

E、右侧颅后窝小脑血肿

21、Colles骨折远端的典型移位是（）[单选题]*

A、向尺侧及背侧移位

B、向桡侧及背侧移位 ✓

C、向尺侧及掌侧移位

D、向桡侧及掌侧移位

E、向背侧成角移位

22、骨盆骨折最危险的并发症是（）[单选题]*

A、盆腔内出血 ✓

B、膀胱破裂

C、尿道断裂

D、骶丛神经损伤

E、直肠损伤

23、烧伤患者在早期口渴，最适合饮用下列哪种液体（）[单选题]*

A、大量冷开水

B、大量糖水

C、少量多次饮盐水 ✓

D、大量茶水

E、大量橘子水

24、提示昏迷程度加重的是（）[单选题]*

- A、双侧对称性浅反射减弱
- B、深反射亢进或消失
- C、双侧腱反射不对称
- D、出现病理反射
- E、浅反射由减弱到消失 ✓

25、徒手心肺复苏时，心脏按压与人工呼吸的频率比例宜为（）[单选题]*

- A、5：1
- B、5：2
- C、10：1
- D、15：1
- E、30：2 ✓

26、解除舌根后坠堵塞呼吸道的简便方法是（）[单选题]*

- A、环甲膜穿刺术
- B、口咽管放置术 ✓
- C、经鼻腔气管插管术
- D、经口腔气管插管术
- E、气管切开术

27、急性呼吸窘迫综合症的治疗，下述哪项是错误的（
）[单选题]*

- A、应针对病因积极治疗
- B、应尽量提高吸氧浓度，以纠正呼吸窘迫 ✓
- C、严格控制补液量
- D、尽量予晶体液以维持血容量基本正常
- E、类固醇激素应早期大量使用

28、对心搏骤停的成人患者施行首次电除颤时一般除颤电能为（）[单选题]*

- A、<200J
- B、200J ✓
- C、300J
- D、360J
- E、>360J

29、上肢出血应用止血带时不应缚在（）[单选题]*

- A、上臂上1/3
- B、上臂中上1/3
- C、上臂中1/3 ✓
- D、上臂中下1/3
- E、上臂下1/3

30、开放型脑损伤的描述哪项是正确的（）[单选题]*

A、头皮裂伤

B、颅骨骨折

C、有脑脊液漏或脑组织从伤口溢出 ✓

D、头皮破裂并颅骨骨折

E、以上都不是

二、多选题

1、腓总神经损伤的主要表现有：（）[多选题]*

A、足部伸肌瘫痪 ✓

B、腓骨长肌瘫痪 ✓

C、腓骨短肌瘫痪 ✓

D、腓肠肌瘫痪

E、以上均不正确

2、下列哪些因素对颅内压增高有影响：（）[多选题]*

A、年龄 ✓

B、病变部位 ✓

C、性别

D、病变进展速度 ✓

E、伴发脑水肿的程度 ✓

3、胸腰段椎体压缩性骨折常见的临床表现包括：（）[多选题]*

A、脊柱后突畸形 ✓

B、局部疼痛及压痛 ✓

C、功能障碍 ✓

D、反常活动及骨擦音

E、以上都对

4、对晕动病所致呕吐有效的药物是：（）[多选题]*

A、苯海拉明 ✓

B、异丙嗪 ✓

C、氯丙嗪

D、东莨菪碱 ✓

E、梅克洛嗪 ✓

5、内脏痛的特点（）[多选题]*

A、定位精确

B、有牵涉痛 ✓

C、对牵拉烧伤敏感

D、对炎症、切割敏感

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/838057106023006136>