

关于非住院死亡调查和死因推断

非住院死亡的调查与推断程序

- 死因调查与推断程序（步骤）

主要包括三方面内容

死因调查（资料收集）



死因推断分析



规范填报死亡证

非住院死亡的调查与推断程序

一、死因调查

1.采集病史——最为关键。

现病史--死前及死前一段时间内临床表现（症状、体征）及就诊的辅助检查资料。

既往史--生前所患疾病。包括发病年限、主要治疗及转归情况。

非住院死亡的调查与推断程序

一、死因调查

2.体格检查

车到已死者仍有些体征可助死因判断，不能忽视。

如：咯血和呕血(口腔内可见)

食物窒息(呼吸道内可见)

褥疮(压疮)感染

颈部勒痕(自缢)

恶液质(肿瘤等)

非住院死亡的调查与推断程序

一、死因调查

3.辅助检查

如果是抢救中死亡的，有心电图、血糖监测结果。

4. 外部环境 在非正常死亡时尤为重要

如：药物中毒--身旁空药瓶、药袋

一氧化碳中毒--室内炉火是否通风

自缢--绳索

工伤--现场情况。如：脚手架坍塌

非住院死亡的调查与推断程序

二、死因推断分析

根据死因调查资料，医生要进行综合分析判断，做出相应的死亡诊断。这个死亡诊断是指医生书写调查记录时的疾病诊断。

非住院死亡的调查与推断程序

三、规范填报《居民死亡医学证明书》

根据《居民死亡医学证明书》的填写要求，将致死疾病死因链的逻辑关系规范地填报在死亡证第 I 部分（a）、（b）、（c）、（d）和第 II 部分内。

常见死因推断



猝死 (心源性猝死)

常见死因推断举例说明

- **猝死（包括心源性猝死）**

1.死因调查

应询问死者生前有无心脏病、高血压病、糖尿病等病史，死前有无胸痛、胸闷；头晕、头痛；年轻者还要询问死前有无上呼吸道感染史（有无心肌炎可能）、有无暴饮暴食史（有无急性出血坏死性胰腺炎可能）；有无吸毒史；有无自杀可能等。若死者有上述症状（或情况），应该询问有无就诊；若就诊，应该询问诊疗情况。

常见死因推断举例说明

- **猝死（包括心源性猝死）**

- 2. 心源性猝死常见死因填报

发病1小时内的猝死，90%是心源性猝死。

- I (a) 心源性猝死

- (b) 冠心病

- 心肌病（具体类型）

- 心肌炎

- 风湿性（具体受损瓣膜及类型）心脏病

- 先天性（具体类型）心脏病

如果不能推断猝死、心源性猝死的原因，则需按死因调查询问内容书写调查记录。

恶性肿瘤



常见死因推断举例说明

- **恶性肿瘤**

1.死因调查

应询问患者生前患何种恶性肿瘤（类型、部位），所患疾病年限，曾做过何种治疗（手术、化疗、放疗等），有无组织学形态的诊断，治疗效果和转归情况。近期加重的病情，以及近期的治疗情况。

常见死因推断举例说明

- **恶性肿瘤**

2.死因分析

如果患者生前有明确的恶性肿瘤史，近期有恶性肿瘤所造成的病情进行性加重表现或出现复发/急性加重情况，未治疗或经治疗无法控制，死亡原因则考虑为该恶性肿瘤。

常见死因推断举例说明

- **恶性肿瘤**

3. 填报原则

- ① 恶性肿瘤尽可能填报肿瘤的组织形态学诊断。
- ② 有明确原发部位，报原发部位即可。
- ③ 脑瘤报告时，需同时报告良性或恶性，不能确定时需书写调查记录进行说明。
- ④ 淋巴瘤需报告霍奇金淋巴瘤或非霍奇金淋巴瘤。
- ⑤ 白血病报告时要按急/慢性报告，同时需报告分型。

常见死因推断举例说明

● 恶性肿瘤

例1.男性，60岁，患有右肺小细胞癌2年，1年半前在某医院行手术及化疗。术后定期复查，半年前发现多发骨转移，2月前出现肝转移，1个月前出现脑转移，在家服中药治疗。1周来病情加重，进食困难，神志模糊。半小时前意识丧失，呼吸停止。

死亡证填报为（按照发病时间先后填写）

- I (a) 脑转移癌 1个月
- (b) 肝转移癌 2个月
- (c) 多发骨转移癌 半年
- (d) 右肺小细胞癌 2年

常见死因推断举例说明

● 恶性肿瘤

例2.男性，63岁，1月半前因全身淋巴结肿大，在北京某医院就诊，淋巴结活检为转移性腺癌，经检查未明确原发部位。1个月来患者全身疼痛，伴发热、纳差、消瘦，2小时前神志不清，呼吸渐弱，20分钟前呼吸停止。

分析：患者有明确的转移癌病史，1个月来病情恶化，逐渐衰竭死亡，所以死亡原因考虑为癌症所致。

死亡证填报为： I (a) 猝死
(b) 全身淋巴结转移性腺癌
并书写调查记录

各种非致死疾病 长期卧床后死亡



常见死因推断举例说明

- **各种非致死疾病长期卧床后死亡的**

1.死因调查

应询问死者生前有无导致长期卧床的疾病（脑血管病后遗症等）或损伤（颅脑损伤后遗症、下肢骨折等），属于损伤的，还应询问致伤原因。死前有无肺部感染/褥疮（压疮）感染的症状和体征，或者有无出现纳差/不能进食等症状。有无就诊；若就诊，还应询问诊疗情况。

常见死因推断举例说明

- **各种非致死疾病长期卧床后死亡的**

2.院前急救中各种非致死疾病长期卧床常见原因填报：

I (a) 肺部感染或褥 (压) 疮感染或不进食或纳差

(b) 长期卧床

(c) 脑梗死或脑出血或脑血管病后遗症

老年性痴呆 (脑萎缩)

左 (右) 股骨颈骨折或颅脑损伤后遗症 等

(d) 损伤原因

如果不能询问出有导致长期卧床的原因，则需按死因调查询问内容书写调查记录。

常见死因推断举例说明

● 各种非致死疾病长期卧床后死亡的

例1.患者男性，83岁，既往体健。1年前在家中行走时不慎跌倒，在医院就诊诊断为“左股骨颈骨折”，未予手术及牵引治疗，返家后一直卧床。1周来纳差，精神渐差，无咳嗽、咳痰及发热，未就诊。1小时前神志不清，呼吸不规则。10分钟前呼吸停止。

分析：患者1年前摔伤后一直卧床，1周来纳差，衰竭死亡。病程为慢性过程，但患者无其他慢性疾患，所以考虑为因损伤后续结果造成死亡。

死亡证应填报为： I (a) 纳差

(b) 长期卧床

(c) 左股骨颈骨折

(d) 在家行走时不慎跌倒

虽然 (a) 中所填“纳差”为症状编码， (b) 中所填“长期卧床”无疾病编码但由于不影响编码人员判断根本死因，同时也是医生可接受的逻辑顺序和造成死亡的直接死因，所以中心建议按此填报。

常见死因推断举例说明

- **各种非致死疾病长期卧床后死亡的**

例2.患者女性，65岁，既往患高血压病10年。5年前患脑出血致偏瘫后长期卧床，1周来咳嗽、咳痰伴发热，体温38-39℃,3天前在某院就诊，查血白细胞15000，胸片示双肺感染，社区输液抗炎等治疗。40分钟前患者神志不清，随后呼吸停止。

分析：患者有脑出血后遗症致偏瘫后卧床史5年，1周来出现肺部感染，病程为慢性过程，病史中无其他造成肺部感染的原因存在，所以考虑为因脑出血后遗症卧床所致肺部感染死亡。

死亡证应填报为： I (a) 肺部感染
(b) 长期卧床
(c) 脑出血后遗症
II 高血压病

慢性 心功能不全



常见死因推断举例说明

- **慢性心功能不全**

1.死因调查

应询问死者生前有无冠心病、高血压、心肌病、风湿性心脏病、先天性心脏病(根据情况而定)等病史，死前出现的慢性心功能不全的症状和体征(咳喘、阵发性夜间呼吸困难、浮肿、尿少等)，有无就诊；若就诊，还应询问诊疗情况。

常见死因推断举例说明

- **慢性心功能不全**

2. 院前急救中慢性心功能不全致死常见原因填报：

I (a) 慢性心功能不全

(b) 冠心病

心肌病（具体类型）

心肌炎

风湿性（具体受损瓣膜及类型）心脏病

先天性（具体类型）心脏病等

如果不能推断慢性心功能不全原因，则需按上述死因调查内容书写调查记录。

院前急救中常见死因推断举例说明

● 慢性心功能不全

例1. 患者女性，68岁，既往患有风湿性心脏病 二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全20年，平素有咳喘、阵发性夜间呼吸困难伴双下肢浮肿，长期服用强心、利尿、扩管等药物治疗。2天前着凉后咳喘加重，夜间不能平卧，尿少，下肢浮肿明显，未就诊。20分钟前患者神志不清，随后呼吸停止。

分析：患者有明确的风湿性心脏病史，因慢性心功能不全长期服药治疗，此次因感冒后造成原有心衰症状加重致死亡，故考虑心衰的原因为风湿性心脏病。

死亡证应填报为： I (a) 慢性心功能不全

(b) 风湿性二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全心脏病

咯 血



常见死因推断举例说明

- 咯血

1. 死因调查

应询问死者生前有无支气管扩张、肺结核史，近期有无明显消瘦史(有无呼吸系统恶性肿瘤可能)，死前一段时间有无咯血、痰中带血等症状，如果近期有咯血，应询问有无就诊；若就诊，应询问诊疗情况。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/845020112324011133>