北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：小儿心胸外科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：食管胃弓上吻合术后胸胃排空的功能性障碍，可能由于以下原因造成，除了（　）。A.吻合口狭窄

B.幽门成角

C.迷走神经干被切断

D.长期卧床活动减少

E.低钾血症

2、单项选择题：先天性漏斗胸最常见的临床表现是（　）。A.频繁肺炎

B.经常上呼吸道感染

C.营养不良

D.呼吸困难

E.生长发育迟缓

3、单项选择题：结节型肺泡细胞癌的X线表现是（　）。A.片状阴影

B.多有空洞

C.类似肺炎

D.常伴有肺叶不张

E.与周围型肺癌相似

4、单项选择题：下述哪项方法适用于早期食管癌的大规模检查（　）。A.X线钡餐造影

B.食管拉网脱落细胞学检查

C.食管镜检查

D.胸部CT

E.锁骨上淋巴结活检

5、单项选择题：男性，8岁，出生后即发现有心脏杂音，平时活动能力较差，口唇青紫，喜蹲踞。超声心动图提示为先天性心脏病，法乐四联症。检查中可能发现的情况是（　）。A.胸骨左缘Ⅰ　　E.张力性气胸有广泛纵隔气肿和皮下气肿的病人可观察病情，保守治疗

7、单项选择题：肺癌的转移方式中，下列何者正确（　）。A.肿泡细胞癌，早期发生血行转移

B.鳞癌血行转移出现早

C.腺癌早期发生淋巴转移，血行转移较晚

D.未分化癌早期出现血行、淋巴转移

E.类癌多发淋巴结转移

8、单项选择题：纵隔扑动（Mediastinal flutter）最常见于（　）。A.连枷胸（Flail Chest）

B.吸吮伤（Sucking Wound）

C.闭合性气胸（Closed Pneumothorax）

D.开放性气胸（Open Pneumothorax）

E.张力性气胸（Tension Pneumothorax）

9、单项选择题：正常人体液中各部分渗透压的关系是（　）。A.细胞内高于细胞外

B.细胞外高于细胞内

C.血浆高于组织间液

D.组织间液高于血浆

E.细胞内外液基本相等

10、单项选择题：患者男，10岁，因“肺炎”入院。患者住院期间症状好转后又出现高热，达38.9℃，并感到左侧胸痛。查体：左肺呼吸音减弱，叩诊浊音。WBC14.0×109/L，N0.80；胸部X线片：左侧胸腔积液，呈外高内低的圆弧形阴影，胸腔穿刺抽出脓液。应首选的治疗措施是（　）。A.开胸探查，清除脓液

B.大剂量抗生素治疗

C.胸腔内注入抗生素

D.应用抗生素，胸腔闭式引流

E.胸膜纤维板剥脱术

11、单项选择题：男性，15岁，心前刀刺伤半小时，胸憋，气促，恐惧，躁动，颈静脉怒张，两肺呼吸音清，心音听不清，血压80/50mmHg。应立即（　）。A.心包穿刺

B.拍胸片

C.做心脏超声心动图检查

D.胸部CT检查

E.吸氧

12、单项选择题：患者右下肺癌侵及胸壁，胸部CT示肺门、纵隔未见肿大淋巴结，未发现远处转移，该患者TNM分期属于（　）。A.Ⅰb期

B.Ⅱa期

C.Ⅱb期

D.Ⅲa期

E.Ⅲb期

13、单项选择题：主动脉瓣关闭不全时主要引起（　）。A.左心室压力负荷过重

B.左心室容量负荷过重

C.右心室压力负荷过重

D.右心室容量负荷过重

E.心肌代谢障碍

14、单项选择题：患者胸外伤、大量血胸诊断明确，应首先选择什么治疗措施（　）。A.胸腔闭式引流术

B.胸腔穿刺术

C.输血、输液观察病情变化，不需特殊处理

D.开胸探查术

E.开放引流术

15、单项选择题：先天性后外侧膈疝常导致死亡的主要因素是（　）。A.膈肌缺损过大

B.胸腔压力过高

C.肺发育不良

D.肺过度受压

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/845102012023011201