

2025-2026 年执业药师之西药学专业二模拟考试试卷 A 卷含答案

单选题（共 75 题）

1、单独应用时止吐作用相对较弱，主要作为辅助药物，用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能，也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

- A. 氯丙嗪
- B. 甲氧氯普胺
- C. 帕洛诺司琼
- D. 劳拉西泮
- E. 东莨菪碱

【答案】 D

2、属于III类抗心律失常药的是

- A. 胺碘酮
- B. 奎尼丁
- C. 利多卡因
- D. 普罗帕酮
- E. 维拉帕米

【答案】 A

3、（2021 年真题）抗原性及变态反应风险最高的溶栓药物是（ ）

- A. 重组链激酶
- B. 尿激酶

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

C. 瑞替普酶

D. 替奈普酶

E. 阿替普酶

【答案】 A

4、氟西汀用于治疗神经性贪食症，成人每日用量为

A. 20mg

B. 50mg

C. 60mg

D. 100mg

E. 200mg

【答案】 C

5、大剂量应用下列哪种维生素时，可使尿液呈黄色

A. 维生素 B

B. 维生素 B

C. 维生素 B

D. 维生素 C

E. 叶酸

【答案】 B

6、治疗肺孢子菌肺病的首选药物的是()

A. 磺胺嘧啶

B. 磺胺米隆

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄晞

- C. 柳氮磺吡啶
- D. 复方磺胺甲噁唑
- E. 磺胺醋酰钠

【答案】 D

7、属于 GLP-1 受体激动剂的药物是

- A. 伏格列波糖
- B. 那格列奈
- C. 利拉鲁肽
- D. 阿格列汀
- E. 格列吡嗪

【答案】 C

8、利奈唑胺的不良反应不包括

- A. 血小板减少
- B. 骨髓抑制
- C. 头痛
- D. 癫痫
- E. 腹泻

【答案】 D

9、（2017 年真题）可以引起跟腱断裂, 血糖异常的药物是（ ）

- A. 加替沙星
- B. 庆大霉素

- C. 甲矾霉素
- D. 多西环素
- E. 林可霉素

【答案】 A

10、属于维生素 K 类抗出血药的是

- A. 氨甲环酸
- B. 酚磺乙胺
- C. 艾曲泊帕乙醇胺
- D. 甲萘氢醌
- E. 人凝血酶原复合物

【答案】 D

11、选择性抑制延髓咳嗽中枢，并具有微弱的阿托品样作用，适用于各种原因引起的无痰干咳的药物是

- A. 喷托维林
- B. 苯丙哌林
- C. 福尔可定
- D. 右美沙芬
- E. 羟甲司坦

【答案】 A

12、抗肿瘤药一般缺乏特异性，在杀伤肿瘤细胞同时，对正常组织细胞不可避免的产生损害或毒副作用，75％以上化疗患者会出现不同程度的恶心、呕吐。

- A. 应用化疗药后 24h 内发生

- B. 应用化疗药后的 24～48h 内发生
- C. 应用化疗药后的 48～72h 内发生
- D. 应用化疗药后的 72h 后发生
- E. 与化疗药无关

【答案】 A

13、可用于缓解绝经后更年期症状的药品是()。

- A. 戊酸雌二醇
- B. 他莫昔芬
- C. 地屈孕酮
- D. 依普黄酮
- E. 司坦唑醇

【答案】 A

14、关于铋剂的描述，正确的是

- A. 果胶铋应在餐后 0.5～1 小时服用
- B. 服用后如果粪便色泽变黑，应立即停药
- C. 为了防止铋中毒，含铋剂不宜联用
- D. 铋剂的安全性较高，可大剂量服用
- E. 为了提高疗效，两种铋剂可同时服用

【答案】 C

15、（2016 年真题）可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

- A. 硫酸亚铁

- B. 重组人促红素
- C. 维生素 B12
- D. 人血白蛋白
- E. 非格司亭

【答案】 B

16、已服用大剂量阿司匹林的患者服用双嘧达莫 查看材料

- A. 缺铁性贫血
- B. 失去药效
- C. 急性中性粒细胞减少症
- D. 缺血性脑卒中
- E. 肾衰竭患者的贫血

【答案】 B

17、（2017 年真题）长期大剂量服用维生素 D 可能引起的不良反应是（ ）

- A. 血栓性静脉炎
- B. 高钙血症
- C. 高胆红素血症
- D. 颅内压升高
- E. 乳腺肿大

【答案】 B

18、可增加心脏毒性的药物是

- A. β 受体阻断剂

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

- B. 甲氨蝶呤
- C. 利福平
- D. 阿糖胞苷
- E. 头孢菌素与多柔比星合用或配伍

【答案】 A

19、易致血糖异常的药物是

- A. 氯霉素
- B. 青霉素
- C. 加替沙星
- D. 红霉素
- E. 呋喃妥因

【答案】 C

20、关于噻嗪类利尿药的描述，错误的是

- A. 痛风患者慎用
- B. 糖尿病患者慎用
- C. 可引起低钙血症
- D. 肾功能不良者禁用
- E. 可引起血氨升高

【答案】 C

21、糖皮质激素用于中毒性感染及各种休克宜选择的给药方法是

- A. 小剂量替代疗法

- B. 大剂量冲击疗法
- C. 一般剂量长期疗法
- D. 隔日一次给药法
- E. 中剂量维持疗法

【答案】 B

22、有促进骨骼致密作用，可用于绝经期妇女治疗骨质疏松的药物是

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 短效口服避孕药
- D. 长效避孕药
- E. 蛋白同化激素

【答案】 A

23、（2019 年真题）患者，男，52 岁，BMI 28kg/m²，既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病，患者诉昨晚 8 点起右大脚趾关节处疼痛难忍，宜使用的药物是（ ）

- A. 非布司他
- B. 碳酸氢钠
- C. 别嘌醇
- D. 秋水仙碱
- E. 苯溴马隆

【答案】 D

24、作用于细菌二氢叶酸合成酶而发挥作用的抗菌药物是

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

- A. 磺胺甲唑
- B. 利奈唑胺
- C. 呋喃妥因
- D. 甲氧苄啶
- E. 替硝唑

【答案】 A

25、患者，男性，26岁，因“咳嗽伴间断发热1周”入院，查体：T 38.9℃，P 90次/分，R 21次/分，BP 110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比84.6%；胸部CT示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A. 莫西沙星可覆盖社区获得性肺炎的常见病原体
- B. 莫西沙星对非典型病原体无效
- C. 莫西沙星对厌氧菌有效
- D. 莫西沙星属于氟喹诺酮类
- E. 莫西沙星在肺组织浓度较高

【答案】 B

26、可与对氨基苯甲酸竞争二氢叶酸合成酶，阻碍叶酸合成的药物是

- A. 磺胺嘧啶
- B. 氧氟沙星
- C. 利福平
- D. 两性霉素
- E. 红霉素

【答案】 A

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

27、替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗（ ）

- A. 慢性淋巴细胞性白血病
- B. 脑瘤
- C. 纤维瘤
- D. 恶性淋巴瘤
- E. 脂肪瘤

【答案】 B

28、（2015 年真题）李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是（ ）。

- A. 二甲双胍
- B. 辛伐他汀
- C. 米氮平
- D. 阿司匹林
- E. 硝酸甘油

【答案】 C

29、属于 5-HT

- A. 甲氧氯普胺
- B. 甲地孕酮
- C. 格雷司琼
- D. 阿瑞吡坦
- E. 奥美拉唑

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

【答案】 C

30、高浓度使细胞膜的渗透性增加，钾离子和其他内容物漏出，细胞死亡的是

- A. 制霉菌素
- B. 特比萘芬
- C. 阿莫罗芬
- D. 环吡酮胺
- E. 伊曲康唑

【答案】 D

31、患者，男，45岁。以“间断巩膜黄染伴腹胀2年，加重1周”之主诉入院。患者2年前无明显诱因出现巩膜黄染，伴有腹胀，在当地医院诊断为酒精性肝硬化。1周前患者上述症状加重，胃镜检查：胃溃疡(A

- A. 预防消化道出血
- B. 治疗肝硬化
- C. 缓解腹胀
- D. 治疗胃溃疡
- E. 保肝、退黄

【答案】 D

32、代谢产物为选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂的药物是

- A. 奥司他韦
- B. 阿糖腺苷
- C. 干扰素
- D. 阿昔洛韦

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

E. 阿德福韦酯

【答案】 A

33、治疗贾第鞭毛虫病最有效的药物是()。

A. 甲硝唑

B. 伯氨喹

C. 奎宁

D. 氯喹

E. 磺胺嘧啶

【答案】 A

34、属于延长动作电位时程的抗心律失常药是()。

A. 利多卡因

B. 索他洛尔

C. 美托洛尔

D. 硝酸甘油

E. 维拉帕米

【答案】 B

35、（2021 年真题）属于微管蛋白活性制剂的抗肿瘤药物是（ ）

A. 来曲唑

B. 环磷酰胺

C. 厄洛替尼

D. 长春新碱

E. 多柔比星

【答案】 D

36、患儿，5岁。有咽痛、肌肉酸痛、咳嗽，实验室检查为支原体感染；医师处方红霉素治疗。

- A. 红霉素广泛分布于各种组织和体液中
- B. 易被胃酸破坏，临床常用其肠衣片或酯化物
- C. 常见用药后10日出现转氨酶升高
- D. 静脉滴注速度过快可发生心脏毒性
- E. 老年人、肾功能不全者或用量过大易发生耳聋

【答案】 A

37、前列腺素类似物的不良反应不包括

- A. 虹膜颜色加深
- B. 眼睑水肿和红斑
- C. 眼部刺激症状
- D. 角膜病变
- E. 葡萄膜炎

【答案】 D

38、以下药物中，易被胃酸破坏的是

- A. 红霉素
- B. 克拉霉素
- C. 罗红霉素

D. 阿奇霉素

E. 泰利霉素

【答案】 A

39、较常引起外周神经炎的抗癌药是

A. 甲氨蝶呤

B. 氟尿嘧啶

C. 巯嘌呤

D. 长春新碱

E. L-门冬酰胺酶

【答案】 D

40、小剂量碘主要用于

A. 呆小病

B. 黏液性水肿

C. 单纯性甲状腺肿

D. 抑制甲状腺素的释放

E. 甲状腺危象

【答案】 C

41、适用于Ⅱa、Ⅱb型及家族性杂合子的高脂蛋白血症，但有特殊臭味和刺激性的是

A. 洛伐他汀

B. 考来烯胺

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

C. 考普罗布

D. 烟酸

E. 吉非贝齐

【答案】 B

42、奥美拉唑治疗消化性溃疡病的机制是()

A. 抑制胃壁细胞的 H

B. 阻断 H

C. 阻断 CTZ 的 D

D. 抗幽门螺杆菌

E. 选择性阻断外周多巴胺受体()

【答案】 A

43、弱效(使 LDL-ch 水平降低<30%)的他汀类调血脂药是()

A. 小剂量氟伐他汀

B. 小剂量阿托伐他汀

C. 大剂量阿托伐他汀

D. 依折麦布

E. 苯扎贝特

【答案】 A

44、以多酶或辅酶形式参与体内新陈代谢及重要的生化反应的是

A. 葡萄糖

B. 果糖

- C. 维生素
- D. 脂肪乳
- E. 氨基酸

【答案】 C

45、以下有关 ACEI 药物治疗高血压的监护叙述中，不正确的是

- A. 对已接受多种或大剂量利尿剂的患者，在首剂治疗时注意低血压反应
- B. 对伴低钠血症、脱水、低血容量患者在首剂治疗时注意低血压反应
- C. 我国对 ACEI 在肾病方面的建议：用药初 2 个月血肌酐升幅大于 30%~50% 时应停药
- D. 心力衰竭加重所致的咳嗽应当停用 ACEI
- E. 血栓素拮抗剂、阿司匹林或铁剂可减少 ACEI 引起的咳嗽

【答案】 D

46、我国常用避孕药不包括

- A. 超短效避孕药
- B. 紧急避孕药
- C. 短效避孕药
- D. 探亲避孕药
- E. 长效避孕药

【答案】 A

47、伊曲康唑属于

- A. 抗生素类

百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

- B. 唑类
- C. 丙烯胺类
- D. 吗啉类
- E. 吡啶酮类

【答案】 B

48、青霉素治疗何种疾病时可引起吉海反应

- A. 回归热
- B. 大叶性肺炎
- C. 梅毒和钩端螺旋体病
- D. 破伤风
- E. 蜂窝织炎

【答案】 C

49、卡泊三醇禁用于

- A. 高钙血症患者
- B. 低钙血症患者
- C. 高钠血症患者
- D. 低钠血症患者
- E. 低钾血症患者

【答案】 A

50、抑制碳酸酐酶的药物是

- A. 乙酰唑胺

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

- B. 氢氯噻嗪
- C. 呋塞米
- D. 氨苯蝶啶
- E. 阿米洛利

【答案】 A

51、哌唑嗪常见的不良反应是

- A. 口干、便秘、发热
- B. 钠水潴留
- C. 首剂量低血压反应
- D. 降压效应减弱
- E. 高血压危象

【答案】 C

52、与瑞格列奈无药物相互作用的是

- A. 环孢素
- B. 吉非贝齐
- C. 伊曲康唑
- D. 克拉霉素
- E. 利血平

【答案】 D

53、不得与碱性物质或铁器接触的是()

- A. 林旦霜

- B. 苯甲酸苄酯
- C. 克罗米通
- D. 阿达帕林
- E. 硫黄

【答案】 A

54、替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗（ ）

- A. 慢性淋巴细胞性白血病
- B. 脑瘤
- C. 纤维瘤
- D. 恶性淋巴瘤
- E. 脂肪瘤

【答案】 B

55、低剂量用药时对中枢和外周多巴胺 D₂ 受体有拮抗作用，而高剂量用药时有较弱的 5-HT₂受体阻断作用，可用于化疗所致恶心呕吐的是

- A. 氯丙嗪
- B. 甲氧氯普胺
- C. 帕洛诺司琼
- D. 劳拉西泮
- E. 东莨菪碱

【答案】 B

56、不易引起严重乳酸血症的双胍类药物是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/845111322102012034>