




第十章 灸法



概 述

1. 含义

将净选或切制后的药物，加入定量的**液体辅料**拌炒，**使辅料逐渐渗入药物组织内部的方法**称为炙法。


2. 目的

药物炙后在性味、功效、作用趋向、归经和理化性质方面均可发生某些变化，起到降低毒性、抑制偏性、增强疗效、矫嗅矫味等作用，从而最大限度地发挥疗效。

3. 分类

根据所加辅料不同，炙法可分为**酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙和油炙**。





4. 炙法与加辅料炒的区别

	炙法	加辅料炒法
辅 料	液体辅料	固体辅料
温 度	低	高
时 间	长	短
火 力	文火(个别药物中火)	中火或武火
辅料去向	辅料渗入药材组织内部	炒后筛去辅料
作用	协同增强疗效	中间传热
操作方法	先加辅料后炒药 或先炒药后加辅料	多为先预热辅料后投药



第一节 酒炙法

1. 含义 将净选或切制后的药物，加入一定量的酒拌炒的方法称为酒炙法。

2. 辅料酒 酒炙药物以黄酒为佳。酒性大热，味甘辛。气味芳香，能升能散，宣行药势，具有活血通络、散寒、去腥的作用，因此酒炙法多适用于活血散瘀、祛风通络及动物类药物。

3. 酒炙的目的

改变药性，引药上行。如大黄、黄连、黄柏。

增强活血通络作用。如当归、川芎、桑枝。

矫臭去腥。如乌梢蛇、蕲蛇、紫河车。

减少副作用。如常山。



4. 酒炙的操作方法

先拌酒后炒药、先炒药后加酒

酒的用量一般为每100kg药物，用黄酒10~20kg。

5. 注意事项

- (1)药物加入酒拌匀闷润过程中，容器上应加盖，以免酒挥发。
- (2)若酒的用量较少，不易与药物拌匀时，可先将酒加适量水稀释后，再与药物拌匀。
- (3)药物在加热炒制时，火力不宜过大，以免酒迅速挥发，达不到炮炙目的。



大黄

来源

本品为蓼科植物掌叶大黄 *Rheun palmatum* L.、唐古特大黄 *Rheun tanguticum* Maxim.ex Balf 或药用大黄 *Rheun officinale* Baill. 的干燥根及根茎。

炮制规格

大黄、酒大黄、熟大黄、大黄炭、醋大黄、清宁片。



炮制方法

大 黄 取原药材，除去杂质，大小分开，洗净，捞出，淋润至软后，切厚片或小方块，晾干或低温干燥。

酒大黄 取大黄片或块，用黄酒喷淋拌匀，稍闷润，待酒被吸尽后，文火炒干，色泽加深，取出放凉。大黄片或块每**100kg**，用黄酒**10kg**。

熟大黄 （1）取大黄片或块，隔水蒸至大黄内外均呈黑色为度，取出，干燥。

（2）取大黄片或块，用黄酒拌匀，闷约**1~2**小时至酒被吸尽，密闭，隔水炖约**24~32**小时至大黄内外均呈黑色时，取出，干燥。大黄片或块每**100kg**，用黄酒**30kg**。



大黄炭 取大黄片或块，置炒制容器内，用武火加热，炒至外表呈焦黑色时，取出，晾凉。

醋大黄 取大黄片或块，用米醋拌匀，稍闷润，待醋被吸尽后，文火加热炒干，取出，放凉。大黄片或块每**100kg**，用米醋**15kg**。

清宁片 取大黄片或块，置煮制容器内，加水满过药面，用武火加热，煮烂时，加入黄酒（**100: 30**）搅拌，再煮成泥状，取出晒干，粉碎，过**100**目筛，取细粉，再于黄酒、炼蜜混合成团块状，置笼屉内蒸至透，取出揉匀，搓成直径约**14mm**的圆条，于**50~55℃**低温干燥，烘至七成干时，装入容器内，闷约**10**天至内外湿度一致，取出，切厚片，晾干。大黄片或块每**100kg**，用黄酒**75kg**，炼蜜**40kg**。




成品性状



大 黄 为不规则厚片或块，表面黄棕色或黄褐色，中心有纹理，微显朱砂点，习称“锦纹”，质轻，气清香，味苦而微涩。

酒大黄 表面深棕色或深褐色，偶有焦斑，折断面呈浅棕色，质坚实。略有酒香气。

熟大黄 酒熟大黄表面黑褐色，质坚实，有特异芳香气，味微苦。




成品性状



大黄炭 表面焦黑色，断面焦褐色，质轻而脆。有焦香气，味微苦。

醋大黄 表面深棕色或棕褐色，断面浅棕色。略有醋香气。

清宁片 为圆形厚片，表面乌黑色。有香气，味微苦甘。



炮制作用及应用

大黄 苦寒，沉降，气味重浊，走而不守，直达下焦，泻下作用峻烈，攻积导滞，泻火解毒力强。用于实热便秘，高热，谵语，发狂，吐血，衄血，及火邪上炎所致的目赤肿痛。

酒大黄 酒炙后，其泻下作用稍缓，并借酒升提之性，引药上行，以清上焦实热为主。

熟大黄 经酒蒸后，泻下作用缓和，减轻腹痛之副作用，并增强活血祛瘀之功。

大黄炭 泻下作用极微，并有止血作用。

醋大黄 泻下作用稍缓，以消积化瘀为主，如用于治食积痞满，产后瘀停，癥瘕痞积。

清宁片 泻下作用缓和，具缓泻而不伤气，逐瘀而不败正之功。如用于饮食停滞，口燥舌干，大便秘结之年老、体弱、久病患者。可单用。



炮制研究


1. 有效成分：结合型和游离性的蒽醌类衍生物，番泻苷，鞣质等。

2. 炮制对大黄理化性质和药理作用的影响

(1) 泻下作用

(2) 解热作用


(3) 抑菌抗肿瘤作用



成品性状



当归（全当归） 圆形或类圆形薄片，表面黄白色或淡黄色，平坦，有裂隙，中间有一浅棕色的环纹，并有多数棕色的油点，周边灰棕色或灰褐色，有裂缺。质柔韧，香气浓郁，味甘辛，微苦。




当归身 当归尾

酒当归 表面色泽加深，偶见焦斑，略有酒香气。

土炒当归 表面挂土黄色，具土香气。

当归炭 表面黑褐色，断面灰棕色，质枯脆，气味减弱，并带涩味



第二节 醋炙法

1.含义

将净选或切制后的药物，加入一定量的米醋拌炒的方法称为醋炙法。

2.辅料醋的选择

炮制用醋，以米醋为佳，且陈久者良。

醋味酸苦性温，主入干经血分，具有收敛解毒散瘀止痛矫味的作用。

醋炙法多用于疏肝解郁，散瘀止痛，攻下逐水的药物。



醋炙的方法

根据药物的性质不同，可分别选用以下两种方法。

1. 先拌醋后炒药 将净选或切制后的药物，加入一定量的米醋，加盖闷润，待醋被吸尽后，用文火炒干，取出摊凉或晾干，筛去碎屑。一般药物均采用此法炮制。优点是能使醋渗入药物组织内部。

2. 先炒药后加醋 将净选后的药物，置炒制容器内，文火炒至表面熔化发亮（乳香、没药），或炒至表面颜色改变，有腥气溢出时（五灵脂），喷洒一定量米醋，炒至微干，取出摊开晾凉。此法多用于树脂类和动物粪便类药物。

一般每100公斤药物加米醋20～30公斤，最多不超过50公斤。



注意事项

1. 若用醋量较少，不能与药物拌匀时，可加适量水稀释后再与药物拌匀。
2. 醋炙药物多用文火，并应勤加翻动，一般炒至微干显火色时，即可取出摊凉。
3. 树脂类药物如乳香、没药，先加醋易粘连，动物粪便类药物如五灵脂先加醋易松散，呈碎块状，故都应采用先炒药后加醋的方法炮制。
4. 先炒药后加醋时，宜边喷醋边翻动药物，使之均匀。



醋炙的目的

1. 引药入肝，增强疗效。

散瘀止痛类药物，如延胡索、三棱、莪术，醋炙后增强活血止痛作用。乳香、没药、五灵脂醋炙增强活血止痛作用外，兼有矫臭矫味之功。疏肝理气药如青皮、香附、柴胡、郁金等醋炙可增强疏肝止痛作用，青皮、香附还能消积化滞。

2. 降低毒性，缓和药性。

峻下逐水药甘遂、大戟、芫花、商陆等，醋炙后能降低毒性，缓和峻泻作用。

3. 矫臭矫味。

具有特殊气味的药物，如动物粪便类和树脂类，醋炙可减少不良气味，便于服用。



延胡索



来源

罂粟科植物延胡索 *Corydalis yanhusuo*
W.T.Wang 的干燥块茎。

炮制规格 延胡索、醋延胡索。



炮制方法

延胡索 取原药材，除去杂质，大小分开，洗净，稍浸、润透，切薄片，干燥。或洗净干燥后捣碎。

醋延胡索 （1）取净延胡索碎粒或延胡索片，加入定量米醋拌匀，稍闷润，待醋被吸尽后，文火炒干，取出晾凉。（2）取净延胡索，加入定量米醋与适量清水（以平药面为宜），煮至透心，醋液被吸尽时取出，晾至6成干，切薄片晒干，或晒干捣碎。

延胡索每100kg，用米醋20kg。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/845203143023011040>