

2024 江苏省港闸区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库附答案（培优 A 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 不宜肌肉注射或直接静脉注射，滴注速度过快容易导致红人综合征的药物是

- A: 万古霉素
- B: 链霉素
- C: 磷霉素
- D: 阿奇霉素

答案：A

2. 无并发症的普通感冒一般几天后可痊愈

- A: 2~3 日
- B: 5~7 日
- C: 3~4 日
- D: 5~10 日

答案：B

3. 可迅速崩解和释放药物的制剂

- A: 膜剂
- B: 泡腾片剂
- C: 滴丸剂
- D: 透皮贴剂

答案：B

4. 下列药品中，新生儿局部应用过多可能导致中毒的是

- A: 硼酸
- B: 炉甘石
- C: 滑石粉
- D: 氧化锌

答案：A

5. 患儿，3 岁，因发热就诊，体温 38.8℃。药师应推荐的治疗药物是

- A: 布洛芬混悬液
- B: 20% 安乃近滴鼻剂
- C: 塞来昔布缓释片
- D: 阿司匹林肠溶片

答案：A

6. 患者，男，82 岁，诊断为帕金森病，给予左旋多巴联合卡比多巴治疗，产生的药物相互作用属于()

- A: 降低抗药性，疗效增加
- B: 增加靶器官药物浓度，药品不良反应减少
- C: 敏感化作用，药品不良反应增加
- D: 拮抗作用，药品不良反应增加

答案：B

7. 以下毒物中毒，清醒者适宜口服吐根糖浆催吐的是

- A: 磷化锌
- B: 氯硝西洋
- C: 阿米替林
- D: 苯巴比妥

答案：C

8. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

- A: 雌二醇一屈螺酮片
- B: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片
- C: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片
- D: 17 β 一雌二醇

答案：D

9. 最常见的急性肾盂肾炎致病菌是

- A: 大肠埃希菌
- B: 葡萄球菌
- C: 变形杆菌
- D: 粪肠球菌

答案：A

10. 同时服用有利于铁的吸收的药物是

- A: 维生素 C
- B: 维生素 A
- C: 维生素 D
- D: 维生素 B

答案：A

11. 一患者的肝功能检查结果是 ALT 与 AST 超过正常值，且 AST/ALT 之比值大于 1。此结果提示病人可能患

- A: 糖尿病
- B: 缺铁性贫血
- C: 肝硬化

D: 急性胰腺炎

答案：C

12. 属于雄激素受体拮抗剂，使增生的前列腺体积缩小的药品

A: 非那雄胺

B: 阿夫唑嗪

C: 氟他胺

D: 黄酮哌酯

答案：C

13. 患者，48 岁，胸痛部位在心前区，为压迫性疼痛，发作数秒钟，含服硝酸甘油 1~2 秒疼痛即消失。

A: 普伐他汀

B: 哌唑嗪

C: 曲美他嗪

D: 左旋氨氯地平

答案：D

14. 肝功能不全而肾功能正常的患者宜选用的药物是

A: 肝毒性小、经肾排泄的药物

B: 肾毒性小、经肝排泄的药物

C: 经肝肠循环消除的药物

D: 经肝肾双途径消除的药物

答案：A

15. 早期 AD 患者选用

A: 司来吉兰

B: 加兰他敏

C: 金刚烷胺

D: 普拉克索

答案: B

16. 饮食对粪外观的影响, 肉食

A: 酱色

B: 红色

C: 暗绿色

D: 黑褐色

答案: D

17. 半衰期 150-200h, 属于长效磺胺类药物是

A: 磺胺嘧啶

B: 替硝唑

C: 磺胺多辛

D: 磺胺甲噁唑

答案: C

18. 能够作为“药师参与临床药物治疗、提供药学服务的重要方式和途径”的工作内容是

A: 药物信息服务

B: 治疗药物监测

C: 静脉药物配置

D: 处方点评

答案: B

19. 对混合型血脂异常, 必须联用他汀类和贝特类, 最佳的给药方案是

A: 早晚联合服用他汀类和贝特类

- B: 晚上联合服用他汀类和贝特类
- C: 早晨用贝特类，晚上用他汀类
- D: 早晨用他汀类，晚上用贝特类

答案：C

20. 妊娠期应用可引起胎儿性发育异常的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 沙利度胺
- C: 叶酸拮抗剂
- D: 雌孕激素、雄激素

答案：D

21. 长期使用会产生耐受性，一般不适合作为胃食管反流病长期维持治疗的抑酸剂是

- A: 奥美拉唑
- B: 伊托必利
- C: 泮托拉唑
- D: 法莫替丁

答案：D

22. 患者，男，58岁，因心前区疼痛5年，加重伴呼吸困难入院。入院前6年常感心前区疼痛，疼痛性质系紧缩性或压迫感，多于劳累、餐后发作，每次持续3~5min，休息后减轻。入院检查：体温37.8℃，心率130次/分，血压80/40mmHg；呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻及湿啰音，心界向左侧扩大，心音减弱。入院诊断为冠心病。

- A: β 受体阻断剂、钙通道阻滞剂、ACEI/ARB
- B: 利尿药、长效二氢吡啶类钙通道阻滞剂、ACEI/ARB
- C: ACEI/ARB

D: 硝普钠、利尿药、ACEI/AR

答案：A

23. 餐中服用，可以减少对胃肠道刺激的药品是

A: 复方铝酸铋片

B: 二甲双胍片

C: 瑞舒伐他汀片

D: 甲氧氯普胺片

答案：B

24. 患者服用抗菌药物的适宜时间是

A: 餐中

B: 餐前

C: 清晨

D: 睡前

答案：B

25. 青蒿素与乙胺嘧啶联用增效的机制是

A: 延缓或降低抗药性

B: 作用于不同的靶点

C: 竞争性拮抗作用

D: 促进机体的利用

答案：A

26. 伴有高血压的患者应慎用的是

A: 阿司匹林

B: 含伪麻黄碱的复方制剂

C: 氯苯那敏

D: 对乙酰氨基酚

答案：B

27. 患者,女,46岁,高血压病史3年,2年前出现关节晨僵、手关节及膝关节疼痛,诊断为类风湿关节炎。半年前症状加重,采用了联合用药方案:患者用药如下:

A: 氨氯地平片

B: 羟氯喹片

C: 双氯芬酸钠缓释片

D: 甲氨蝶呤片

答案：B

28. 对肠道寄生虫具有神经肌肉阻滞作用,蛔虫产生痉挛性麻痹作用的是

A: 噻嘧啶

B: 枸橼酸哌嗪

C: 阿苯达唑

D: 甲苯咪唑

答案：A

29. (2016年真题)药库接收了一批药品,其中需要在冷处贮藏的是()。

A: 双歧三联活菌胶囊

B: 乳酶生片

C: 硫普罗宁片

D: 西地碘片

答案：A

30. 慢性肾盂肾炎时，尿中可见()。

- A: 血红蛋白尿
- B: 白细胞管型
- C: 乳糜尿
- D: 红细胞管型

答案：B

31. 便秘可选用的非处方药是

- A: 盐酸小檗碱
- B: 莫沙必利
- C: 酚酞
- D: 乳果糖

答案：D

32. 脾功能亢进可见的

- A: 白细胞减少
- B: 红细胞沉降率减慢
- C: 白细胞增多
- D: 淋巴细胞增多

答案：A

33. 多巴胺受体激动剂

- A: 左旋多巴
- B: 苯海索
- C: 恩托卡朋
- D: 司来吉兰

答案：A

34. 血清 γ -谷氨酰转移酶正常参考区间是

- A: 男性 $<40\text{U/L}$
- B: 男性 $11\sim 50\text{U/L}$
- C: 成人 $<40\text{U/L}$
- D: 成人 $<50\text{U/L}$

答案：B

35. 网站的内容是否及时更新，是衡量互联网信息的

- A: 新颖性
- B: 合理性
- C: 权威性
- D: 归因性

答案：A

36. 药师审核处方"用药与病症诊断不相符"工作中，所遇到的典型问题不包括

- A: 有禁忌证用药
- B: 联合用药
- C: 过度治疗用药
- D: 无适应证用药

答案：B

37. 患儿，男，6个月，体重 9.0kg ，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有乒乓球感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 10000IU
- B: 6000IU
- C: 4000IU

D: 400IU

答案：C

38. 应嘱咐患者避免冷饮冷食，避免暴露于低温或接触冰冷物体以防药物不良反应加重的是

A: 奥沙利铂

B: 卡铂

C: 卡培他滨

D: 顺铂

答案：A

39. “小檗碱、盐酸地芬诺酯、双八面体蒙脱石”用于细菌感染性腹泻，应评判为

A: 联合用药不适宜

B: 无适应证用药

C: 过度治疗用药

D: 有禁忌证用药

答案：A

40. 以下肌酸激酶检查值升高的临床意义中，最正确的是

A: 诊断痛风

B: 诊断急、慢性白血病

C: 诊断心肌梗死

D: 诊断恶性贫血

答案：C

41. 一日一次用药的外文规范缩写是

A: q. h

B: q. o. d

C: q. n

D: q. d

答案：D

42. 我国高警示药品推荐目录(2015 版)中，新遴选列入的药品种类是

A: 茶碱类药物(静脉途径)

B: 透皮贴剂

C: 肠内营养制剂

D: 中药注射剂

答案：A

43. 三环类抗抑郁药中毒应

A: 静脉注射毒毛花苷 K 或毛花苷丙

B: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃

C: 禁止使用肱类复能剂

D: 静脉滴注烟酰胺

答案：A

44. (2018 年真题) 瑞舒伐他汀钙的日剂量范围是 ()

A: 10~20mg

B: 5~20mg

C: 10~80mg

D: 40~200mg

答案：A

45. 其含量用生育酚当量(RE)表示的是

A: 维生素 E

- B: 维生素 C
- C: 维生素 D
- D: 维生素 B

答案：A

46. 非甾体类抗炎药导致消化性溃疡病的主要机制是（）

- A: 抑制胃酸分泌
- B: 破坏胃黏膜屏障
- C: 促进胃酸分泌
- D: 影响胃、十二指肠协调运动

答案：B

47. 哺乳期妇女应用后可使乳儿出现易激惹、尖叫、惊厥等神经系统症状，男婴则出现乳房增大的药物是

- A: 四环素
- B: 喹诺酮类药物
- C: 卡托普利
- D: 含雌、孕激素的避孕药

答案：D

48. 某患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊。临床处方：阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A: 单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药
- B: 应注意监测血压变化，防止血压过度降低
- C: 出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医
- D: 患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血

答案：A

49. 患者，男，66 岁，身高 170cm，体重 85kg，以“头晕、胸闷、乏力 1 周”为主诉入院治疗。空腹血糖 11.2mmol / L，餐后血糖 16.5mmol / L。诊断结果：2 型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍 0.5gbid、消渴丸 10 丸（规格 30g / 120 丸）bid、罗格列酮 4mgqd 治疗。

- A: 消渴丸
- B: 罗格列酮片
- C: 阿司匹林肠溶片
- D: 硝苯地平控释片

答案：B

50. 归属公共网络资源的是

- A: www.merck.com
- B: [www.google](http://www.google.com)
- C: www.cmt.com.cn
- D: www.ashp.org

答案：B

51. 服用维生素 B

- A: 食醋
- B: 食盐
- C: 酒
- D: 脂肪

答案：C

52. 长期、大量使用可对肝脏造成不可逆性损伤的药物是

- A: 塞来昔布
- B: 布洛芬
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 阿司匹林

答案: C

53. 抗结核联合治疗方案中可出现橘红色尿的药物是()

- A: 乙胺丁醇
- B: 左氧氟沙星
- C: 利福平
- D: 吡嗪酰胺

答案: C

54. 可引起眩晕或幻觉的药物是

- A: 东莨菪碱
- B: 右美沙芬
- C: 氯苯那敏
- D: 阿米洛利

答案: B

55. 醛固酮受体拮抗剂螺内酯久用引起的主要不良反应是

- A: 低钾血症
- B: 多毛症
- C: 高钾血症
- D: 水肿

答案: C

56. 适用于各型癫痫的药物

- A: 丙戊酸钠
- B: 苯妥英钠
- C: 拉莫三嗪
- D: 卡马西平

答案：A

57. 脂质体药物属于

- A: C 级高危药品
- B: D 级高危药品
- C: E 级高危药品
- D: B 级高危药品

答案：A

58. 在指导合理用药时，应交代宜在睡前服用的药物是()

- A: 硫酸亚铁
- B: 双磷酸盐
- C: 苯妥英钠
- D: 辛伐他汀

答案：D

59. 主要检查性状一致、色泽均匀、片面光滑、无毛糙起孔现象的是

- A: 软膏剂
- B: 糖浆剂
- C: 胶囊剂
- D: 片剂

答案：D

60. 患者女 45 岁，既往有心律失常(Q-T 间期延长)、低钾血症近日因发热、咳嗽、咳痰就诊，诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是()

- A: 头孢呋辛酯
- B: 莫西沙星
- C: 氨溴索
- D: 阿莫西林

答案：B

61. 研究的来源和目的的描述是否清楚是评价

- A: 讨论
- B: 前言
- C: 摘要
- D: 结果

答案：B

62. 告知"人促红素可引起纯红细胞再生障碍性贫血"属于

- A: 药品不良反应
- B: 禁忌证
- C: 新药信息
- D: 药物相互作用

答案：A

63. 关于头痛、偏头痛、紧张性头痛、三叉神经痛的药物治疗(对症治疗),对钝痛如牙痛、头痛、神经痛等有较好的镇痛效果的是

- A: 乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林等
- B: 推荐应用地西泮(安定)片
- C: 一般可首选对乙酰氨基酚，推荐合并应用谷维素、维生素 B1

D: 服用麦角胺咖啡因片、罗通定片、天麻素、苯噻啉、舒马曲坦、佐米曲坦

答案：A

64. 对沙眼衣原体有强大抗菌作用的药品是

- A: 硫酸锌滴眼液
- B: 酞丁安滴眼液
- C: 红霉素眼膏
- D: 磺胺醋酰钠滴眼液

答案：C

65. 采用锐器或指甲划过皮肤后，沿着划痕发生条状淡红色隆起，伴有瘙痒，常并发荨麻疹

- A: 冷性荨麻疹
- B: 人工荨麻疹
- C: 幼小荨麻疹
- D: 热性荨麻疹

答案：B

66. 氨基糖苷类抗生素肾毒性大小的次序为. ()。

- A: 新霉素>阿米卡星>链霉素>妥布霉素
- B: 新霉素>阿米卡星>妥布霉素>链霉素
- C: 阿米卡星>新霉素>妥布霉素>链霉素
- D: 庆大霉素>新霉素>妥布霉素>链霉素

答案：B

67. 药品质量缺陷，包括

- A: 药品名称形似

- B: 须冷藏药品
- C: 药品名称音似
- D: 片剂药品受潮裂片

答案: D

68. 糖尿病患者一旦出现尿酮体阳性，可以提示患者

- A: 胰岛素分泌过度
- B: 病情尚未控制
- C: 生长激素分泌过度
- D: 伴甲状腺功能亢进

答案: B

69. 下列药源性疾病中，其诱因主要是“基础疾病因素”的是

- A: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病
- B: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强
- C: 新生儿体内蓄积氯霉素呈现灰婴综合征
- D: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

答案: A

70. 相互作用使不良反应减少的联合用药是

- A: 阿托品联用氯磷定
- B: 阿托品联用吗啡
- C: 苄丝肼联用左旋多巴
- D: 普萘洛尔联用美西律

答案: B

71. 肠外营养液中 1g 氮能提供的热量是

- A: 4kcal

B: 7kcal

C: 3kcal

D: 9kcal

答案：A

72. 一个安全、有效、稳定、经济的药品，其基本前提必须是

A: 有明确的适应证

B: 临床急需

C: 有明确的使用对象

D: 质量合格

答案：D

73. 开发药品计算机管理系统，自动检测药品剂量、过敏证、禁忌证和药物相互作用等方面信息，归属

A: 知识培训

B: 环境与流程的优化与持续改进

C: 管理规范到位

D: 科学发展

答案：B

74. 提示"药物都应保存在原始包装中，并不要将瓶外的标签撕掉"，是针对

A: 特殊剂型用法

B: 药品有效期

C: 特殊装置药品

D: 药品贮存

答案：D

75. 脑梗死的分期，急性期

- A: 1~6 个月
- B: 1 个月内
- C: 15 天
- D: 2~3 个月

答案：B

76. 从事药学服务的药师应具备较好的投诉应对能力。正确妥善地应对投诉的重要意义是

- A: 警惕与防范用药错误
- B: 增进患者对药师工作的信任
- C: 使患者获得有关用药的指导
- D: 提高用药顺应性

答案：B

77. 治疗腹痛较重或反复呕吐性腹泻宜选用的药物是

- A: 泛昔洛韦
- B: 山莨菪碱
- C: 双歧杆菌
- D: 庆大霉素

答案：B

78. 是前药，其活性代谢产物是强效的选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂，通常用于甲型或乙型流感病毒治疗的是

- A: 奥司他韦
- B: 更昔洛韦
- C: 氟胞嘧啶
- D: 干扰素

答案：A

79. 处方中“合剂”的规范书写是

A: Mist

B: Dil

C: Liq

D: Dos

答案：A

80. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为

A: 溶栓前 12h

B: 溶栓后 12h

C: 溶栓同时

D: 溶栓后 24h

答案：D

81. 餐前服用，可以充分附着于胃壁粘膜的药品是

A: 甲氧氯普胺片

B: 二甲双胍片

C: 瑞舒伐他汀片

D: 复方铝酸铋片

答案：D

82. (2021 年真题) 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

A: 加巴喷丁胶囊

B: 双氯芬酸钠缓释片

C: 吗啡控释片

D: 颠茄片

答案: B

83. 按上述方案治疗 3 个月后, 查空腹血糖 7.5mmol/L, 餐后血糖 12.2mmol/L 糖化血红蛋白 7.0%。该患者经常出差, 进食不规律, 希望选择每日使用一次的降糖药。宜选用的药物是 ()

A: 二甲双胍片

B: 格列美脲片

C: 阿卡波糖片

D: 瑞格列奈片

答案: B

84. 下列药品宜冷处贮藏但不应冷冻的是:

A: 双歧三联活菌制剂

B: 卡前列甲酯栓剂

C: 氯化钠注射液

D: 甘露醇注射剂

答案: A

85. 下列药物中, 属于弱阿片类药物的为

A: 美沙酮

B: 吗啡

C: 曲马多

D: 哌替啶

答案: C

86. 男性，45 岁。反复发生夜间呼吸困难 1 个月，加重一天就诊，体格检查：血压 180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 泼尼松
- B: 氨茶碱
- C: 痰液稀释剂
- D: 吗啡

答案：B

87. 当药品存在安全隐患，需要进行召回时，决定召回药品的名称、规格、生产商、召回范围、召回级别、主要执行者等事宜的相关人员应该是

- A: 药品质量安全管理小组成员
- B: 业务院长
- C: 药剂科负责人
- D: 质量部人员

答案：A

88. 长期服用避孕药

- A: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉
- B: 可导致驾驶员多尿或多汗
- C: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难
- D: 可使驾驶员出现定向力障碍

答案：D

89. 配制 10%葡萄糖注射液 500ml，现用 50%和 5%的葡萄糖注射液混合，需要

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 50%葡萄糖注射液 94ml 和 5%葡萄糖注射液 406ml

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/845342201114012033>