

口腔内科测试题+答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、乳磨牙邻面龋备洞时，哪项是错误的

- A、龈壁应水平
- B、轴壁应与水平面垂直
- C、轴髓壁与合髓壁的线角应圆钝
- D、龋蚀接近合面时可不做台阶
- E、鸠尾岬宽度是颊舌尖间距离的 1 / 3

正确答案：B

2、更易患口腔念珠菌病的人群为

- A、长期大量应用抗生素者
- B、嗜烟者
- C、更年期妇女
- D、患有胆道疾病者
- E、嗜酒者

正确答案：A

3、干髓术的治疗原理主要要保留的牙髓是

- A、分解的根髓
- B、感染的牙髓
- C、健康的根髓
- D、成形的根髓
- E、感染的冠髓

正确答案：D

4、根管治疗中最严重的并发症是

- A、侧穿根管壁
- B、器械折断根管内
- C、器械落入消化道
- D、器械落入呼吸道
- E、疼痛

正确答案：D

5、以下粘膜病愈合后，哪些可形成明显疤痕组织

- A、腺周口疮与带状疱疹
- B、腺周口疮与结核性溃疡
- C、腺周口疮与重型多形红斑

D、腺周口疮与良性粘膜类天疱疮

E、腺周口疮与寻常型天疱疮

正确答案：D

6、复发性口腔溃疡在临床上可分为以下几种

A、充血型、溃疡型、坏死型

B、轻型、中型、重型

C、溃疡型、疱疹型、坏死型

D、普通型、严重型、特殊型

E、轻型、疱疹型、重型

正确答案：E

7、患者女，27岁。左上第一磨牙深龋，去腐质后未穿髓，垫底作银汞合金充填，最适合的垫底材料是

A、聚羧酸锌黏固粉

B、磷酸锌黏固粉

C、氧化锌丁香油黏固粉

D、EDTA

E、氢氧化钙

正确答案：A

8、消除病因阶段的治疗，除了

A、口腔卫生指导

B、暂时性固定松动牙

C、消除龈上、下菌斑及牙石

D、牙周手术

E、纠正食物嵌塞，合创伤

正确答案：D

9、患者主诉16阵发性自发痛，医生检查作温度测验时应如何进行？

A、先测正常的左上第一磨牙

B、先测正常的右上前磨牙

C、先测患病的右上第一磨牙

D、先测正常的右下第一前磨牙

E、先测正常的右下第一磨牙

正确答案：A

10、临床上常见的是哪一类根尖周炎

A、根尖脓肿

- B、急性根尖周炎浆液期
- C、急性根尖周炎化脓期
- D、慢性根尖周炎
- E、急性根尖周炎

正确答案：D

11、预防氟斑牙最根本的方法是

- A、改变居民用燃料的类别
- B、改变当地人主食的种类
- C、改变当地空气中氟含量
- D、改良当地食用植物品种
- E、改良水源降低氟摄入量

正确答案：E

12、影响牙周病的系统疾病有，除外

- A、甲亢
- B、肝硬化
- C、糖尿病
- D、肺结核
- E、冠心病

正确答案：D

13、无瘘型慢性根尖脓肿诊断的主要依据是

- A、牙髓无活力
- B、叩诊轻度不适
- C、x线根尖周透射区边缘模糊
- D、龋洞已穿髓
- E、牙冠变色

正确答案：C

14、FC活髓切断时去除牙髓组织的量是

- A、露髓点周围4mm范围内的牙髓
- B、冠髓的上半部分
- C、牙冠颈部缩窄以上的全部牙髓
- D、根分歧以上的全部牙髓
- E、每一个根管口以上的牙髓

正确答案：E

15、治疗后的牙周病复发机会最小的，最可能在哪一种情况

- A、定期调合者
- B、菌斑控制良好者
- C、每6个月做一次洁治者
- D、每1年做1次洁治、调合者
- E、定期拍X线片

正确答案：B

16、以下肾上腺皮质激素类药物局部注射可治疗的疾病是

- A、雪口病
- B、结核性溃疡
- C、腺周口疮
- D、疱疹性口炎
- E、以上均不是

正确答案：C

17、患者8岁，上前牙外伤1小时就诊，查：21牙冠变短，切缘低于对侧同名牙2mm，叩诊(+)，牙龈撕裂，该牙正确的处理是

- A、拉出复位固定
- B、根管治疗
- C、拔除
- D、任其自然萌出
- E、以上均不对

正确答案：D

18、猛性龋的临床表现如下，除外

- A、龋蚀进展迅速
- B、龋腐质常干硬
- C、累及多个牙面
- D、全身多有疾病
- E、常侵犯全口牙

正确答案：B

19、活髓切断术成功的关键因素是

- A、无菌操作
- B、去尽腐质
- C、止血彻底
- D、髓室顶揭除完全
- E、放置盖髓剂

正确答案：A

20、根管充填时根充剂应距根尖

- A、0.1~0.2mm
- B、2.5~3mm
- C、0.1~0.4mm
- D、0.2~0.3mm
- E、0.5~2mm

正确答案：E

21、白细胞毒素是由下列哪一种牙周细菌所产生

- A、齿垢密螺旋体
- B、二氧化碳噬纤维菌
- C、伴放线放线杆菌
- D、广溶血性链球菌
- E、牙龈卟啉单胞菌

正确答案：C

22、常用于根管机械预备的器械为

- A、根管钻和根管锉
- B、金刚砂钻和根管锉
- C、扩孔钻和螺旋充填器
- D、根管钻和冲洗器
- E、拔髓针和光滑髓针

正确答案：A

23、患者男。38岁。吸烟10年，已戒烟1年。检查，双颊黏膜及舌背黏膜有片状白色均质的斑块，表面高低不平，质地稍硬。不能被擦掉。该患者白色病损最可能的临床诊断是

- A、白色水肿
- B、白斑
- C、假膜型念珠菌病
- D、皮脂腺异位
- E、扁平苔藓

正确答案：B

24、对牙髓疾病临床上热诊常用的方法正确的是

- A、热牙胶
- B、热水

- C、加热的金属器械
- D、橡皮轮打磨生热法
- E、以上都是

正确答案：A

25、问诊的内容应包括

- A、现病史、既往史、疾病发生过程
- B、主诉、治疗史、既往史、家族史
- C、主诉、疾病发生情况
- D、主诉、现病史、既往史、治疗史
- E、主诉、现病史、既往史、家族史

正确答案：E

26、颞下部皮肤发生带状疱疹，说明损害累及三叉神经哪一支

- A、第二支
- B、第一支
- C、第三支
- D、第二支及第三支
- E、第一支及第二支

正确答案：A

27、以下哪一种牙龈病最常见

- A、慢性龈缘炎
- B、急性坏死溃疡性龈炎
- C、牙龈瘤
- D、急性龈乳头炎
- E、妊娠期龈炎

正确答案：A

28、氯喹的主要副反应为

- A、心率失常，心跳骤停
- B、肾肝功能损害
- C、白细胞减少
- D、不可逆性失明与耳聋
- E、胃肠道反应

正确答案：D

29、不适用于根管荡洗的溶液有

- A、2%氯亚明

- B、30%过氧化氢
- C、生理盐水
- D、5. 25%次氯酸钠
- E、3%过氧化氢

正确答案：B

30、下列各项为口角炎常见临床表现，除了

- A、粘膜丘疹
- B、皮肤、粘膜充血
- C、口角糜烂
- D、口角皲裂
- E、口角湿白

正确答案：A

31、采用局部控释给药优势，除外

- A、口腔中维持浓度时间较长
- B、龈沟局部浓度高
- C、使用剂量小
- D、病人使用方便
- E、副作用小

正确答案：D

32、牙本质过敏症的发病机制被认为是

- A、蛋白溶解学说
- B、液体动力学说
- C、化学细菌学说
- D、体液学说
- E、活体学说

正确答案：B

33、下列哪项属于非自伤性溃疡

- A、褥疮性溃疡
- B、自伤性溃疡
- C、化学灼伤性溃疡
- D、热损伤性溃疡
- E、以上均是

正确答案：A

34、均能引起四环素牙的药物有

- A、庆大霉素和青霉素
- B、多西环素和链霉素
- C、氯霉素和林可霉素
- D、四环素和先锋霉素
- E、土霉素和去甲金霉素

正确答案：E

35、根管治疗的非适应证是

- A、牙髓坏死
- B、急性根尖周炎
- C、牙周牙髓联合病变
- D、根管闭锁的根尖周炎
- E、慢性根尖周炎

正确答案：D

36、患牙咬合面有深的龋洞，平时没有疼痛，有食物嵌入后剧烈疼痛。探诊可探及穿髓孔引起剧烈的疼痛，叩诊患牙有不适感，表明：

- A、慢性牙髓炎
- B、牙髓坏死
- C、牙髓正常
- D、可复性牙髓炎
- E、牙髓钙化

正确答案：A

37、急性化脓性牙髓炎可出现的症状，除外

- A、热刺激使疼痛加剧
- B、叩诊不适
- C、热刺激痛，冷水可缓解
- D、可有搏动性跳痛
- E、冷刺激使疼痛加剧

正确答案：E

38、与口腔白斑病发病无关的因素有

- A、微循环障碍
- B、遗传素质
- C、超敏反应
- D、念珠菌感染
- E、吸烟等理化刺激

正确答案：C

39、与牙周组织破坏关系最为密切的菌斑是

- A、非附着菌斑
- B、龈上菌斑
- C、颈沿菌斑
- D、龈下菌斑
- E、附着菌斑

正确答案：A

40、不属于自我控制菌斑的方法有

- A、漱口
- B、洁治
- C、牙线的使用
- D、牙签的使用
- E、刷牙

正确答案：B

41、表示牙髓活力测验结果时，下列哪项是错误的

- A、无反应
- B、(-)
- C、迟钝
- D、正常
- E、敏感

正确答案：B

42、牙线的使用，哪一项不正确

- A、有蜡和无蜡牙线效率无明显差别
- B、牙线可用于固定桥的清洁
- C、牙线能最有效地去除牙邻面菌斑
- D、牙线主要目的是去除邻面菌斑
- E、牙线只适用于牙周病人

正确答案：E

43、治疗创伤性溃疡的首要措施是

- A、局部封闭
- B、全身使用肾上腺皮质激素
- C、理疗
- D、局部使用抗生素

、尽快去处刺激因素

正确答案：E

44、下述哪一项不是判断乳牙接近替换期的表现

- A、恒牙胚牙根已形成一半
- B、临床III° 松动
- C、牙冠破坏大
- D、恒牙胚位置已接近乳牙根分叉
- E、乳牙根吸收已达 1 / 2

正确答案：C

45、雪口的致病微生物是：

- A、白色念珠菌
- B、葡萄球菌
- C、黄曲霉菌
- D、克柔氏念珠菌
- E、热带念珠菌

正确答案：A

46、组织学表现为恶性者所占比例很高的疾病是

- A、白斑
- B、扁平苔藓
- C、慢性盘状红斑狼疮
- D、红斑
- E、口腔黏膜下纤维化

正确答案：D

47、临床上 I 类洞指的是

- A、所有牙面发育点裂隙沟的龋损所备成的窝洞
- B、发生于后牙邻面的龋损所备成的窝洞
- C、前牙邻面未累计切角的龋损所备成的窝洞
- D、发生在前牙切嵴和后牙牙尖等自洁区的龋损所备成的窝洞
- E、以上都是

正确答案：A

48、临床通常掌握的根管充填的时机，除外

- A、无自觉症状
- B、无大量渗出液和急性根尖周症状缓解
- C、根管内细菌培养阴性

、无叩痛

E、无气味

正确答案：C

49、菌斑形成过程不包括

A、菌斑成熟

B、钙盐沉积

C、细菌初期聚集

D、细菌迅速生长繁殖

E、获得性膜的形成

正确答案：B

50、龈上洁治术中哪项不必要

A、仔细探查牙面的位置

B、调整好体位

C、使用手指和手腕的动作

D、刀刃与牙面成 80° 角

E、支点稳定

正确答案：A

51、临床常用的根管消毒方法是

A、电解消毒

B、微波消毒

C、药物消毒

D、超声消毒

E、激光消毒

正确答案：C

52、患者男，12岁。2天前碰伤1B，牙轻度松动，自觉有伸长感，检查牙髓活力实验同正常牙，轻叩痛，诊断为

A、牙震荡

B、牙周炎

C、牙髓坏死

D、牙轻度脱位

E、根折

正确答案：A

53、热刺激的温度应高于

A、 30°C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/846011144023010225>