

护理〔西医护理综合 20121209〕

1. 在短期血压明显升高，出现头痛、呕吐等病症〔〕

- A. 高血压危象
- B. 高血压脑病
- C. 顽固性高血压
- D. 恶性高血压
- E. 老年高血压

正确答案：A

答案解析：

高血压危象；病人表现为头痛、烦躁、眩晕、恶心、呕吐、心悸、胸闷、气急、视力模糊等严重病症，以及伴有动脉痉挛累及靶器官缺血病症。

2. 缺铁性贫血病人可见〔〕

- A. 血白蛋白显著下降
- B. 尿胆红素强阳性
- C. 血钾降低
- D. 白细胞总数升高，中性粒细胞增多
- E. 网织红细胞增多

正确答案：E

答案解析：

解析：网织红细胞增多见于各种贫血，如溶血性贫血、出血性贫血、缺铁性贫血及巨幼红细胞性贫血经补充有关物质后。

3. 对肺结核病人的安康指导最重要的是〔〕

- A. 保持乐观情绪和治疗信心
- B. 加强营养，保证心身休息
- C. 定期复查，根据病情调整治疗方案
- D. 尽可能与家人分室或分床就寝
- E. 按医嘱规则服药，坚持疗程

正确答案：E

答案解析：

解析：催促肺结核病人坚持规则、全程化疗是最重要的教育容，不规则用药或过早停药是治疗失败的主要原因。

4. 女士，因支气管哮喘发作入院。现气短不能平卧，咳嗽，痰黏，不易咯出。护理措施不妥的是〔〕

- A. 取半卧位
- B. 帮助翻身拍背
- C. 超声雾化吸入
- D. 鼓励多饮水
- E. 低流量鼻导管吸氧

正确答案：C

答案解析：

协助排痰：痰液黏稠时多饮水，每日进液量至少为1500ml，定期为病人翻身、拍背，促使痰液排出。哮喘病人不宜用超声雾化吸入，因雾液刺激可使支气管痉挛，

使哮喘病症加重。

5. 王先生，65岁，因慢性支气管炎、肺部感染、呼吸衰竭入院。护理体检：气促，不能平卧，痰黏呈黄色，不易咳出。测血气分析氧分压5.3kPa，血二氧化碳分压10.8kPa。帮助该患者排痰，以下哪种措施较好〔〕

- A. 超声雾化吸入
- B. 定时翻身拍背
- C. 鼓励用力咳嗽
- D. 鼻导管吸痰
- E. 体位引流

正确答案：C

答案解析：

解析：及时去除痰液，清醒病人鼓励多饮水，用力咳痰；咳嗽无力者定时协助翻身、拍背，促进排痰；对昏迷病人可机械吸痰，保持呼吸道通畅。

6. 最危重的心律失常是〔〕

- A. 心房颤抖
- B. 心室颤抖
- C. 室上性心动过速
- D. 房性心动过速
- E. 房室传导阻滞

正确答案：B

答案解析：

解析：室颤是致死性心律失常，是最危重的心律失常。

7. 以下对心律失常患者进展的安康教育中哪项不妥〔〕

- A. 少量多餐、禁烟酒
- B. 选择高脂、高热量、刺激性食品以促进食欲
- C. 注意休息、劳逸结合
- D. 防治原发病、防止诱因
- E. 遵医嘱服用抗心律失常药物

正确答案：B

答案解析：

解析：心律失常患者中多见冠状动脉粥样硬化，故不可食高脂、高热量食物。另外，刺激性食品易引起心律失常加重，故最好不用。

8. 最常见的诱发和加重心力衰竭的因素是〔〕

- A. 劳累
- B. 情绪冲动
- C. 心律失常
- D. 呼吸道感染
- E. 输液过多过快

正确答案：D

答案解析：

解析：以上因素均能诱发心力衰竭，但以呼吸道感染最常见。

9. 男性患者，68岁，突起剧烈压榨样胸痛，呕吐伴窒息

感 2h 入院，查心率 110 次/min，血压 85/60mmHg，心电图示 V1-V4 导联 ST 段呈弓背向上抬高，律不齐。对该患者的处理原则不包括 []

- A. 心电监护
- B. 消除恶性心律失常
- C. 减轻疼痛
- D. 抗凝治疗
- E. 扩容升压

正确答案：E

答案解析：

解析：该题考察心肌梗死病人的处理原则。急性心梗病人应卧床休息，进展心电监护，注意观察病人心电图，及时发现并消除危险的心律失常；对于病人首要的病症是疼痛，应给予吗啡迅速止痛，心梗发作时间缺乏 6h 的，具有溶栓指征的应给予溶栓和抗凝治疗。心梗疼痛时可有血压的下降，如果疼痛消除后收缩压仍低于 80mmHg，才可能是出现了心源性休克，否则不必急于扩容扩压。

10. 患者女性，50 岁。因“先天性心脏病、心房纤维颤动、左侧肢体偏瘫”收住院。该患者常见的脉搏为 []

- A. 洪脉
- B. 速脉
- C. 短绌脉
- D. 缓脉
- E. 丝脉

正确答案：C

答案解析：

解析：房颤患者的脉率低于心率，是典型的短绌脉。

11. 护理急性肺水肿病人，哪项措施是错误的 []

- A. 静脉滴注给药宜快速
- B. 6~8L/min 酒精湿化吸氧
- C. 守护病人，减轻精神压力
- D. 安置病人两腿下垂坐位
- E. 建立静脉通路

正确答案：A

答案解析：

解析：要缓解急性肺水肿的病症，需要减少回心血量，因此滴注液体时速度应慢。

12. 功能性腹泻主要见于 []

- A. 胃酸缺乏症
- B. 慢性胰腺炎
- C. 慢性胆囊炎
- D. 结肠过敏
- E. 食物中毒

正确答案：D

答案解析：

解析：腹泻包括急性腹泻和慢性腹泻，慢性腹泻又分为肠

源性，胃源性、胰源性、肝胆疾病和功能性腹泻。胃酸缺乏症为胃源性；慢性胰腺炎为胰源性；慢性胆囊炎为肝胆疾病；食物中毒见于急性腹泻。

13. 先生，50 岁，因肝硬化、食道静脉曲张、腹水入院治疗。放腹水后出现精神错乱、幻觉，伴有扑翼样震颤、脑电图异常等肝昏迷表现。对此病人的护理错误的选项是 []

- A. 忌食蛋白质
- B. 防止感染
- C. 放大量腹水
- D. 安眠药禁用或慎用
- E. 便秘时弱酸溶液洗肠

正确答案：C

答案解析：

解析：快速利尿和大量放腹水都会进一步诱发肝性脑病。

14. 患者女性，65 岁，有肝硬化病史 5 年，因饮食不当出现呕血、黑便 1 天入院，呕吐暗红色液体 3 次，量约 800ml，解黑便 2 次，量约 500g。查体：体温 37.8℃，脉搏 120 次/min，呼吸 22 次/min，血压 85/60mmHg，精神萎靡，面色苍白，四肢湿冷，医嘱予以输血 800ml。该患者出血最可能的原因为 []

- A. 胃溃疡
- B. 十二指肠球部溃疡
- C. 急性糜烂出血性胃炎
- D. 食管胃底静脉曲张破裂
- E. 胃癌

正确答案：D

答案解析：

解析：肝硬化患者胃底静脉曲张，饮食不当时容易破裂出血。

15. 患者女性，28 岁，全身重度水肿，24 小时尿蛋白 6.8g，血白蛋白 20g/L，血压 104/70mmHg，尿素氮 8.9mmol/L，SCr100/μmol/L。首选的治疗措施是 []

- A. 输清蛋白
- B. 输新鲜血浆
- C. 应用呋塞米
- D. 应用糖皮质激素
- E. 应用环磷酰胺

正确答案：D

答案解析：

解析：该患者为肾病综合征，首选治疗是应用糖皮质激素。

16. 有关泌尿系统疾病病症的描述，不正确的选项是 []

- A. 肾性高血压多数为容量依赖性的
- B. 夜尿增多常是肾浓缩功能减退的早期表现
- C. 肾性水肿常发生在身体下垂部位
- D. 肾区疼痛多由于肾包膜受牵拉所致
- E. 尿路刺激征常为膀胱三角区及膀胱颈受刺激所致

正确答案：C

答案解析:

解析:肾性水肿好发于组织疏松部位,如眼睑、颜面部;心源性水肿好发于身体下垂部位,如站立者好发于下肢,长期平卧者好发于骶尾部。

17.女,50岁,因患尿毒症而入院。患者精神萎靡,食欲差,24h尿量80ml,下腹部空虚,无胀痛。请评估病人目前的排尿状况是〔〕

- A.尿潴留
- B.尿失禁
- C.少尿
- D.无尿
- E.多尿

正确答案: D

答案解析:

解析:每日尿量少于400ml为少尿;少于100ml为无尿。

18.男,34岁。血压持续增高1年以上,中度浮肿,尿蛋白常++~+++ ,管型+。最可能诊断为〔〕

- A.急性肾炎
- B.慢性肾小球肾炎
- C.慢性肾盂肾炎
- D.输尿管结石
- E.肾结核

正确答案: B

答案解析:

解析:慢性肾小球肾炎多见于青中年男性,病程迁延1年以上,主要临床表现为血尿、轻中度蛋白尿、水肿和高血压,实验室检查尿蛋白〔+~+++〕,可以见到管型,且以蛋白尿为特征表现。所以此题符合慢性肾小球肾炎的诊断。

19.丁先生,50岁,急性肾衰少尿期。治疗7天后,患者尿量开始增加,最多每天4000ml/d,患者出现腹胀、双下肢无力,膝腱反射减弱,可能出现了什么问题〔〕

- A.高血钾症
- B.低血钾症
- C.水中毒
- D.酸中毒
- E.尿毒症

正确答案: B

答案解析:

解析:在多尿期开始,由于尿量增加,钾离子随尿液丧失增多,导致可能出现低血钾的情况,血钾降低后可能会出现腹胀、双下肢无力及膝腱反射减退等表现。

20.患儿,女,33周早产,出生体重2100g,生后用婴儿配方奶粉喂养,食欲佳,目前检查Hb100g/L, RBC $2.8 \times 10^{12}/L$ 。给予该患儿补充铁剂治疗,对铁剂服用指导中错误的选项是〔〕

- A.在饭前服用
- B.应从小剂量服用
- C.长期服用会致铁中毒
- D.可与维生素C服用
- E.铁剂补充至Hb正常后2个月左右停用

正确答案: A

答案解析:

解析:铁剂会有胃肠道刺激,所以必须在饭后服用。

21.对肾盂肾炎病人的安康教育不正确的选项是〔〕

- A.鼓励多饮水、少憋尿
- B.防止劳累及便秘
- C.保持会阴部清洁,制止盆浴
- D.治愈后仍需长期用小剂量抑菌药物预防
- E.保证休息和睡眠,注意补充营养

正确答案: D

答案解析:

解析:肾盂肾炎的诱因主要有劳累、感冒、会阴部不清洁及性生活等,教育患者每天清洗会阴部。防止过度劳累,多饮水、少憋尿是简便而有效的预防措施。如果与性生活有关,可在性生活后排尿,并口服抗生素药物。

22.*贫血病人,疑为患白血病,最重要的检查是〔〕

- A.血象检查
- B.出血时间测定
- C.骨髓检查
- D.血小板计数
- E.网织红细胞计数

正确答案: C

答案解析:

解析:确诊白血病最重要的检查是骨髓检查。

23.患者男性,20岁。阵发性腹痛,黑便2日。体检:双下肢可见散在皮肤瘀点,双膝关节肿胀,活动受限,腹软,右下腹压痛。血象:血小板计数 $142 \times 10^9/L$,尿常规:蛋白〔+〕,红细胞10-15/HP,透明管型0~3个/HP。其最可能患的疾病为〔〕

- A.急性肠胃炎
- B.上消化道出血
- C.急性肾炎
- D.过敏性紫癜
- E.急性阑尾炎

正确答案: D

答案解析:

解析:根据患者的表现如腹痛、黑便、双下肢皮肤瘀点,膝关节肿胀、血小板计数等可推断该患者最可能患的疾病是过敏性紫癜。

24.有关Graves病的病因,以下表达正确的选项是〔〕

- A.与遗传、免疫均有关

- B.与遗传有关，与免疫无关
- C.与免疫有关，与遗传无关
- D.由病毒引起
- E.由手术引起

正确答案：A

答案解析：

解析:Graves 病即弥漫性甲状腺肿伴甲状腺功能亢进症，病因发病机制尚未完全说明，但已明确与自身免疫及遗传因素有关。

25.以下哪项不是甲状腺功能亢进症的常见典型表现〔〕

- A.黏液性水肿
- B.甲状腺弥漫性肿大
- C.眼球突出
- D.怕热、多汗
- E.心动过速

正确答案：A

答案解析：

解析:甲亢的典型表现包括高代谢综合征、甲状腺肿大及突眼征等。黏液性水肿为甲状腺功能低下的典型表现。

26.一昏迷病人由警察送来急诊，无法询问病史，但病人呼吸有烂苹果味。可拟诊何病〔〕

- A.酒醉
- B.有机磷农药中毒
- C.糖尿病酮症酸中毒
- D.蛛网膜下腔出血
- E.癔症

正确答案：C

答案解析：

解析:此题考察糖尿病酮症酸中毒的临床表现，即呼吸有烂苹果味〔丙酮的气味〕，酒精病人有酒味，有机磷中毒病人呼吸有大蒜味，癔症和蛛网膜下腔出血病人呼吸没有气味。

27.类风湿性关节炎的关节病症，具有特征性的是〔〕

- A.肿胀明显
- B.局部发热
- C.晨起僵硬
- D.疼痛明显
- E.关节发红

正确答案：C

答案解析：

解析:病变的关节在静止不动后可出现半小时甚至更长时间的僵硬，活动受限，适度活动后逐渐减轻，尤以晨起时最明显，称为晨僵。晨僵的程度和持续时间可作为判断病情活动度的指标。

28.*急性脑出血病人，头痛，恶心，喷射性呕吐，呼吸快而不规则，血压明显增高，意识障碍。哪项护理措施对该

病人不适用〔〕

- A.绝对安静卧床 4 周以上
- B.每 2h 翻身一次，预防褥疮
- C.及时去除口腔分泌物和呕吐物
- D.头部略抬高，稍向后仰
- E.假设 48h 后病情稳定，可进食流食

正确答案：B

答案解析：

解析:脑出血病人应绝对卧床休息，发病 24~48h 防止搬动患者，患者侧卧位，头部稍抬高，以免颅静脉回流，从而减轻脑水肿。

29.关于脑膜炎球菌错误的选项是〔〕

- A.在常见菌群中，C 群致病力最强，B 群次之，Y 群最弱
- B.在体外生活力及抵抗力较强
- C.营养要求高，常用巧克力色血平板
- D.使用适宜的培养基，在 5%~10%CO₂、pH7.4~7.6 时最易生长
- E.对磺胺药耐药以 C、B 群最严重，A 群亦在增加

正确答案：B

答案解析：

解析:脑膜炎球菌抵抗力弱，对寒冷、日光、热力、枯燥、紫外线及一般消毒剂均敏感。

30.菌痢的病变部位主要位于〔〕

- A.结肠和空回肠
- B.结肠
- C.回盲部
- D.回肠
- E.乙状结肠与直肠

正确答案：E

答案解析：

解析:菌痢的病变部位主要位于乙状结肠与直肠。

31.以下哪一个不是血吸虫病的受累器官〔〕

- A.肝脏
- B.肠
- C.心脏
- D.脑
- E.肺

正确答案：C

答案解析：

解析:心脏不是受累器官，其余都是。

32.肺癌中恶性度最高的是〔〕

- A.鳞状上皮细胞癌
- B.小细胞未分化癌
- C.大细胞未分化癌
- D.腺癌
- E.细支气管肺泡癌

正确答案: B

答案解析:

鳞状上皮细胞癌生长缓慢,转移较晚,手术切除时机相对较多,5年生存率也高,排除鳞状上皮细胞癌;大细胞未分化癌恶性度较高,但转移较小细胞未分化癌晚,手术切除时机相对较大,排除大细胞未分化癌;腺癌出现病症相对较晚,恶性度介于鳞癌与小细胞未分化癌之间,排除腺癌;细支气管肺泡癌是腺癌的一个亚型,排除细支气管肺泡癌;小细胞未分化癌细胞质含有神经分泌颗粒,可引起异位分泌综合征,是肺癌中恶性度最高的一种应选小细胞未分化癌。

33.心脏的正常起搏点是〔〕

- A.窦房结
- B.房室束
- C.普肯耶纤维
- D.左、右束支
- E.房室结

正确答案: A

答案解析:

心脏传导系统的细胞均能发出冲动,但以窦房结的自律性最高,成为正常人心脏的起搏点。

34.心源性水肿最常见的病因是〔〕

- A.左心衰竭
- B.右心衰竭
- C.原发性高血压
- D.心肌肥厚
- E.心包炎

正确答案: B

答案解析:

心源性水肿是右心功能不全的主要表现。右心衰竭时体循环淤血,有效血容量减少,继发醛固酮增多引起水钠潴留、静脉压增高,使毛细血管渗出相对增多,最终导致水肿。而左心衰竭可致肺淤血、肺组织弹性下降,影响气体交换而主要表现为程度不同的呼吸困难。原发性高血压和心肌炎主要使左心功能受累,也以呼吸困难为主要表现。

35.原发性高血压与以下因素无关的是〔〕

- A.遗传
- B.肥胖
- C.摄盐过多
- D.精神紧张
- E.病毒感染

正确答案: E

答案解析:

原发性高血压与遗传、饮食〔如摄盐、摄钾、摄钙、摄饱和脂肪酸等〕、精神应激、体重、是否服避孕药等因素有关,病毒感染常导致心肌炎。

36.以下不符合B型胃炎表现的是〔〕

- A.病变以胃窦部为主
- B.血清促胃液素含量降低
- C.壁细胞抗体滴度较低
- D.由自身免疫引起
- E.大多由幽门螺杆菌引起

正确答案: D

答案解析:

B型胃炎即多灶萎缩性胃炎,大多由幽门螺杆菌感染引起的慢性浅表性胃炎开展而来,非自身免疫引起。其病变位于胃窦部,胃黏膜遭到破坏,使幽门部G细胞分泌促胃液素降低,壁细胞抗体滴度降低。

37.脑膜炎球菌的主要致病因素是〔〕

- A.鞭毛
- B.荚膜
- C.外毒素
- D.毒素
- E.透明质酸酶

正确答案: D

答案解析:

脑膜炎球菌的主要致病因素是细菌释放的毒素,它使全身小血管痉挛,皮细胞损伤,致使脏广泛出血和有效循环血容量减少,引起感染性休克。继而引起的DIC和继发性纤溶亢进进一步加重微循环障碍、出血和休克,最终造成多器官功能衰竭。而鞭毛是使脑膜炎球菌附着于上皮细胞外表的因素;荚膜可抵抗巨噬细胞吞噬;外毒素、选项透明质酸酶都不是脑膜炎球菌的侵袭力;故应选毒素。

38.结核感染的主要途径是〔〕

- A.血液
- B.母婴
- C.消化道
- D.性接触
- E.呼吸道

正确答案: E

答案解析:

呼吸道感染是肺结核的主要感染途径,飞沫感染为最常见的方式。

39.尿路感染患者常见〔〕

- A.膀胱刺激征
- B.血尿
- C.尿潴留
- D.尿失禁
- E.少尿

正确答案: A

答案解析:

膀胱刺激征常见于尿路感染、结石等。

40.流行性乙型脑炎最严重的临床表现是〔〕

- A.癫痫
- B.胃溃疡
- C.肠穿孔
- D.视网膜炎
- E.呼吸衰竭

正确答案: E

答案解析:

伤寒的主要并发症有肠出血、肠穿孔,其中以肠穿孔最为严重。流行性乙型脑炎最严重的临床表现是呼吸衰竭,也是其主要的死亡原因。

41.干性支气管扩是指〔〕

- A.干咳为主
- B.病变局限于上叶
- C.仅有早晨咳嗽及咳痰
- D.仅有反复咯血,一般无咳嗽、咳痰
- E.纤维支气管镜检见支气管粘膜干燥、萎缩

正确答案: D

答案解析:

干性支气管扩多发生于引流好的部位,不易感染,不一定局限于上叶,故排除病变局限于上叶;以咯血为唯一病症,平时咳嗽、咳痰不明显,故排除干咳为主,仅有早晨咳嗽及咳痰,而选项仅有反复咯血,一般无咳嗽、咳痰正确;纤维支气管镜检无支气管粘膜干燥、萎缩,故排除纤维支气管镜检见支气管粘膜干燥、萎缩。

42.自发性气胸的治疗应首选〔〕

- A.鼻塞给氧
- B.排气减压
- C.镇静止痛
- D.镇咳祛痰
- E.手术治疗

正确答案: B

答案解析:

气胸患者因空气进入胸膜腔造成胸膜腔压力升高,肺脏被压缩影响气体交换,静脉回心血流受阻,影响心、肺功能,严重者可导致呼吸、循环衰竭,甚至死亡。故首先应排气减压,去除病因。鼻塞给氧、镇静止痛、镇咳祛痰只是对症治疗。排气减压只需胸腔穿刺即可,只有慢性气胸、反复发作的气胸及肺大泡才考虑手术治疗。

43.患者男性,23岁。4天前出现频繁干咳,伴有胸骨后不适,乏力,未予重视。昨日起出现咳嗽、咳粘液脓痰,痰中偶有血丝。体检肺部散在干、湿啰音,*线检查示肺纹理增粗。该患者最可能的诊断是〔〕

- A.普通感冒
- B.急性病毒性支气管炎
- C.急性气管-支气管炎

- D.肺结核
- E.支气管肺癌

正确答案: C

答案解析:

患者为青年男性,仅咳嗽、咳痰4天,为急性感染,排除肺结核可能;肺部已出现啰音,排除普通感冒;*线检查显示肺纹理增粗,排除肺癌可能;患者无发热,排除急性病毒性支气管炎;而选项急性气管-支气管炎急性气管-支气管炎的主要临床表现即频繁咳嗽、咳粘液脓痰,痰中偶有血丝,伴有胸骨后不适,乏力,体检:肺部散在干、湿啰音,*线检查示肺纹理增粗,与题干相符,故应选急性气管-支气管炎。

44.置入永久性起搏器术后,护士指导的容正确的选项是〔〕

- A.心电监护12小时
- B.沙袋压迫伤口2小时
- C.双上肢要早期活动
- D.平卧24小时
- E.告诉患者半年后随访一次

正确答案: D

答案解析:

置入永久性起搏器术后需心电监护24小时;沙袋压迫伤口4-6小时;术侧上肢需制动72小时,不宜早期活动;平卧24小时,制止术侧卧位;告诉患者半年每月随访一次。

45.消化性溃疡最典型的病症是〔〕

- A.恶心、呕吐
- B.缓脉、多汗
- C.腹胀、腹痛
- D.暖气、反酸
- E.节律性上腹部疼痛

正确答案: E

答案解析:

节律性上腹部疼痛是消化性溃疡的典型表现,可能与胃酸分泌有关。除上腹部疼痛外,尚有吸气、反酸、恶心、呕吐、上腹饱胀等消化不良病症,但这些病症均缺乏特异性。

46.患者女性,43岁。上腹部疼痛3年,多于每年冬、春季节好发。常在饥饿时发作,疼痛呈烧灼样,进餐后缓解。根据患者的病症,最符合的诊断是〔〕

- A.慢性胃炎
- B.胃溃疡
- C.十二指肠溃疡
- D.胃癌
- E.肠结核

正确答案: C

答案解析:

选项慢性胃炎,胃癌都会出现疼痛,但不会有明显的周期性和节律性;选项胃溃疡会出现周期性和节律性,但节律性为进食一疼痛一缓解;选项肠结核的疼痛多位于右下腹,无明显的周期性。而选项十二指肠溃疡的特点是慢性病程、周期性发作和上腹疼痛,且特点为疼痛一进食一缓解,与题干所给信息相符。应选十二指肠溃疡。

47.脑出血急性期处理的重要环节是〔〕

- A.积极准备手术
- B.应用降压药物降血压
- C.止血治疗
- D.早期康复治疗
- E.控制脑水肿,降低颅压

正确答案: E

答案解析:

当大量出血的脑出血患者颅压过高,脱水治疗效果不佳,可能危及生命时,考虑进展手术治疗,排除选项积极准备手术;急性期脑出血患者血压一般比平时高,是颅压增高的代偿性反响。当颅压下降时血压也随之下下降,因此,脑出血急性期一般不应用降压药物降血压,故排除选项应用降压药物降血压;止血药物一般用于并发消化道出血时,排除选项止血治疗;康复治疗应在脑出血病情稳定后进展,排除选项早期康复治疗;脑出血者大多数在早期即有颅压增高,如果脑水肿加重、颅压进一步增高易引起脑病,危及生命。因此,控制脑水肿,降低颅压是脑出血

48.患者男性,63岁。心绞痛病史2年,1天前骑车上桥时又出现胸骨后压榨样疼痛,即原地休息,含服硝酸甘油3片无效,出冷汗,路人将患者送到急诊室。经心电图检查,诊断为急性前壁心肌梗死,转入CCU进展链激酶治疗。患者问护士链激酶治疗的作用是什么,护士的答复正确的选项是〔〕

- A.解除疼痛
- B.扩冠状动脉
- C.抑制血小板的聚集
- D.防止冠状动脉血栓形成
- E.溶解冠状动脉血栓

正确答案: E

答案解析:

链激酶激活血栓中纤溶酶原,使其转变为纤溶酶而溶解冠状动脉的血栓。

49.患者男性,50岁。心悸、手抖3年,加重1个月。体检:P110次/分,Bp160/60mmHg,消瘦,皮肤潮湿,甲状腺可触及,可闻及血管杂音,颈静脉无怒,心界不大,心率134次/分,心律绝对不整,心音强弱不等,肺、腹〔-〕,双下肢不肿。该患者最可能的原因是〔〕

- A.冠心病
- B.老年退行性心脏病

- C.扩性心肌病
- D.高血压性心脏病
- E.甲状腺功能亢进性心脏病

正确答案: E

答案解析:

有典型甲状腺功能亢进病症,有严重心律失常、心房纤颤,可诊断甲状腺功能亢进性心脏病。

50.患者女性,48岁。与同事交谈时情绪冲动,突然觉察言语不清,右侧肢体不能活动,意识模糊。无头痛、呕吐。有风湿性心脏病史18年,房颤5年。该患者最有可能的诊断是〔〕

- A.癫痫
- B.脑出血
- C.脑血栓形成
- D.蛛网膜下腔出血
- E.脑梗死

正确答案: E

答案解析:

根据题干所给信息,该患者最有可能的诊断是脑梗死,主要依据有:①中年患者,有风心病病史;②脑梗死的病症体征:起病急骤,患者出现偏瘫、意识障碍、失语。选项癫痫的患者主要以肢体的抽搐和发作时意识丧失为主;选项脑出血常见于50岁以上有高血压病史者,且因血压明显增高易出现头痛、呕吐;选项蛛网膜下腔出血的患者呕吐多见,无偏瘫。

51.急性心肌梗死患者血清心肌酶测定中最早升高的是〔〕

- A.门冬氨酸转移酶
- B.乳酸脱氢酶
- C.α-羟丁酸脱氢酶
- D.细胞色素氧化酶
- E.肌酸磷酸激酶

正确答案: E

答案解析:

急性心肌梗死患者血清心肌酶最早升高的是肌酸磷酸激酶,一般在心肌梗死6小时即升高;门冬氨酸转移酶在心梗6-12小时升高;乳酸脱氢酶在心梗8-10小时升高;细胞色素氧化酶是一种源性和外源性化合物代酶,主要存在于小肠、胰腺、脑、肾、骨髓及皮肤等组织中,不属于心肌酶。

52.对肝性脑病患者饮食护理正确的选项是〔〕

- A.每天总热量以脂肪为主
- B.病情好转后主要选择动物蛋白
- C.血氨偏高者限制蛋白质摄入
- D.每天饮水量应大于2000ml
- E.饮食中应控制维生素C的摄入

正确答案: C

答案解析:

肝性脑病患者每天总热量应以糖类为主,糖类可促使氨转变为谷氨酰胺,从而有利于降低血氨;病情恢复后应首选植物蛋白,由于植物蛋白富含支链氨基酸和非吸收纤维,后者可促进肠蠕动,被细菌分解后能降低结肠 PH 值,加速毒物排出和减少氨的吸收;肝性脑病患者多有水滞留倾向,应限制水钠摄入;肝性脑病患者饮食应富含维生素;血氨偏高者应限制蛋白质摄入,以减少组织蛋白质分解产氨。

53.患者女性,41岁。诊断为“溃疡性结肠炎”收住院,每天腹泻 5-6 次,有少量脓血便,对此类患者饮食护理应注意 []

- A.给予易消化、富含纤维素饮食
- B.低蛋白饮食
- C.进食无渣流质或半流质饮食
- D.多进食新鲜水果
- E.多吃蔬菜

正确答案: C

答案解析:

溃疡性结肠炎患者应给予易消化、少纤维素、富含热量、高蛋白质、低渣饮食,有利于肠道吸收。急性发作期患者应进食无渣流质或半流质饮食,使肠道得以休息,利于减轻炎症,控制炎症。

54.对面部有红斑的 SLE 患者的皮肤护理正确的选项是

- A.皮肤瘙痒时可轻轻抓挠
- B.适当晒太阳,增强体质
- C.可外用皮质类固醇激素霜剂
- D.以肥皂水清洗面部,每日 3 次
- E.使用化妆品掩盖红斑处,增强患者信心

正确答案: C

答案解析:

对面部有红斑的 SLE 患者,防止诱发因素,如紫外线照射、碱性肥皂、化妆品等,选项适当晒太阳,增强体质,以肥皂水清洗面部,每日 3 次,使用化妆品掩盖红斑处,增强患者信心均属诱发因素,故应排除;皮肤瘙痒、疼痛时切勿挠抓,以免引起破溃,可予皮质类固醇激素霜剂外用,以到达减轻病症的作用,故皮肤瘙痒时可轻轻抓挠也不对。

55.患者女性,28岁。被人发现昏倒在地,可闻及有煤气味,发现者考虑患者呼吸微弱,于是就地做人工呼吸,医生到场后指出抢救者所犯的原则性错误是

- A.未及时撤离现场
- B.未及时供氧
- C.未及时用兴奋剂
- D.未及时输液

E.未及时注射激素

正确答案: A

答案解析:

该患者可能为 CO 中毒,应立即将患者移离中毒现场,置于新鲜空气处,或翻开门窗,尽快通风换气。同时将患者衣领衣扣解开,松开腰带,使其呼吸通畅,并尽快给氧。而不能就地做人工呼吸。

56.对狂犬病的治疗和护理,以下措施正确的选项是

- A.呼吸道隔离
- B.患者住单人房间,防止水、声、光、风的刺激
- C.咽肌和呼吸肌痉挛不能用镇静剂控制时,应使用面罩给氧
- D.医务人员接触患者时,戴口罩帽子,可不戴手套
- E.医务人员被狂犬病患者抓破皮肤者,应肌注破伤风疫苗

正确答案: B

答案解析:

对狂犬病患者应给予严密隔离,而非呼吸道隔离;患者住单人房间,防止水、声、光、风的刺激;咽肌和呼吸肌痉挛不能用镇静剂控制时,可气管切开给氧;医务人员接触患者时,戴口罩帽子,橡胶手套,不能不戴手套;医务人员被狂犬病患者抓破皮肤者,应肌注地鼠肾细胞疫苗。

57.患者男性,52岁。因肝硬化上消化道出血入院,经药物止血效果不佳给予三腔二囊管暂时压迫止血。使用过程中,假设患者频发期前收缩,最可能的原因是

- A.食管囊注气过多
- B.胃囊注气过多
- C.牵引不紧
- D.胃囊阻塞咽喉部
- E.胃囊进入食管下端挤压心脏

正确答案: E

答案解析:

正常情况下,胃囊压迫胃底曲静脉止血,假设胃囊进入食管下端挤压心脏,患者可出现恶心、胸骨下不适或频繁期前收缩。

58.患者女性,26岁。全血细胞减少,骨髓有核细胞增生低下,粒系、红系低下,巨核细胞缺如。对该患者有最可能的诊断是

- A.缺铁性贫血
- B.再生障碍性贫血
- C.急性白血病
- D.慢性白血病
- E.特发性血小板减少性紫癜

正确答案: B

答案解析:

根据题干所给信息,该患者有最可能的诊断是再生障碍性贫血。主要依据有:①外周血象:全血细胞减少;②骨髓

象：骨髓有核细胞增生低下，粒系、红系低下，巨核细胞缺如。缺铁性贫血骨髓象红系增生活泼，粒细胞和巨核细胞系常正常；选项急性白血病，慢性白血病白血病患者白细胞计数增高，骨髓象有核细胞显著增生；特发性血小板减少性紫癜骨髓象巨核细胞增多或正常。

59.患者男性，55岁。因天气寒冷，于睡前烧炭火取暖，清晨邻居发现其昏睡不醒，送入医院，查体：血压90/50mmHg，体温39℃，呼吸28次/分，心率108次/分，面色苍白，口唇呈樱桃红色。该患者最可能的诊断是〔〕

- A.有机磷中毒
- B.误服强酸溶液
- C.误服不洁食物
- D.一氧化碳中毒
- E.酒精中毒

正确答案：D

答案解析：

根据病史及典型的临床表现〔口唇呈樱桃红色〕，可初步判断为一氧化碳中毒。

60.脑膜刺激征阳性最明显的是〔〕

- A.脑出血
- B.脑血栓形成
- C.短暂性脑缺血发作
- D.蛛网膜下腔出血
- E.吉兰-巴雷综合征

正确答案：D

答案解析：

蛛网膜下腔出血时，血液可通过围绕在脑和脊髓周围的脑脊液迅速播散，刺激脑膜引起脑膜刺激征。

61.女性，50岁，因反复呕吐5天入院。血清钠118mmol/L，脉搏120次/min，血压70/50mmHg。应诊断为〔〕

- A.轻度缺钠
- B.中度缺钠
- C.重度缺钠
- D.中度缺水
- E.重度缺水

正确答案：C

答案解析：

解析：低渗性脱水临床表现：①早期轻度脱水，血清钠在135mmol/L以下时，乏力、头晕、手足麻木、无口渴，大约失盐0.5g/kg；②中度脱水，血清钠在130mmol/L以下，失盐0.5~0.75g/kg，出现周围循环衰竭，特点是脉搏细弱，站立性昏倒，血压下降，恶心、呕吐，尿少、尿比重低；③重度脱水，血清钠在120mmol/L以下，除上述表现加重外，出现神经精神病症，如抽搐、昏迷、

休克等。

62.*病人，男，40岁，肝硬化后食管胃底静脉曲张破裂大出血，出血量约1000ml，面色苍白、皮肤湿冷、脉率110次/min，血压90/60mmHg。此病人应采用何种体位〔〕

- A.床头抬高15°~30°
- B.床头抬高45°以上
- C.床头抬高45°以下
- D.平卧
- E.头和躯干抬高15°~20°，下肢抬高20°~30°的仰卧中凹位

正确答案：E

答案解析：

解析：该病人提示有休克，应采用头和躯干抬高15°~20°，下肢抬高20°~30°的仰卧中凹位，即休克卧位。

63.关于手术日晨护理，以下不正确的选项是〔〕

- A.测量体温
- B.术前2h注射麻醉前用药
- C.术前排空膀胱
- D.遵医嘱插胃管
- E.询问女病人是否有月经

正确答案：B

答案解析：

解析：手术日晨护理：①测生命体征，发现异常及时报告医生；②嘱病人排空小便，遵医嘱安置尿管、胃管、灌肠等；③取下发夹、义齿、眼镜、手表和首饰等，贵重物品妥善保管；④遵医嘱于术前半小时给麻醉前用药；⑤将病历及术中需要的用物、药物一并带入手术室；⑥病人去手术室后，做好护理单元的准备。

64.以下情况中哪一项不应给予营养支持〔〕

- A.肠梗阻
- B.急性炎性肠道疾病
- C.重症胰腺炎
- D.休克
- E.骨髓移植

正确答案：D

答案解析：

解析：休克最重要的是补充有效循环血容量。

65.脓性指头炎假设不及时处理可发生〔〕

- A.甲沟炎
- B.骨坏死骨髓炎
- C.急性化脓性腱鞘炎
- D.化脓性滑囊炎
- E.指甲下脓肿

正确答案：B

答案解析：

解析:脓性指头炎多因指头刺伤引起,致病菌为金黄色葡萄球菌,是手指末节掌面皮下组织的急性化脓性感染。临床表现:局部肿胀、疼痛,并伴全身病症。严重者可因循环障碍发生坏死和骨髓炎。

66.应用破伤风抗毒素的目的是〔〕

- A.杀死破伤风杆菌
- B.中和血液中游离毒素
- C.抑制破伤风杆菌生长
- D.中和与神经结合的毒素
- E.去除毒素来源

正确答案: B

答案解析:

解析:注射破伤风抗毒素可中和血液中的游离毒素。

67.假设脓性指头炎的创面经久不愈,应考虑并发症是〔〕

- A.指骨骨髓炎
- B.肌腱坏死
- C.化脓性腱鞘炎
- D.掌中间隙感染
- E.鱼际间隙感染

正确答案: A

答案解析:

解析:脓性指头炎,其脓液不易扩散,故肿胀不明显。但脓腔压力增高,不仅有剧痛,还可压迫滋养血管,引起指骨骨髓炎。

68.*男,45岁,在施工过程中不慎被钢筋刺破胸壁。在运送过程中病人应采取的卧位是〔〕

- A.去枕平卧位
- B.头低仰卧位
- C.低斜坡患侧卧位
- D.俯卧位
- E.低斜坡健侧卧位

正确答案: C

答案解析:

解析:患者胸壁损伤,应固定胸壁,防止纵隔扑动。

69.*男,70岁,有长期便秘史,突然腹痛、腹胀2天,未吐,少量黏液便1次,未排气;2年前曾有类似发作,查体可见全腹高度膨胀,左下腹可见巨大肠型,有轻度压痛、反跳痛,肠鸣音亢进。以下针对病人的处理措施不正确的选项是〔〕

- A.禁食
- B.胃肠减压
- C.应用抗生素
- D.补液
- E.高压灌注

正确答案: E

答案解析:

解析:肠扭转患者禁高压灌注。

70.梁*,女,45岁,右侧乳腺发现一无痛性肿块,生长速度快,质硬,与周围分界不清,同侧腋窝淋巴结肿大。应考虑〔〕

- A.急性乳腺炎
- B.乳癌
- C.乳腺囊性增生病
- D.乳腺纤维腺瘤
- E.乳管乳头状瘤

正确答案: B

答案解析:

解析:乳癌乳房肿块多见于乳房外上象限,早期表现为无痛、单发、质硬、外表不光滑、与周围组织分界不清,不易推动。

71.以下关于乳癌改进根治术后病人的护理措施,不正确的选项是〔〕

- A.抬高患侧上肢
- B.患侧胸壁加压包扎
- C.保持引流管通畅
- D.早期活动患肢
- E.不在患肢测血压

正确答案: D

答案解析:

解析:术后24h开始腕部活动;3~5天开始肘部活动;1周后做肩部运动,逐渐增加活动范围;10~12天开始全围关节活动。

72.受伤当时无明显病症,几天后突然出现急性大出血的危险情况的脏损伤是〔〕

- A.肝脾破裂
- B.小肠穿孔
- C.大肠破裂
- D.十二指肠破裂
- E.胆囊穿孔

正确答案: A

答案解析:

解析:最初肝脾破裂可能为被膜下破裂,在*些微弱外力下,可突然转为真性破裂导致腹腔大出血。

73.急性阑尾炎非手术治疗期间,体温升高,全腹疼痛,腹肌紧,其病情判断为〔〕

- A.并发腹腔脓肿
- B.阑尾穿孔腹膜炎
- C.阑尾坏疽
- D.并发门静脉炎
- E.形成阑尾周围脓肿

正确答案: B

答案解析:

解析:体温升高,全腹疼痛,腹肌紧,其病情判断为阑尾穿孔腹膜炎。

74.构成机体重量的主要成分是〔〕

- A.骨骼
- B.肌肉
- C.脏
- D.体液
- E.细胞

正确答案: D

答案解析:

正常成年人体液总量占体重的60%~70%,小儿更多,所以机体重量的主要成分是体液,应选体液。

75.门静脉高压症的主要病因是〔〕

- A.门静脉血栓形成
- B.门静脉主干畸形
- C.肿瘤压迫门静脉
- D.门静脉炎症
- E.肝硬化

正确答案: E

答案解析:

门静脉是供给肝脏血流的主要血管,门静脉压力增高的主要因素为门静脉血流阻力增加。根据阻力增加的部位分为肝前、肝和肝后三型,其中肝型是最常见的病因,肝型又分为窦前型、肝窦型、窦后型,其中肝炎后肝硬化是引起肝窦和窦后阻塞性门静脉高压症的常见病因。选项门静脉血栓形成、门静脉主干畸形、肿瘤压迫门静脉、是肝前型门静脉压力升高的病因,不属于门脉高压的主要病因,故可排除;而选项门静脉炎症不引起门静脉压力升高,故可排除。肝硬化时肝纤维组织广泛增生及再生的肝细胞结节,对肝小叶的肝窦产生压迫;加上肝小叶汇管区的动静脉

76.老年男性出现进展性排尿困难,最常见的原因是〔〕

- A.前列腺增生
- B.尿道结石
- C.尿道狭窄
- D.膀胱结石
- E.膀胱颈纤维增生

正确答案: A

答案解析:

前列腺增生是老年人常见病,而进展性排尿困难是前列腺增生最重要的病症。

77.肝破裂合并开放性气胸的首选处理是〔〕

- A.补液
- B.输血
- C.应用抗生素

D.剖腹探查止血

E.处理气胸

正确答案: E

答案解析:

多处脏器损伤时应先处理危及生命的损伤。开放性气胸会导致严重呼吸循环障碍,首先患者胸膜腔与大气直接相通,导致患侧肺被压缩而萎陷,引起严重呼吸困难;同时两侧胸膜腔压力不等可导致纵隔随呼吸左右摆动,影响静脉回流,导致循环功能严重障碍,因此处理时应首先使开放性气胸变为闭合性气胸。其他选项均不是首要措施。

78.小脑幕切迹疝时肢体活动障碍的特点是〔〕

- A.病变对侧上肢瘫痪同侧下肢瘫痪
- B.病变同侧上肢和对侧下肢瘫痪
- C.病变对侧肢体瘫痪
- D.病变同侧肢体瘫痪
- E.四肢瘫痪

正确答案: C

答案解析:

因为小脑幕切迹病时,同侧的大脑脚受到挤压而造成病变对侧的肢体瘫痪。

79.肾结核的典型病症是〔〕

- A.脓尿
- B.镜下血尿
- C.全身中毒病症
- D.膀胱刺激征
- E.肾区疼痛和肿块

正确答案: D

答案解析:

肾结核病灶在肾,病症在膀胱。而尿频是肾结核患者最早出现的病症,起初是含结核菌的酸性脓尿刺激膀胱所致,不久膀胱结核病变引起溃疡,尿频加重,并同时会出现尿急、尿痛征象。血尿多在膀胱刺激征后出现,且多为终末血尿。肾结核的全身病症常不明显,应选膀胱刺激征。

80.前列腺增生症与前列腺癌的鉴别依据是〔〕

- A.发病年龄
- B.排尿困难程度
- C.剩余尿量测定
- D.血清前列腺特异抗原〔PSA〕测定
- E.膀胱造影术

正确答案: D

答案解析:

血清前列腺特异抗原〔PSA〕测定是鉴别前列腺癌与前列腺增生症的特异性指标,前列腺癌常伴有PSA升高,极度升高提示有转移灶,故答案为血清前列腺特异抗原〔PSA〕测定

81.新鲜脱位是指脱位时间〔〕

- A. 未满 24 小时
- B. 未满 3 天
- C. 未满 1 周
- D. 未满 2 周
- E. 未满 3 周

正确答案: E

答案解析:

按脱位后的时间可分为新鲜脱位和旧性脱位,其中新鲜脱位是指脱位时间未满 3 周。

82.患者男性,50 岁。因频繁呕吐、腹泻 1 天入院。入院查体:神志清楚,口唇枯燥,眼窝陷,患者主诉原体重为 63kg,入院后测体重减轻 3kg,抽血测得血清钠 156mmol/L。估计体失液总量约为〔〕

- A. 3400ml
- B. 3800ml
- C. 4200ml
- D. 4600ml
- E. 5000ml

正确答案: A

答案解析:

判断患者为中度高渗性脱水,主要理由:①有导致高渗性脱水的病因:频繁呕吐腹泻;②有中度高渗性脱水的临床病症和体征:口唇枯燥,眼窝陷,体重减轻;③高渗性脱水时失液量与脱水的关系为:轻度脱水时水分丧失量为体重的 2%-3%,中度脱水失水量为体重的 4%-6%,该患者体重减少 3kg,失水量约为体重的 4.7%,则失液为 2500-3780ml。

83.患者女性,44 岁。患腰椎间盘突出症 5 年,经卧硬板床和骨盆牵引等保守治疗无效。现病症逐渐加重,行走 100-200 米即出现下肢疼痛,须休息或下蹲数分钟才能缓解,入院准备承受手术治疗。该患者术后第 1 天可以进展的功能锻炼是〔〕

- A. 三点式支撑法
- B. 四点式支撑法
- C. 五点式支撑法
- D. 直腿抬高
- E. 头、上肢及背部后伸

正确答案: D

答案解析:

84.重度肺气肿患者可发生〔〕

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 代性酸中毒
- C. 呼吸性碱中毒
- D. 代性碱中毒
- E. 呼吸性酸中毒合并代性酸中毒

正确答案: A

答案解析:

幽门梗阻时因呕吐造成胃酸大量丧失,体 HCO₃⁻增多,造成代性碱中毒;重度肺气肿时 CO₂ 潴留造成呼吸性酸中毒;临床最常见的酸碱失衡是体酸性物质积聚过多或碱性物质丧失引起的代性酸中毒。

85.脑震荡的临床特征是〔〕

- A. 逆行性健忘
- B. 中间清醒期
- C. 突然呼吸停顿
- D. 脑脊液漏
- E. 伤后癫痫

正确答案: A

答案解析:

脑震荡的主要病症是受伤当时立即出现短暂的意识障碍,清醒后大多不能回忆受伤当时至伤前一段时间的情况,称逆行性遗忘。

86.患者男性,70 岁。有吸烟史 40 年,行腹部手术,术后最重要的护理措施是〔〕

- A. 取半卧位,减少患者活动量
- B. 协助床上活动,鼓励深呼吸,咳嗽排痰
- C. 加强营养
- D. 保证液体的摄入
- E. 全身或局部抗生素治疗

正确答案: B

答案解析:

高龄、吸烟史、腹部手术是术后发生肺炎、肺不的常见诱因,因此预防肺部并发症最重要,而协助床上活动,鼓励深呼吸,咳嗽排痰为预防肺炎、肺不的有效护理措施。

87.大面积烧伤患者休克期口渴时,可给予〔〕

- A. 大量冷开水
- B. 少量屡次盐开水
- C. 大量橘子水
- D. 大量糖水
- E. 大量茶水

正确答案: B

答案解析:

大面积烧伤患者,创面渗出很多,组织水肿也较重,易引起血容量减少造成低血容量性休克。口渴时,应饮适量烧伤饮料〔每升含氯化钠 0.3g,碳酸氢钠 0.15g〕如给予大量冷开水、橘子水、糖水、茶水,不仅不能扩容,反而会造成水中毒。

88.人工肛门自我护理方确的是〔〕

- A. 禁忌扩造口
- B. 定时结肠灌洗,训练排便习惯
- C. 造口袋排泄物超过 3/4 时应更换造口袋
- D. 肛门袋宜长期持续使用,减少更换

E.根据患者体形、体重选择造口袋大小

正确答案: B

答案解析:

对于有人工肛门的患者,应教会患者自我护理方法,应指导患者每 1-2 周扩造口 1 次,防止人工肛门狭窄;造口袋排泄物超过 1/3 时应予以更换,而非 3/4 时再更换;人工肛门袋不宜长期持续使用,否则容易造成瘻口粘膜和皮肤糜烂;造口袋的大小应根据造口大小选择,而非患者体形与体重;人工肛门应每日定时行结肠灌洗,训练定时排便习惯。

89.患者男性,41 岁。饮酒后上腹部剧痛 12 小时,伴有恶心、呕吐,疼痛向右肩部放射。查体:上腹部压痛、反跳痛明显,Murphy 征(-),肠鸣音消失。为明确诊断首选的化验检查是 []

- A.血常规检查
- B.尿常规检查
- C.肝功能检查
- D.血淀粉酶含量测定
- E.血中胆红素测定

正确答案: D

答案解析:

患者急性起病,有明显的腹膜刺激征伴胃肠道病症,可初步认为是急腹症。常见的急腹症有急性阑尾炎、急性肠梗阻、急性胰腺炎、急性胆囊炎和急性胃、十二指肠穿孔。急性阑尾炎以转移性右下腹痛为特征,急性肠梗阻以腹痛、腹胀、呕吐和停顿排便排气为特征,急性胃、十二指肠穿孔一般有溃疡病史,以持续性上腹刀割样痛并很快扩散至全腹,急性胆囊炎 Murphy 征 [+],通过患者的病症和体征可判断急性胰腺炎可能性大,而饮酒又是急性胰腺炎的常见诱因,确诊急性胰腺炎最有价值的指标为血淀粉酶含量。

90.骨折牵引时,预防过度牵引的措施是 []

- A.患肢功能锻炼
- B.尽可能减轻牵引重量
- C.定时放松牵引装置
- D.防止牵引针左右移动
- E.定时测定肢体长度

正确答案: E

答案解析:

骨折牵引时不可随意增减牵引重量,不能随意放松牵引装置,应保持牵引针的正确位置,不可随意左右移动,以保证有效牵引。为预防过度牵引应定时测定肢体长度,并与健侧比照以便及时调整。

91.患者男性,50 岁。以进展性吞咽困难半年之主诉入院。*线钡餐透视诊断为食管癌。为了解肿瘤向外扩展情况,该患者还需行的检查是 []

- A.B 超
- B.拍胸部*线正侧位片
- C.CT
- D.食管纤维镜检
- E.食管拉网

正确答案: C

答案解析:

因为 B 超对食管癌进一步诊断无意义;拍胸部*线正侧位片不能清晰地判断肿瘤向外扩展情况。食管纤维镜检只能了解食管病变,无法了解肿瘤向外扩情况,故不确切;食管拉网适用于普查,也无法判断肿瘤是否向外扩展。CT 可以通过图像重建,判断食管肿瘤的浸润层次、向外扩展程度。

92.患者,男性,42 岁,乘车时右腿搁在左腿上,突然刹车时右膝受撞击致右款疼痛不能活动,6 小时后送来医院就诊,查体见患肢缩短,右髌屈曲、收、旋畸形。该患者复位固定 4 周后,扶双拐下地活动,需多长时间后才能完全承重 []

- A.1 周后
- B.2 周后
- C.3 个月后
- D.4 个月后
- E.5 个月后

正确答案: C

答案解析:

髌关节脱位固定期间做股四头肌等长收缩,4 周后扶拐下地,3 个月患肢不能负重,以防止股骨头变形。

93.急性肾衰竭少尿期应 []

- A.限制入水量
- B.补充适量液体
- C.10%葡萄糖酸钙静滴
- D.11.2%乳酸钠静滴
- E.3%高渗盐水静滴

正确答案: A

答案解析:

根据急性肾衰竭各期治疗与护理要点:少尿期应严格限制入量;出现酸中毒时应补充碱性药物,如用 11.2%乳酸钠来纠正;并发高钾血症时,可通过静滴 10%葡萄糖酸钙,以钙离子对抗钾离子对心肌的抑制作用;而一旦进入多尿期,就应准确记录出入液量并合理补液。

94.患者女性,61 岁。因肛门下坠感、大便带血被诊断为肛管癌,需行的治疗方法是 []

- A.经腹会阴联合直肠癌根治术
- B.经腹直肠癌切除术
- C.拉下式直肠癌切除术
- D.经腹直肠癌切除、人工肛门、远端封闭手术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/846022122155010045>