

学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

一、A1

1. 甲亢有多种类型，外科临床上多见的是
 - A. 结节性甲状腺肿伴甲亢
 - B. 高功能腺瘤
 - C. 桥本病并发甲亢
 - D. 甲状腺癌并发甲亢
 - E. Graves 病

2. 对慢性淋巴细胞性甲状腺炎诊断有意义的实验室检查是
 - A. 基础代谢率正常，摄 ^{131}I 率升高
 - B. 基础代谢率正常，摄 ^{131}I 率降低
 - C. 基础代谢率降低，摄 ^{131}I 率升高
 - D. 基础代谢率升高，摄 ^{131}I 率正常
 - E. 基础代谢率降低，摄 ^{131}I 率降低

3. 关于甲状腺腺瘤，下列哪项不正确
 - A. 40 岁以下女性多见
 - B. 按形态学可分为滤泡状和乳头状囊性腺瘤两种
 - C. 乳头状囊性腺瘤多见
 - D. 常无临床症状，单发结节多见
 - E. 手术是治疗本病唯一有效的方法

4. 乳腺癌钼靶 X 线的表现为
 - A. 密度均匀的肿物，边界较清晰、整齐
 - B. 密度均匀的肿物，可见圆圈及小斑片状钙化
 - C. 片状或结节致密影，和周围腺体组织密度类似
 - D. 高密度影肿物，边缘呈毛刺状，可见小簇状、沙砾样钙化
 - E. 密度不均匀，边界不清楚

5. 嵌顿性疝与绞窄性疝的根本区别是
 - A. 肠壁动脉血流障碍
 - B. 肠壁静脉血流障碍
 - C. 疝囊内有渗液积累
 - D. 疝块迅速增大

- E. 发生急性机械性肠梗阻
6. 鉴别腹股沟斜疝最有意义的体征是
- A. 疝块的形状
 - B. 疝块是否进入阴囊
 - C. 单侧还是双侧
 - D. 是否容易嵌顿
 - E. 还纳疝块，压住内环，增加腹压，疝块是否脱出
7. 对老年复发性腹股沟疝，最好的手术方法是
- A. Bassini 法
 - B. 内环修补法
 - C. McVay 法
 - D. Ferguson 法
 - E. 单纯疝囊高位结扎术
8. 考虑诊断为下列哪种急腹症时，不应进行诊断性腹腔穿刺
- A. 低位完全性机械性肠梗阻
 - B. 腹腔内出血
 - C. 腹部闭合性损伤
 - D. 原发性腹膜炎
 - E. 继发性腹膜炎
9. 腹部损伤中，较多见的实质性脏器损伤为
- A. 肝
 - B. 肾
 - C. 脾
 - D. 肾上腺
 - E. 胰
10. 下列哪项关于腹部损伤的叙述是正确的
- A. 因多数腹部损伤涉及内脏而伤情严重，死亡率一般在 30%以上
 - B. 有腹膜破损者为穿透伤（多伴内脏损伤）
 - C. 涉及内脏的开放性损伤，诊断常较困难

- D. 穿透伤的入、出口与伤道呈一条直线
- E. 伤口大小与伤情严重程度成正比

11. 引起全身性感染的局部因素中错误的是

- A. 脓肿不及时切开引流
- B. 伤口清创不彻底
- C. 伤口内留有异物
- D. 局部感染灶内有死腔
- E. 伤口内抗生素用量不足

12. 在腹部闭合性损伤行手术治疗时，如未找到明确损伤，应进行探查的顺序

- A. 肝、脾→十二指肠→胃→回肠→空肠→大肠及其系膜→盆腔器官
- B. 肝、脾→十二指肠→胃→回肠→空肠→盆腔器官→大肠及其系膜
- C. 肝、脾→膈肌→胃→十二指肠→空肠→回肠→大肠及其系膜→盆腔器官
- D. 胃→肝、脾→膈肌→十二指肠→空肠→回肠→大肠及其系膜→盆腔器官
- E. 胃→膈肌→肝、脾→十二指肠→空肠→回肠→大肠及其系膜→盆腔器官

13. 有关闭合伤口的处理以下哪项不对

- A. 挤压伤需预防肾衰
- B. 腹腔内脏器损伤大多需急诊手术
- C. 骨折需手术复位和固定
- D. 软组织挫伤局部早期可冷敷
- E. 气血胸需穿刺或引流

14. 不属于继发性腹膜炎病因的是

- A. 化脓性输卵管炎
- B. 阑尾穿孔
- C. 胃十二指肠溃疡穿孔
- D. 肝硬化继发腹水感染
- E. 后腹膜血肿继发感染

15. 急性化脓性腹膜炎时的腹部标志性体征是

- A. 腹式呼吸减弱或消失
- B. 腹部压痛肌紧张和反跳痛

- C. 腹胀
 - D. 肠鸣音减弱或消失
 - E. 移动性浊音阳性
16. 结核性腹膜炎腹痛的特点是
- A. 早期腹痛明显
 - B. 呈持续性绞痛
 - C. 疼痛多位于脐周、下腹
 - D. 呈转移性疼痛
 - E. 疼痛与体位有关
17. 行胃癌根治性大部分切除术时，手术切除最少应离癌肿边缘多远才算足够
- A. 1~2m
 - B. 2~3cm
 - C. 3~4cm
 - D. 5cm 以上
 - E. 8cm 以上
18. 对急性阑尾炎诊断最有价值的体征或症状是
- A. 厌食
 - B. 恶心、呕吐
 - C. 发热
 - D. 右下腹固定位置的压痛
 - E. 腹泻
19. 处理妊娠期急性阑尾炎，下列哪项不正确
- A. 以非手术治疗为主
 - B. 妊娠后期应及早手术
 - C. 围手术期加用黄体酮
 - D. 手术切口应偏高，以减少对子宫的刺激
 - E. 术后使用广谱抗生素
20. 下列与阑尾相关的叙述，错误的是
- A. 阑尾动脉是终末动脉

- B. 阑尾组织中含有丰富的淋巴滤泡
- C. 阑尾炎发病时的脐周痛属内脏性疼痛
- D. 成人切除阑尾将损害机体的免疫功能
- E. 阑尾黏膜深部有嗜银细胞，与类癌发生有关

21. 下列肠梗阻表现中，提示发生肠绞窄可能性较小的是

- A. 发病急、疼痛重而持续
- B. 腹膜刺激征明显，有休克表现
- C. 有多次腹部手术史，反复发作腹痛
- D. 呕吐物为血性液体
- E. 腹部 X 线检查见孤立突出胀大的肠袢

22. 对于肠易激综合征病人，下列有关腹痛的描述，错误的是

- A. 部位不定
- B. 以下腹和右下腹多见
- C. 极少睡眠中痛醒
- D. 多于排便或排气后缓解
- E. 无明显体征

23. 直肠肛管交界的齿状线在临床上的重要性是

- A. 齿状线上的直肠有神经反射弧
- B. 齿状线上的直肠易受感染
- C. 齿状线上下血液供应、神经、淋巴引流各异
- D. 齿状线、肛管容易受伤
- E. 齿状线下是外括约肌所在部位

24. 直肠肛管周围脓肿的主要起因

- A. 外伤
- B. 肛腺感染
- C. 药物治疗
- D. 全身感染性疾病
- E. 肛裂

25. 直肠肛管周围脓肿中最常见的类型是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/846135135035010141>