

2024 河北省固安县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题带答案（模拟题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 肌肉注射 ACTH 作用达到高峰的时间是

- A: 8 小时
- B: 4 小时
- C: 7~12 分钟
- D: 10~25 分钟

答案：B

2. （2016 年真题）属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

- A: 二甲双胍
- B: 艾塞那肽
- C: 阿卡波糖
- D: 那格列奈

答案：C

3. 与鲑降钙素合用，有可能急速降血钙，出现严重低钙血症的是

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 维生素 D
- C: 钙剂
- D: 铁剂

答案：A

4. 高效抑菌药是

- A: 氯霉素
- B: 磺胺嘧啶
- C: 异烟肼
- D: 头孢菌素

答案：B

5. 呋塞米的利尿作用机制主要是

- A: 抑制碳酸酐酶
- B: 抑制 $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子
- C: 抑制 Na^+-H^+ 交换
- D: 特异性阻滞 Na^+ 通道

答案：B

6. 控制哮喘急性发作的首选药是

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: M 胆碱受体阻断剂
- C: β 受体激动剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：C

7. 属于磷酸二酯酶抑制剂的平喘药是

- A: 布地奈德
- B: 孟鲁司特
- C: 沙美特罗
- D: 多索茶碱

答案：D

8. 属于贝丁酸类调节血脂药的是

- A: 依折麦布
- B: 阿昔莫司
- C: 阿托伐他汀
- D: 非诺贝特

答案：D

9. 治疗侵袭性念珠菌病首选()

- A: 伏立康唑
- B: 氟胞嘧啶
- C: 灰黄霉素
- D: 氟康唑

答案：D

10. 属于胃黏膜保护药的是

- A: 山莨菪碱
- B: 熊去氧胆酸
- C: 胶体果胶铋
- D: 多潘立酮

答案：C

11. 成人使用美罗培南一日剂量不得超过

- A: 5g
- B: 6g
- C: 4g
- D: 3g

答案：B

12. 能松弛前列腺和膀胱括约肌，很少发生低血压的抗前列腺增生症药为

- A: 特拉唑嗪
- B: 酚苄明
- C: 乙酰唑胺
- D: 坦洛辛

答案：D

13. 属于长效糖皮质激素的是

- A: 泼尼松龙
- B: 甲羟孕酮
- C: 尼尔雌醇
- D: 地塞米松

答案：D

14. 应用本品时可能发生耐药菌的过度繁殖的药物是()

- A: 氯霉素
- B: 多西环素
- C: 四环素
- D: 青霉素

答案：B

15. 下列关于钠的作用特点描述，错误的是

- A: 不能调节体内水量的恒定
- B: 调节体液渗透压、电解质及酸碱平衡
- C: 调节体内水量的恒定
- D: 维持血压

答案：A

16. 与瑞格列奈无药物相互作用的是

- A: 环孢素
- B: 伊曲康唑
- C: 克拉霉素
- D: 吉非贝齐

答案：C

17. 治疗铜绿假单胞菌感染选用 ()

- A: 庆大霉素
- B: 红霉素
- C: 多西环素
- D: 磺胺嘧啶

答案：A

18. 对曲霉无效的药物是

- A: 伏立康唑
- B: 氟康唑
- C: 伊曲康唑
- D: 两性霉素 B

答案：B

19. (2021 年真题) 有关甲氨蝶呤药物相互作用的说法，错误的是 ()

- A: 碳酸氢钠会减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- B: 与顺铂等肾毒性药物合用，可能减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- C: 阿司匹林会减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- D: 丙磺舒会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

答案：A

20. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。

- A: 可使用大环内酯类药物如红霉素
- B: 依诺沙星可抑制茶碱代谢
- C: 可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用
- D: 左氧氟沙星与茶碱相互作用较小

答案：A

21. 适应症仅应用于治疗失眠的药物是()

- A: 佐匹克隆
- B: 地西洋
- C: 氟西汀
- D: 苯巴比妥

答案：A

22. (2015 年真题) 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是 ()。

- A: 氟西汀
- B: 文拉法辛
- C: 吗氯贝胺
- D: 阿米替林

答案：A

23. 氟尿嘧啶的前体药物，对结肠和直肠癌疗效较高

- A: 卡莫氟
- B: 来曲唑
- C: 甲氨蝶呤
- D: 喜树碱

答案：A

24. 血管紧张素转化酶 I 抑制剂是()

- A: 米力农
- B: 地高辛
- C: 多巴酚丁胺
- D: 依那普利

答案：D

25. 容易引起周围神经炎的抗结核药物的是

- A: 对氨基水杨酸
- B: 异烟肼
- C: 利福平
- D: 链霉素

答案：B

26. (2018 年真题) 镇痛药的合理用药原则, 不包括 ()

- A: 用药剂量个体化, 根据患者需要由小剂量开始逐渐加大剂量
- B: “按时”给药, 而不是“按需”给药
- C: 尽可能选口服给药
- D: 按阶梯给药, 对于轻度疼痛者首选弱阿片类药物

答案：D

27. 可引起血钾、血钙降低, 血尿素氮、肌酐及尿酸升高的是

- A: 依他尼酸
- B: 醛固酮
- C: 氢氯噻嗪
- D: 乙酰唑胺

答案：C

28. 患者，女，45 岁。诊断为高血压合并甲状腺功能亢进，心率过快，宜选用的抗高血压药是

- A: 普萘洛尔
- B: 氨氯地平
- C: 赖诺普利
- D: 吧达帕胺

答案：A

29. 柔红霉素可引起心脏毒性，临床应用的解毒方案是

- A: 在用柔红霉素前 30 分钟，使用柔红霉素两倍量的氟马西尼
- B: 在用柔红霉素前 30 分钟，使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生
- C: 在用柔红霉素的同时，使用柔红霉素等量的右雷佐生
- D: 在用柔红霉素后 30 分钟，使用柔红霉素两倍量的右雷佐生

答案：B

30. 属于 II 类抗心律失常药 ()

- A: 胺碘酮
- B: 普萘洛尔
- C: 奎尼丁
- D: 利多卡因

答案：B

31. 下列属于重组人促红素的禁忌证的是 ()

- A: 低血压
- B: 中性粒细胞减少
- C: 心律失常

D: 难以控制的高血压

答案：D

32. 属于超短效胰岛素/胰岛素类似物的是

A: 门冬胰岛素

B: 甘精胰岛素

C: 普通胰岛素

D: 精蛋白锌胰岛素

答案：A

33. 用于肝病的氨基酸制剂的是

A: 赖氨酸注射液

B: 复方氨基酸注射液（6AA）

C: 复方氨基酸注射液（9AA）

D: 复方氨基酸注射液（18AA）

答案：B

34. 氟胞嘧啶为

A: 抗真菌药

B: 抗病毒药

C: 抗血吸虫病药

D: 抗滴虫病药

答案：A

35. 氟喹诺酮类

A: 禁用于胆道阻塞患者

B: 禁用于早产儿、新生儿

C: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

D: 禁用于 8 岁以下儿童

答案: C

36. 作用于髓袢升支厚壁段皮质部和远曲小管的利尿剂是

A: 碳酸酐酶抑制剂

B: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂

C: 袢利尿剂

D: 醛固酮受体阻断剂

答案: B

37. 对沙眼、结核性眼病及某些病毒性眼病均有治疗作用的药物是()

A: 阿托品

B: 左氧氟沙星

C: 利福平

D: 卡替洛尔

答案: C

38. 不能用于曲霉菌感染的抗真菌药是()

A: 氟康唑

B: 两性霉素 B

C: 伏立康唑

D: 卡泊芬净

答案: A

39. 羟基脲属于()

A: 胸腺核苷合成酶抑制剂

B: 二氢叶酸还原酶抑制剂

C: DNA 多聚酶抑制剂

D: 核苷酸还原酶抑制剂

答案：D

40. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

A: 能有效地抑制夜间基础胃酸分泌

B: 很少发生耐药

C: 抑酸作用强大，持续时间长

D: 停药后复发率低

答案：A

41. 止吐方案：每日化疗前，联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂和口服地塞米松 12mg，化疗后从第 2 日到第 3 日口服地塞米松或应用 5-HT

A: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

B: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

C: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

D: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：D

42. 维生素 D 缺乏时会导致()

A: 角膜软化症

B: 成人佝偻病

C: 脚气病

D: 坏血病

答案：B

43. 治疗钙缺乏症 ()

- A: 依降钙素
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 阿法骨化醇

答案：C

44. (2021 年真题) 患者，男，48 岁，入院接受结肠癌手术，术后因合并肺部感染，静脉给予头孢哌酮舒巴坦钠治疗 6 天，观察到手术切口和静脉输液穿刺部位有少量渗血，实验室检验结果显示凝血功能异常。针对此症状，宜选用的治疗药物是 ()

- A: 重组链激酶
- B: 维生素 B12
- C: 维生素 K1
- D: 重组人促红素

答案：C

45. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 氨苯蝶啶
- B: 吲达帕胺
- C: 乙酰唑胺
- D: 呋塞米

答案：D

46. 高血压伴消化性溃疡患者慎用的药物是

- A: 哌唑嗪
- B: 利血平
- C: 卡托普利
- D: 普萘洛尔

答案：B

47. 可导致神经毒性(手指、足趾麻木、腱反射消失)的抗肿瘤药是

- A: 柔红霉素
- B: 博来霉素
- C: 长春新碱
- D: 紫杉醇

答案：C

48. 甲状腺危象选用()

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 二甲双胍
- C: 胰岛素
- D: 格列本脲

答案：A

49. 可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是

- A: 卡比马唑片
- B: 甲巯咪唑片
- C: 复方碘口服液
- D: 甲状腺片

答案：B

50. 属于血小板糖蛋白 GP II b / IIIa 受体阻断剂的是

- A: 阿司匹林
- B: 双嘧达莫
- C: 替罗非班
- D: 替格瑞洛

答案：C

51. 用于流脑，阻碍细菌二氢叶酸合成酶的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 氟康唑
- C: 利巴韦林
- D: 拉米夫定

答案：A

52. 以下关于氯吡格雷使用的描述，错误的是

- A: 在需要进行择期手术的患者，如抗血小板治疗并非必须，则应在术前停用氯吡格雷 7 日以上
- B: 如果漏服，在常规服药时间的 12 小时内漏服，应立即补服一次标准剂量，并按照常规服药时间服用下一次剂量
- C: 发现氯吡格雷抗血小板作用不足者可检测 CYP2C19 基因型
- D: 超过常规服药时间的 12 小时后漏服，应在下次常规服药时间服用加倍剂量

答案：D

53. 降压不引起重要器官血流量减少，不影响脂和糖代谢的药物是

- A: 拉贝洛尔
- B: 依那普利
- C: 可乐定

D: 普萘洛尔

答案: B

54. 属于浓度依赖性抗菌药物的是

A: 头孢西丁

B: 氟曲南

C: 拉氧头孢

D: 庆大霉素

答案: D

55. (2019 年真题) 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内，宜使用的口服紧急避孕药物是 ()

A: 复方醋酸环内孕酮 (35 μ g/2mg)

B: 十一酸睾酮 (40mg)

C: 炔雌醇去氧孕烯 (30 μ g/150 μ g)

D: 左炔诺孕酮 (1

答案: D

56. 可导致视神经炎和血尿酸升高的药物是 ()

A: 乙胺丁醇

B: 吡嗪酰胺

C: 利福平

D: 对氨基水杨酸

答案: A

57. 吡喹酮的抗虫作用首选用于

A: 牛肉绦虫

B: 丝虫

C: 血吸虫

D: 蛔虫

答案: C

58. 血钾升高至

A: 大于 6mmol/L

B: 大于 265 μ mol/L

C: 大于 7 μ mol/L

D: 大于 172 μ mol/L

答案: A

59. 长期应用高剂量的雄激素需监测()

A: 肾功能

B: 血糖

C: 血钙

D: 血压

答案: C

60. 严重心衰首剂可出现低血压反应的药物是

A: 硝酸甘油

B: 氨氯地平

C: 地高辛

D: 卡托普利

答案: D

61. 禁用于妊娠期高血压疾病者的是

A: 硫酸镁

B: 氯化钠

C: 氯化钙

D: 氯化钾

答案: B

62. 唯一与青霉素类没有交叉反应的 β -内酰胺类，可用于青霉素和头孢菌素类过敏者的药物是

A: 红霉素

B: 氨曲南

C: 克林霉素

D: 克拉霉素

答案: B

63. 下列药物除哪项外都属于钙拮抗剂()

A: 地尔硫

B: 维拉帕米

C: 硝苯地平

D: 溴苄胺

答案: D

64. 患者女性，40 岁，上呼吸道感染服用磺胺嘧啶。

A: 维生素 C

B: 维生素 B

C: 碳酸氢钠

D: 碳酸钙

答案: C

65. 可导致"类流感样"反应的药物是()

A: 帕米膦酸二钠

- B: 阿仑膦酸钠
- C: 氯屈膦酸二钠
- D: 依替膦酸二钠

答案：B

66. 扩张脑血管作用较强,能增加脑血流量的钙通道阻滞剂是 ()

- A: 拉西地平
- B: 非洛地平
- C: 尼莫地平
- D: 氟氯地平

答案：C

67. 用于治疗急、慢性支气管炎及各种刺激引起的刺激性干咳。片剂一次 20~40mg, 一日 3 次的药物是

- A: 右美沙芬
- B: 苯丙哌林
- C: 可待因
- D: 地塞米松

答案：B

68. 吸入用布地奈德混悬液抗炎作用是强的松龙的

- A: 40 倍
- B: 100 倍
- C: 25 倍
- D: 15 倍

答案：D

69. 巴比妥类急性中毒时, 导致死亡的主要原因是

- A: 心搏骤停
- B: 肝损害
- C: 肾损害
- D: 呼吸循环衰竭

答案：D

70. 减鼻充血药所致的典型不良反应是()。

- A: 心率减慢
- B: 血管舒张
- C: 共济失调
- D: 血压升高

答案：D

71. 可沉积于牙齿和骨中，造成牙齿黄染的药物是()

- A: 四环素
- B: 链霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 青霉素

答案：A

72. 甲氧苄啶联用甲氧蝶呤使

- A: 半衰期缩短
- B: 抗凝作用增强
- C: 肾毒性增加
- D: 白细胞减少风险增加

答案：D

73. 下列有关口服伪麻黄碱的描述，错误的是

- A: 兴奋肾上腺能 α 受体，使鼻腔黏膜血管收缩
- B: 用药期间不宜饮酒
- C: 属处方类鼻黏膜肿胀治疗药物
- D: 不宜与中枢神经系统抑制药、抗精神病药合用

答案：C

74. 患者女性，30 岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌内注射后，10 分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

- A: 链霉素引起的神经肌肉阻滞作用
- B: 链霉素引起的神经毒性
- C: 链霉素引起的过敏性休克
- D: 链霉素引起的肾毒性

答案：C

75. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1 期)伴出血。13C 呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。

医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次/日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次/日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次/日；注射用蛇毒血凝酶 1U，静脉滴注，1 次/日；替米沙坦 40mg，15 服，1 次/日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次/日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次/日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次/日。

- A: 美托洛尔
- B: 替米沙坦
- C: 胶体果胶铋胶囊
- D: 埃索美拉唑钠

答案：C

76. 主要用于预防静脉血栓的口服药物是

- A: 华法林
- B: 低分子肝素
- C: 尿激酶
- D: 链激酶

答案：A

77. 用于缺血性心脏病、血栓栓塞性疾病、心肌缺血的诊断试验的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 双嘧达莫
- C: 硝苯地平
- D: 硝酸甘油

答案：B

78. 可能导致牙龈增生的药物是

- A: 普伐他汀
- B: 依诺肝素
- C: 普萘洛尔
- D: 拉西地平

答案：D

79. 大环内酯类抗生素()

- A: 克拉霉素
- B: 万古霉素
- C: 红霉素

D: 克林霉素

答案：B

80. 冠状动脉支架置入术前一日起开始口服阿司匹林，剂量为每日

A: 25~50mg

B: 150~300mg

C: 10~25mg

D: 75~150mg

答案：A

81. 临床常用的以原型药从尿液中排出的中效强心苷类药是

A: 毛花苷丙（西地兰 C）

B: 洋地黄毒苷

C: 地高辛

D: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）

答案：C

82. （2017 年真题）5 岁以下儿童首选的散瞳剂是（）

A: 2%后马托品眼膏剂

B: 10%去氧肾上腺素滴眼剂

C: 1%硫酸阿托品眼膏剂

D: 四环素可的松眼膏剂

答案：C

83. 可导致坏死性结肠炎的是

A: 甲氨蝶呤

B: 阿糖胞苷

C: β 受体阻断剂

D: 利福平

答案: B

84. 属于第四代头孢菌素的药物是()

A: 头孢吡肟

B: 头孢噻吩

C: 头孢哌酮

D: 头孢噻肟

答案: A

85. 用 1%麻黄素液滴鼻的主要目的是

A: 收缩血管，减轻炎症反应

B: 收缩鼻黏膜，改善鼻通气和鼻窦引流

C: 收缩鼻黏膜，抑制腺体分泌

D: 收缩血管，降低其通透性

答案: B

86. 与普通肝素相比，低分子肝素的抗凝作用特点是

A: 对凝血因子 IIa、VIIa 灭活作用强，对 Xa 作用弱

B: 对凝血因子 Xa、XIIa 灭活作用强，对 IIa 作用弱

C: 对凝血因子 IIa、IXa 灭活作用强，对 Xa 作用弱

D: 对凝血因子 Xa、XIa 灭活作用强，对 IIa 作用弱

答案: B

87. 属于中枢和外周多巴胺 D

A: 昂丹司琼

B: 莫沙必利

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 甲氧氯普胺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/846220130054011030>