

2024 年河北省河间市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库大全及参考答案 AB 卷

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 快速性房性心律失常伴传导阻滞
- B: 高钾血症
- C: 直立性低血压
- D: 心动过缓

答案：A

2. 以延长患者生命时间为量化指标所开展的药物经济学评价方法属于

- A: 成本-效果分析
- B: 成本-效益分析
- C: 成本-效用分析
- D: 最小成本分析

答案：A

3. 属于药物信息服务最重要的咨询服务方法步骤是

- A: 对问题进行确定并归类
- B: 对文献进行评价、分析和整理
- C: 确立有效的检索方法、查阅文献
- D: 形成答案并以口头形式提供给询问者

答案：B

4. 对主要临床表现和体征进行明确、具体的描述；如过敏性皮疹的类型、性质、部位、面积大小等

A: ADR / ADE 过程描述

B: 不良反应 / 事件的结果

C: 用药原因

D: 用药起止时间

答案：A

5. 影响伊曲康唑药效的 PK / PD 参数是

A: AUC_{0~24} / MIC

B: C_{max}

C: C_{max} / MIC

D: %T>MI

答案：A

6. 可导致体重增加的抗癫痫药是

A: 苯妥英钠

B: 拉莫三嗪

C: 卡马西平

D: 丙戊酸钠

答案：D

7. 属于治疗沙眼的处方药的是

A: 红霉素眼膏

B: 硫酸铜棒

C: 磺胺醋酰钠滴眼剂

D: 硫酸锌滴眼剂

答案：B

8. 磷化锌经口中毒的典型临床表现是

A: 口内有金属味

B: 抽搐

C: 腐蚀性口腔炎

D: 呕吐物有蒜臭味

答案：D

9. 以餐后血糖升高为主，伴有餐前血糖轻度升高可以应用

A: 磺酰脲类

B: 胰岛素注射液

C: α -糖苷酶抑制剂

D: 胰岛素增敏剂

答案：C

10. (2018 年真题) 患者, 女, 53 岁, 冠心病史 2 年, 目前服用硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙。近三个月因胃痛心境低落、有自杀倾向就诊, 临床诊断为消化性溃疡、抑郁症。给予奥美拉唑肠溶片 40mgqdpo 文拉法辛缓释片 150mgqdpo, 谷维素片 10mg tidpo 治疗, 患者用药后出现血压升高可能导致该患者血压升高的药物是 ()

A: 奥美拉唑肠溶片

B: 硝酸异山梨酯片

C: 阿托伐他汀钙片

D: 文拉法辛缓释片

答案：D

11. 以下抗抑郁药物的合理使用中，叙述不正确的是（）

- A: 个体化用药
- B: 尽可能单一用药
- C: 从小剂量开始
- D: 显效慢即换药

答案：D

12. 提示：用药期间不饮酒（或含酒精的饮料），是针对

- A: 卡托普利
- B: 氟西汀
- C: 铋制剂
- D: 氯苯那敏

答案：B

13. 适用于各型癫痫的药物

- A: 丙戊酸钠
- B: 拉莫三嗪
- C: 苯妥英钠
- D: 卡马西平

答案：A

14. 鼻窦炎的急性期应尽早采用足量的何种药物治疗

- A: 抗过敏药
- B: 局部血管收缩剂
- C: 抗菌药
- D: 解热镇痛药

答案：C

15. 选择药物的首要标准是药物治疗的

- A: 适宜性
- B: 有效性
- C: 经济性
- D: 安全性

答案：B

16. 可用于氟乙酰胺中毒的药物是

- A: 碘解磷定
- B: 维生素 K1
- C: 亚硝酸钠
- D: 乙酰胺

答案：D

17. 氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是

- A: 胃肠道反应
- B: 肌病
- C: 血液系统疾病
- D: 神经系统疾病

答案：D

18. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

- A: 导泻与洗肠
- B: 静脉补液
- C: 催吐、洗胃

D: 吸氧

答案：C

19. 在考虑患者意愿、偏好和生命质量的基础上，比较不同治疗方案的经济合理性，应选用的药物经济学研究方法是

A: 成本-效益分析

B: 最小成本分析

C: 成本-效果分析

D: 成本-效用分析

答案：D

20. 口服避孕药所致的心肌梗死，在吸烟妇女中发生的危险性加大，说明药源性疾病的患者因素是

A: 不良生活方式

B: 生理因素

C: 药物制剂因素

D: 药物的使用

答案：A

21. 妊娠后 3~5 周服用容易导致胎儿出现肢体、耳、内脏畸形的药物是

A: 沙利度胺

B: 四环素

C: 叶酸拮抗剂

D: 氯霉素

答案：A

22. 患者，男，72 岁，近期出现入睡困难，诊断为失眠症，处方给予扎来普隆治疗，适宜的剂量范围是

- A: 5~10mg
- B: 0.25~0.5mg
- C: 3~6mg
- D: 20~50mg

答案：A

23. 患者，女，48 岁，身高 158cm，体重 72kg。最近因感觉易疲劳、怕冷、嗜睡、记忆力逐渐减退等情况前来就医。医生检查发现，患者眼睑和手部皮肤水肿，声音嘶哑、毛发稀落。实验室检查示：血清 TSH 水平升高。确诊为甲状腺功能减退症。

- A: L—T₄
- B: 甲巯咪唑
- C: 碘化钾
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：A

24. 治疗艾滋病的非核苷类逆转录酶抑制剂是（）

- A: 拉米夫定
- B: 阿昔洛韦
- C: 依非韦伦
- D: 利巴韦林

答案：C

25. 关于药物作用相加或增加疗效的举例，磺胺甲噁唑(SMZ)抑制二氢叶酸合成酶，甲氧苄啶(TMP)抑制二氢叶酸还原酶，二者联用使细菌的叶酸代谢受到双重阻断，抗菌作用增强，是属于

- A: 作用于不同的靶位
- B: 延缓或降低抗药性
- C: 保护药品免受破坏
- D: 促进机体的吸收利用

答案：A

26. 下列情况的首选药物是，高 TC 血症

- A: 他汀类
- B: 胆酸螯合剂+贝特类
- C: 贝丁酸类
- D: 弹性酶

答案：A

27. 成人(末梢血)白细胞(WBC)的正常值参考范围是

- A: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$
- B: $(5.0 \sim 10.0) \times 10$
- C: $(3.5 \sim 10.0) \times 10$
- D: $(5.0 \sim 12.0) \times 10$

答案：A

28. 胶囊壳染料可引起固定性药疹

- A: 药物制剂因素
- B: 药物的使用
- C: 生活和饮食习惯
- D: 生理因素

答案：A

29. 与阿莫西林配伍，可提高疗效的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 苜丝肼
- C: 克拉维酸钾
- D: 叶酸

答案: C

30. 下列属于白三烯受体拮抗剂的是

- A: 多索茶碱
- B: 异丙托溴铵
- C: 普尔司特
- D: 布地奈德

答案: C

31. 妊娠期尿路感染

- A: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数 $>10^5\text{cfu/ml}$
- B: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- C: 宜选用毒性小的抗菌药物
- D: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再次出现菌尿，菌种与上次相同

答案: C

32. 患者，男，70 岁，右手抖动和行走缓慢 3 个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病。既往前列腺肥大病史 3 年，临床上对该患者不宜选用（）

- A: 苯海索
- B: 多巴丝肼

C: 司来吉兰

D: 左旋多巴

答案: A

33. (2019 年真题) 患者, 女, 29 岁, 孕 29+6 周, 血压 160/100mmHg, 尿蛋白 (-), 该患者降压药应选用

A: 卡托普利

B: 甲基多巴

C: 厄贝沙坦

D: 氨氯地平

答案: B

34. 患者, 女性, 62 岁, 自述近日常有一过性黑矇, 雾视、视野中有黑点, 一侧面部无力、麻木。医师诊断为短暂性脑缺血。

A: 2.0~4.0

B: 3.0~4.0

C: 2.0~3.0

D: 2.0~3.5

答案: C

35. (2018 年真题) 患者, 男, 60 岁, 因轻度冻疮 (无破溃) 到药店购药, 药师应推荐的药品是 ()

A: 10%樟脑软膏

B: 氢化可的松软膏

C: 利巴韦林软膏

D: 特比萘芬乳膏

答案: A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

36. 以下对"调配处方四查十对"的叙述中，最正确的是

- A: 查药品，对药名、剂型、规格、数量
- B: 查配伍禁忌，对药品性状、规格、数量
- C: 查处方，对临床诊断
- D: 查临床诊断，对用药合理性

答案：A

37. 提供的信息是否涉及某个厂家或某个品牌的药品，是衡量互联网信息的

- A: 归因性
- B: 合理性
- C: 新颖性
- D: 权威性

答案：B

38. 对目标适应证患者治疗作用的初步评价是指

- A: III期临床试验
- B: 临床预试验
- C: I 期临床试验
- D: II 期临床试验

答案：D

39. 香豆素类抗凝血药

- A: 氯吡格雷
- B: 利伐沙班
- C: 华法林
- D: 肝素

答案：C

40. 癫痫持续状态的好发年龄段是

- A: 55 岁以上
- B: 6 岁以内
- C: 1 岁以内及 65 岁以上
- D: 65 岁以上

答案：C

41. 弥漫性青铜色色素沉着

- A: 氟尿嘧啶
- B: 柔红霉素
- C: 博来霉素
- D: 白消安

答案：D

42. 早产儿为预防佝偻病，每天服用维生素 D 的剂量为

- A: 200~400IU?
- B: 100~200IU?
- C: 800~1000IU?
- D: 100~800IU?

答案：C

43. 尤其适用于阿司匹林哮喘、运动性哮喘和伴有过敏性鼻炎哮喘患者的药品是

- A: 孟鲁司特
- B: 氨茶碱
- C: 异丙托溴铵
- D: 噻托溴铵

答案：A

44. 为使铁剂更好的被人体吸收，宜同时应用

A: 维生素 C

B: 叶酸+维生素 B12

C: 亚叶酸钙

D: 硫酸亚铁

答案：A

45. 患者，女，38 岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力 2 日；查体：神清、气稍促，心律 95bpm，律齐，体温 39.1℃，血压 110 / 70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

A: 右美沙芬可引起嗜睡，驾车、高空作业或操作机器者宜慎用；妊娠期妇女、严重高血压者、有精神病史者禁用

B: 镇咳药连续口服 1 周，症状未缓解或消失可改用肾上腺皮质激素

C: 对于干性咳嗽可单用镇咳药；对痰液较多者应以祛痰为主，镇咳药合用祛痰剂。以利于痰液排出和加强镇咳效果

D: 对支气管哮喘时的咳嗽宜适当合用平喘药，缓解支气管痉挛，并辅助镇咳和祛痰

答案：B

46. 归属"患者基本情况"的是

A: 临床诊断

B: 医保和费用支付情况

C: 联合用药

D: 主要实验室检查数据

答案：B

47.（2016 年真题）将药物治疗成本和所产生的效益规划为以货币为单位的数字，进行药物经济学评价。这一评价方法属于（）。

- A: 最小成本分析
- B: 成本-效益分析
- C: 成本-效果分析
- D: 成本-效用分析

答案：B

48. 氟尿嘧啶、甲氨蝶呤等抗肿瘤治疗应该禁用的是

- A: 食盐
- B: 脂肪
- C: 酒
- D: 食醋

答案：C

49. 具体写明稀释比例和使用时间，是倡导开处方环节的

- A: 实现个体化治疗
- B: 修订医嘱及时沟通
- C: 医嘱清楚准确
- D: 医嘱完整不漏项

答案：D

50. 药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈

- A: 塞来昔布
- B: 替加色罗
- C: 培高利特

D: 钆贝葡胺

答案: B

51. 前列腺增生症治疗药物特拉唑嗪的不良反应是

A: 性功能障碍

B: 体位性低血压

C: 加重闭角型青光眼

D: 心动过缓

答案: B

52. 以延长患者生命时间为指标开展的药物经济学评价方法属于()

A: 成本-效果分析

B: 成本-效用分析

C: 最小成本分析

D: 成本-效益分析

答案: A

53. 治疗中度痤疮宜选用()

A: 阿昔洛韦软膏

B: 维 A 酸乳膏

C: 氢化可的松软膏

D: 复方苯甲酸酊

答案: B

54. 使用硫酸亚铁片治疗缺铁性贫血，元素铁的治疗量是

A: 100mg/次

B: 60mgbid

C: 60mg tid

D: 60mgqd

答案：C

55. 经肾排泄的药物，在肝功能障碍时

A: 尽可能避免使用

B: 一般无须调整剂量

C: 必须减量应用

D: 须谨慎使用，必要时减量给药

答案：B

56. 注射氟马西尼，用于

A: 解救乙醇中毒

B: 解救硝西泮中毒

C: 解救丙咪嗪中毒

D: 解救可待因中毒

答案：B

57. 痛风急性发作期不宜服用，以防发生转移性痛风发作的是

A: 秋水仙碱

B: 泼尼松

C: 苯溴马隆

D: 别嘌醇

答案：C

58. 以下有关肌酸激酶检查值升高的临床意义中，最正确的是

A: 诊断急慢性白血病

B: 诊断心肌梗死

C: 诊断痛风

D: 诊断恶性贫血

答案：B

59. 晚发型或伴有智能减退的患者，帕金森病治疗首选药物为（）

A: 苯海索

B: 左旋多巴

C: 司来吉兰

D: 金刚烷胺

答案：B

60. （2019 年真题）患者，男，78 岁，实施右侧髋关节置换术，术后第 10 日，患侧下肢出现肿胀、疼痛，诊断为深静脉血栓。该患者应选用的药物是

A: 依诺肝素

B: 血凝酶

C: 氯吡格雷

D: 阿司匹林

答案：A

61. 患者男性，30 岁，确诊哮喘入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生进行用药注意事项嘱咐和患者教育。

A: 抗胆碱药物

B: β_2 受体激动剂

C: β 受体阻断剂

D: H₁ 受体阻断剂

答案：C

62. 容易引起体重增加的抗焦虑药物是

- A: 文拉法辛
- B: 米氮平
- C: 氟西汀
- D: 曲唑酮

答案：B

63. 马来酸氯苯那敏（扑尔敏）用于良性前列腺增生症患者，导致尿滞留，属于

- A: 超适应证用药
- B: 过度治疗用药
- C: 有禁忌证用药
- D: 无适应证用药

答案：C

64. 10 岁以上的儿童 2 型糖尿病患者适宜选择的降糖药是

- A: 瑞格列奈
- B: 格列美脲
- C: 胰岛素
- D: 二甲双胍

答案：D

65. III 期临床试验

- A: 以患者为给药对象
- B: 以目标适应证患者为给药对象
- C: 以特殊人群为给药对象
- D: 以健康志愿者为给药对象

答案：B

66. 患者，女，52 岁，近年来发现手关节肿痛，且呈对称性，并有畸形，晨起时有僵硬现象持续 1 小时，疼痛难忍。经实验室检测示血沉 28mm / 1h，指尖关节的 X 线片显示受累关节有骨侵蚀特征。

- A: 泼尼松
- B: 依那西普
- C: 关洛昔康
- D: 白介素-6 拮抗剂

答案：A

67. 药物治疗结核病的标准方案中，间歇疗法的含义是

- A: 一日用药 1~2 次
- B: 一日用药 1 次
- C: 一周用药 1 次
- D: 一周用药 2~3 次

答案：D

68. 使用抗过敏药治疗荨麻疹的患者，拟进行变应原皮试的时间是在

- A: 停用所用药物之后
- B: 停用抗过敏药 36~48 小时后
- C: 停用抗过敏药之后
- D: 停用抗过敏药 48~72 小时后

答案：D

69. 反复吸入亚硝酸异戊酯，可解救

- A: 氯丙嗪中毒
- B: 氰化氢中毒
- C: 丙米嗪中毒
- D: 苯丙胺中毒

答案：B

70. 硝酸异山梨酯的别名是

- A: 消心痛
- B: 心得安
- C: 安痛定
- D: 心痛定

答案：A

71. 通过抑制白细胞趋化、吞噬作用及减轻炎性反应而发挥止痛作用的药品是

- A: 别嘌醇
- B: 吲哚美辛
- C: 秋水仙碱
- D: 苯溴马隆

答案：C

72. 患者，女，62 岁，患有 2 型糖尿病，平时未规律监测血糖。今日来院复诊，欲了解近 3 个月内的血糖总体控制情况，应检测的指标是

- A: 血红蛋白
- B: 餐后 2 小时血糖
- C: 糖化血红蛋白
- D: 空腹血糖

答案：C

73. 某患者到药店购买胃得灵，药师应交付的药物是

- A: 格列本脲
- B: 吡拉西坦

C: 胃得灵

D: 苯乙双胍

答案: C

74. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

A: 依地酸钙钠

B: 青霉胺

C: 二巯丁二钠

D: 二巯丙醇

答案: D

75. 患者女 27 岁确诊慢性乙型肝炎 3 年，近日化验结果:HBV-DNA 2×10^5 opies/ml,ALT122U/L. 拟予以病毒治疗首选的药物是()

A: 恩替卡韦

B: 利巴韦林

C: 泛昔洛韦

D: 阿糖腺苷

答案: A

76. 下列病原体中，可导致沙眼的是

A: 豚解支原体

B: 沙眼衣原体

C: 变形杆菌

D: 大肠埃希菌

答案: B

77. 下列药物中，患胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者宜选用的药物是

- A: 喷托维林
- B: 苯丙哌林
- C: 可待因
- D: 羧甲司坦

答案：C

78. 长期应用苯二氮

- A: 毒性反应
- B: 首剂效应
- C: 后遗效应
- D: 戒断症状

答案：D

79. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如没有用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为一线预防，最佳剂量范围是

- A: 150~300mg/d
- B: 25~50mg/d
- C: 25~75mg/d
- D: 75~150mg/d

答案：D

80. 患者，男，35 岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

- A: 双八面体蒙脱石散
- B: 胰酶
- C: 小檗碱
- D: 碳酸氢钠

答案：B

81. 支原体肺炎首选（）

- A: 青霉素
- B: 甲氧西林
- C: 阿奇霉素
- D: 多西环素

答案：D

82. 属于胃黏膜保护剂的是（）。

- A: 奥美拉唑
- B: 雷尼替丁
- C: 替普瑞酮
- D: 哌仑西平

答案：C

83. 药师最基本的技能是

- A: 药品管理技能
- B: 调剂技能
- C: 沟通技能
- D: 自主学习能力

答案：B

84. （2018 年真题）患者，女，30 岁，妊娠 7 个月，既往有磺胺药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧，发痒、分泌物多，有烧灼感。去年曾用酞丁安滴眼液治疗相似症状，疗效较好，今天到药店想再次购买该药。药师给予的用药建议是（）

- A: 酞丁安滴眼液

B: 磺胺醋酸钠滴眼液

C: 利巴韦林滴眼液

D: 硫酸锌滴眼液

答案：D

85. 敏感化作用的配伍用药是

A: 纳洛酮用于解救吗啡中毒

B: 青蒿素与乙胺嘧啶或磺胺多辛联用延缓抗药性

C: 应用地高辛与氢氯噻嗪

D: 阿托品联用吗啡镇痛

答案：C

86. 再感染

A: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数 $>10^5\text{cfu/ml}$

B: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再次出现菌尿，菌种与上次相同

C: 宜选用毒性小的抗菌药物

D: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同

答案：D

87. 用量过大可引起低血糖反应的是

A: 胰岛素

B: 糖皮质激素

C: 炔雌醇

D: 甲状腺素

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/846232055100011030>