

精神科护理练习题库及答案

1、抑郁症首次发作后的几年内自杀率最高？

- A、2
- B、3
- C、4
- D、5

答案：D

2、病人, 女性, 18岁, 诊断为焦虑症。病人整日处于惶恐不安中, 感觉“太难受了”, 有自杀企图, 正服苯二氮草类药物。目前最重要的护理措施是

- A、观察药物不良反应
- B、保护病人安全, 降低焦虑程度
- C、改善睡眠环境
- D、深入了解引发病人焦虑的来源
- E、鼓励病人参加工娱治疗

答案：B

3、病人常因小事大发脾气、激动、吵闹、喊叫、扯头发 以上表现属于下述哪个症状

- A、情绪不稳
- B、易激惹
- C、情感爆发
- D、情感脆弱
- E、情感高涨

答案：B

4、下列不属于精神分裂症阳性症状的是

- A、联想障碍
- B、妄想
- C、行为紊乱
- D、情感淡漠
- E、幻觉

答案：D

5、可能造成睡眠障碍的因素不包括

- A、急性应激反应
- B、饮用浓咖啡
- C、过度担心失眠
- D、睡前进食过多

E、安静环境

答案：E

6、一位老年人，最近老是忘记刚刚做过的事情。该病人最可能的诊断是

A、精神分裂症

B、抑郁症

C、分离/转换障碍

D、阿尔茨海默病

E、精神发育迟滞

答案：D

7、卢某，男，28岁，病人自述“脑子里空洞洞的，不想任何问题，也没有什么事情，可想”该症状可能是

A、思维中断

B、思维松散

C、思维不连贯

D、联想贫乏

答案：D

8、一组表现为慢性广泛性的认知障碍，为慢性获得性、渐进性、不可逆性的宗总体认知功能缺陷综合征，故又称为慢性脑综合征的是？

A、睡眠障碍

B、痴呆

C、木僵

D、意识障碍

答案：B

9、哪国医生开创了精神科护理的先河？

A、美国医生

B、法国医生

C、英国医生

D、德国医生

答案：B

10、“杯弓蛇影”是一种

A、感觉障碍

B、错觉

C、幻觉

D、感知综合障碍

E、感觉过敏

答案：B

11、下列关于精神活动的说法，哪些是错误的？

- A、精神活动最大脑机能的产物
- B、精神活动是以客观现实为基础的
- C、病态精神活动与客观现实脱离因此与客观现实无关
- D、精神活动包括认知、情感、意志等过程

答案：C

12、病人躺在床上突然看见一只猛虎扑来

- A、错觉
- B、妄想
- C、朦胧
- D、幻觉
- E、谵妄

答案：D

13、病人，女性，22岁。诉说自己心情不好，高兴不起来；对任何事物无论好坏都缺乏兴趣，不愿见人。该病人应诊断为

- A、精神分裂症
- B、躁狂发作
- C、抑郁发作
- D、偏执性精神障碍
- E、焦虑症

答案：C

14、癫痫多见于：

- A、青年
- B、中年
- C、儿童及青少年
- D、老年

答案：C

15、某患者坚持不在病床上睡 坐于走廊 认为床变得特别窄

- A、幻觉
- B、妄想
- C、错觉
- D、感知综合障碍
- E、超价观念

答案：D

16、下面哪项不属于思维逻辑结构障碍

- A、象征性思维
- B、夸大妄想
- C、强制性思维
- D、语词新作
- E、破裂性思维

答案：B

17、王某，23岁，原先无任何精神异常，某次听广播时，突然坚信播音员在说他，而他的生活经历与当时的广播内容并无明显联系，这病人可能的症状为

- A、听幻觉
- B、原发性妄想
- C、继发性妄想
- D、病理性象征性思维

答案：B

18、病人躺在床上突然看见一只猛虎扑来

- A、错觉
- B、妄想
- C、朦胧
- D、感知觉综合障碍
- E、幻觉

答案：E

19、下列那项不属于意识障碍

- A、意识模糊
- B、昏睡状态
- C、痴呆
- D、梦幻状态
- E、朦胧状态

答案：C

20、病人男性，36岁。来门诊进行体检时，用针头轻戳病人皮肤，病人即大声喊叫，此感觉障碍的类型为

- A、感觉过敏
- B、感觉倒错
- C、感觉缺失
- D、感觉减退

E、感觉异常

答案：A

21、一位在家服氯氮平治疗的病人，告诉护士他已经有 5 天感到很疲倦了，护士在检查该病人时发现体温 38.6℃，脉搏 110 次/分，呼吸 20 次/分，对这位病人下列哪项处理最佳恰当？

- A、与牛奶一起服药
- B、立即停药并去看内科医生
- C、只要休息这些症状会消失
- D、逐渐减药，下周再去医生

答案：B

22、患者缺乏内心情感体验，对切身相关的各种事情表现无动于衷，面部表情呆滞，这种症状称为

- A、情感低落
- B、情感淡漠
- C、情感倒错
- D、焦虑
- E、意志减退

答案：B

23、焦虑性神经症发作有两种形式，一种为广泛性焦虑障碍，另一种为

- A、恐惧症
- B、惊恐发作
- C、强迫症
- D、疑病症
- E、癔症

答案：B

24、关于对重度抑郁症病人的健康教育，正确的叙述是

- A、生活中回避压力，不要主动挑起对抗
- B、坚持服药治疗，不要漏服或随意停药
- C、建议患者进行自我心理调整为主，用药为辅
- D、尽量减少社会活动，避免受人关注
- E、鼓励病人安静休息，避免声光刺激

答案：B

25、刘某，女，24 岁，医生在问他病情时，将自己的眼镜取下放在桌上，病人对医生说：“你把眼镜取下是想告诉我不要太清楚的看这个世界。”该症状可能是

- A、思维鸣响
- B、逻辑倒错
- C、关系妄想
- D、象征性思维

答案：D

26、病人,女,30岁。近3年来出现情绪低落,食欲、性欲减退,觉得自己患了不治之症,给家人带来许多麻烦,生不如死,近2周症状加重,诊断为抑郁症。对病人实施给药护理时,正确的做法是

- A、将药物放在床头柜上,让病人自行服用
- B、将药物交给家属,让其自行服用
- C、将药物混合在病人食物内,一同服用
- D、护士看护病人服药,确认服下后离开
- E、病人拒绝服药时,应以命令或强制的方式执行

答案：D

27、抑郁症病人情绪低落的表现一天中的规律是

- A、晨轻夜重
- B、晨重夜轻
- C、晨轻夜轻
- D、晨重夜重
- E、无规律

答案：B

28、通常将躯体治疗（药物和 ECT 等）和_____结合运用来治疗性感型精神障碍

- A、心理治疗
- B、物理治疗
- C、关爱治疗
- D、情感治疗

答案：A

29、病人将医生看成是鬼魂

- A、幻觉
- B、错觉
- C、谵妄
- D、感知综合障碍
- E、妄想

答案：B

30、关于幻觉的定义为

- A、对客观事物的错误感觉
- B、对客观事物的胡思乱想
- C、无客观刺激时的类感知觉
- D、客观刺激作用于感觉器官的感知体验
- E、客观刺激作用于人脑的过程

答案：C

31、精神分裂症患者发病期大多是

- A、儿童期
- B、青年期
- C、中年期
- D、更年期
- E、老年期

答案：B

32、病人, 男性, 35 岁。半年前无明显诱因出现敏感、多疑, 认为同事在背后说他的坏话, 阻碍其工作, 常出现冲动行为, 诊断为“精神分裂症”入院治疗。对该病人的护理措施中该病人思维属于

- A、关系妄想
- B、夸大妄想
- C、被害妄想
- D、罪恶妄想
- E、物理妄想

答案：C

33、病人, 女性, 25 岁, 诊断为抑郁症, 药物治疗一周后没有效果。评估该病人时特别要注意

- A、病人的情绪状态
- B、病人的思维过程
- C、病人有无自杀先兆
- D、病人的人际关系
- E、病人的生活自理能

答案：C

34、不属于精神分裂症感知觉障碍的是

- A、幻听
- B、幻嗅
- C、幻视

D、幻触

E、多疑

答案：E

35、在精神分裂症病因学研究中,目前最重要的因素是:

A、遗传因素

B、环境因素

C、精神因素

D、性格因素

E、社会因素

答案：A

36、癔症病人抽搐发作时,紧急处理最常用的药物是

A、地西洋

B、氯氮平

C、奋乃静

D、百忧解

E、丙咪嗪

答案：A

37、失眠症可引起

A、糖尿病

B、高血压

C、冠心病

D、焦虑、抑郁

E、精神分裂症

答案：D

38、病人,女性,25岁,诊断为抑郁症,药物治疗一周后没有效果。问护士抗抑郁药的起效时间是

A、1~2周

B、2~3周

C、3~4周

D、4~5周

E、5~6周

答案：B

39、关于焦虑症的叙述,正确的是

A、焦虑发作是先天的对可怕情景的条件反射

B、焦虑是害怕某些环境刺激所形成的条件反射

- C、女性患病率明显低于男性
- D、发作时紧张程度与现实环境相符
- E、焦虑人格特质与遗传无关

答案：B

40、病人, 女性, 40 岁, 平常向来小心谨慎。最近 1 个月每次出门后, 明知门与电已经关了, 但她仍不放心, 一而再, 再而三地重复检查。该病人的情况属于

- A、强迫行为
- B、强迫意向
- C、强迫联想
- D、强迫思想
- E、强迫回忆

答案：A

41、对于强迫症病人, 在其自愿参与下, 要求病人在出现强迫动作前与护士主动沟通。该护理措施的主要目的是

- A、建立护患关系
- B、落实护理计划
- C、减少和控制症状
- D、减少诱发因素
- E、改善错误的认知

答案：C

42、在精神分裂症病因学假说中 目前认为最重要的因素是

- A、遗传因素
- B、环境因素
- C、生物因素
- D、脑萎缩
- E、社会因素

答案：A

43、病人, 女性, 22 岁。诉说自己心情不好, 高兴不起来; 对任何事物无论好坏都缺乏兴趣, 不愿见人。入院后诊断为抑郁症。诊断为该病的核心症状是

- A、情绪低落, 兴趣缺乏、乐趣丧失
- B、思维贫乏、情感低落、乐趣丧失
- C、意志减退、情感低落、乐趣丧失
- D、意志减退、情感低落、妄想
- E、意志减退、情感低落、注意力减退

答案：A

44、遗忘综合征又称？

- A、痴呆综合症
- B、急性脑综合征
- C、科萨科夫综合征
- D、慢性脑综合征

答案：C

45、病人,女,30岁。近3年来出现情绪低落,食欲、性欲减退,觉得自己患了不治之症,给家人带来许多麻烦,生不如死,近2周症状加重,诊断为抑郁症。评估该病人时首先要注意的问题是

- A、躯体的营养状况
- B、认知与感知状况
- C、有无自伤、自杀行为
- D、睡眠与休息状况
- E、注意安慰开导

答案：C

46、病人,女性,23岁。主因“间断凭空闻声、疑心被害2年余”住院治疗,诊断为“精神分裂症”。患者由于担心药物副作用未坚持服药。护士在给患者进行健康教育时,下列说法不正确的是

- A、原则上单一用药
- B、应早期足量、足疗程治疗
- C、急性期治疗6~8周
- D、第一次发病治疗效果最好
- E、症状完全消失后及时停药

答案：E

47、精神分裂症病人最常见的阳性症状不包括

- A、幻觉
- B、妄想
- C、无快感体验
- D、思维形式障碍
- E、被动体验

答案：C

48、精神分裂症最突出最常见的感知觉障碍是：

- A、幻听
- B、幻触
- C、幻视

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/84800003025006034>