

2024 年海南省文昌市《执业药师之西药学专业二》资格考试题库（夺冠）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 镇静作用明显的 H

- A: 苯海拉明
- B: 西咪替丁
- C: 阿司咪唑
- D: 组胺

答案：A

2. 胰岛素依赖型重症糖尿病需

- A: 西格列汀
- B: 胰岛素皮下注射
- C: 阿卡波糖
- D: 吡格列酮

答案：B

3. （2019 年真题）患者，男，34 岁，晨起出现上腹部剧烈疼痛，考虑为胃肠道平滑肌痉挛，适宜该患者使用的治疗药物是（）

- A: 酚妥拉明
- B: 多潘立酮
- C: 山莨菪碱
- D: 溴吡斯的明

答案：C

4. 索他洛尔最严重的不良反应是

- A: 尖端扭转型室速
- B: 呼吸困难
- C: 心动过缓
- D: 头晕

答案：A

5. 长期大量服用维生素 A 会出现()

- A: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- B: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- C: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活
- D: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、体重减轻、贫血、眼球突出等中毒现象

答案：D

6. 服用时必须坐位或立位、空腹、服后 30 分钟内不宜进食和卧床的药品是

- A: 依普黄酮
- B: 依降钙素
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 雷洛昔芬

答案：C

7. 治疗立克次体感染选用

- A: 庆大霉素
- B: 红霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 多西环素

答案：D

8. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年。体检：血压 156 / 96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利控制血压。

A: 光过敏

B: 低血糖

C: 水肿

D: 干咳

答案：D

9. 甲睾酮的作用不包括哪一项()

A: 促进男性性器官的发育与成熟

B: 抗雌激素作用

C: 抑制蛋白质的合成

D: 抑制腺垂体分泌促性腺激素

答案：C

10. 属于核苷(酸)类抗肝炎病毒药的是

A: 司他夫定

B: 阿昔洛韦

C: 恩替卡韦

D: 奥司他韦

答案：C

11. 肝素应用过量可注射

A: 鱼精蛋白

B: 葡萄糖酸钙

C: 维生素 K

D: 氨甲苯酸

答案: A

12. 可用于治疗伤寒的药物是

A: 氟喹诺酮类

B: 青霉素类

C: 四环素类

D: 氨基糖苷类

答案: A

13. 可竞争性地与胞浆中的醛固酮受体结合，拮抗醛固酮的保钾利尿药是

A: 氢氯噻嗪

B: 呋塞米

C: 螺内酯

D: 氨苯蝶啶

答案: C

14. 碘化物的主要不良反应是

A: 粒细胞下降

B: 丙硫氧嘧啶

C: 甲状腺素

D: 血管神经性水肿

答案: D

15. 甲氧苄啶联用甲氨蝶呤使

A: 白细胞减少风险增加

B: 半衰期缩短

C: 肾毒性增加

D: 抗凝作用增强

答案: A

16. 长期或大剂量使用质子泵抑制剂可导致的不良反应是

A: 髌骨、腕骨骨折

B: 血浆泌乳素升高

C: 腹泻

D: 呃逆、腹胀

答案: A

17. 易造成持久性低血糖症，老年糖尿病患者慎用的降血糖药是

A: 胰岛素

B: 格列本脲

C: 甲苯磺丁脲

D: 格列吡嗪

答案: B

18. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用

A: 2%过氧化氢溶液

B: 2%酚甘油滴耳液

C: 3%过氧化氢溶液

D: 3%酚甘油滴耳液

答案: C

19. 可诱发或加重支气管哮喘急性发作的药物是()

A: 奎尼丁

B: 利多卡因

C: 普萘洛尔

D: 苯妥英钠

答案: C

20. (2021 年真题) 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

A: 口服补液盐 II 是等渗性口服补液盐

B: 腹泻导致重度脱水时首选静脉补液，情况稳定后可更换为口服补液盐治疗

C: 口服补液盐是复方制剂，II、II 代表不同的配方

D: 口服补液盐使用方便、价格低廉，发生腹泻时如能口服，应尽早使用

答案: A

21. 氨基糖苷类

A: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

B: 禁用于早产儿、新生儿

C: 禁用于 8 岁以下儿童

D: 禁用于胆道阻塞患者

答案: C

22. 第 3 代二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂是

A: 氯吡格雷

B: 噻氯匹定

C: 替罗非班

D: 替格雷洛

答案: D

23. 关于黄体酮的叙述，下列说法正确的是

- A: 是短效类口服避孕药的组成成分
- B: 是天然孕激素
- C: 具有雄激素作用
- D: 是长效类口服避孕药的组成成分

答案：B

24. 可用于治疗厌氧菌感染和阴道滴虫病的药物是()

- A: 四环素
- B: 苯唑西林
- C: 喹诺酮类
- D: 甲硝唑

答案：D

25. 一日 1 次固定时间给药的是

- A: 甘精胰岛素
- B: 谷赖胰岛素
- C: 赖脯胰岛素
- D: 门冬胰岛素

答案：A

26. 主要作用促使细胞中微管装配，抑制微管解聚的抗肿瘤药物是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 紫杉醇
- C: 放线菌素
- D: 顺铂

答案：B

27. 不宜口服给药的药物是

- A: 洛伐他汀
- B: 硝苯地平
- C: 硝酸甘油
- D: 普萘洛尔

答案: C

28. 急性心肌梗死引起的室性心律失常的首选药是()

- A: 普萘洛尔
- B: 利多卡因
- C: 胺碘酮
- D: 奎尼丁

答案: B

29. 治疗地高辛中毒引起窦性心动过缓的药物是

- A: 阿托品
- B: 胺碘酮
- C: 沙库巴曲缬沙坦
- D: 阿利吉仑

答案: A

30. 下列药物组合混合可减弱抗菌活性的是

- A: 青霉素+红霉素
- B: 青霉素+阿米卡星
- C: 青霉素+氯霉素
- D: 青霉素+四环素

答案: B

31. 高血压合并痛风者不宜使用

- A: 依那普利
- B: 氢氯噻嗪
- C: 硝苯地平
- D: 阿替洛尔

答案：B

32. (2019 年真题) 患者，男，15 岁，因咳嗽、咳痰，发热 3 天入院，确诊为社区获得性肺炎，给予静滴青霉素钠 10 分钟后出现头昏，面色苍白，呼吸困难，血压下降等症状，对该患者首选的抢救药物是 ()

- A: 肾上腺素
- B: 地塞米松
- C: 多巴胺
- D: 去甲肾上腺素

答案：A

33. 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 卡比马唑
- C: 甲巯咪唑
- D: 碳酸锂

答案：C

34. (2019 年真题) 关于 NSAIDs 类药物所致不良反应的说法，正确的是 ()

- A: NSAIDS 类药物所致的胃肠道不良反应中，以萎缩性胃炎最为常见
- B: 非选择性 NSAIDS 类药物可导致胃及十二指肠溃疡和出血等风险
- C: 选择性 COX-2 抑制剂导致胃及十二指肠溃疡和出血的风险高于非选择性 NSAIDS 类药物
- D: 非选择性 NSAIDS 类药物导致的心血管风险高于选择性 COX-2 抑制剂

答案：B

35. (2016 年真题) 属于延长动作电位时程的抗心律失常药是

- A: 索他洛尔
- B: 利多卡因
- C: 硝酸甘油
- D: 美托洛尔

答案：A

36. 通过抑制 α -葡萄糖苷酶，减少多糖水解为葡萄糖()

- A: 艾塞那肽
- B: 格列本脲
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案：C

37. 依诺沙星与华法林合用

- A: 药理作用拮抗
- B: 不良反应叠加
- C: 后者血药浓度升高，不良反应增加
- D: 后者血药浓度下降，药效降低

答案：C

38. 低剂量可提供接近全效的降压作用的是

- A: 阿米洛利
- B: 氨苯蝶啶
- C: 螺内酯
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

39. 需要内因子辅助吸收的维生素是

- A: 维生素 B12
- B: 叶酸
- C: 维生素 B6
- D: 烟酸

答案：A

40. 毛果芸香碱对眼的作用是

- A: 扩瞳、升眼压，调节麻痹
- B: 缩瞳、降眼压，调节痉挛
- C: 缩瞳、升眼压，调节痉挛
- D: 扩瞳、降眼压，调节痉挛

答案：B

41. 哌拉西林和羧苄西林()

- A: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染
- B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- C: 口服，肌内注射或静脉注射均可用于全身感染
- D: 肾毒性大

答案：A

42. 青光眼患者应该慎用

- A: 孟鲁司特
- B: 噻托溴铵
- C: 沙美特罗
- D: 沙丁胺醇

答案：B

43. 患者女,58 岁血糖升高 10 年,口服二甲双胍治疗:高血压病史 5 年未规律治疗近期查体:血压 158/95mmHg 尿常规示蛋白尿 (++) 适宜该患者使用的降压药物是 ()

- A: 甲基多巴
- B: 硝苯地平
- C: 依那普利
- D: 普萘洛尔

答案：C

44. 下列保肝药中属于必需磷脂类的是

- A: 复方甘草酸苷
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 联苯双酯
- D: 甘草酸二铵

答案：B

45. 地衣芽孢杆菌活菌以活菌形式进入肠道后,拮抗的致病菌是

- A: 拟杆菌
- B: 双歧杆菌
- C: 葡萄球菌

D: 乳酸杆菌

答案: C

46. 属于抗雌激素类的是

A: 己烯雌酚

B: 甲地孕酮

C: 睾酮

D: 他莫昔芬

答案: D

47. 通过抑制 HMG-CoA 还原酶调脂的药物是()

A: 烟酸

B: 依折麦布

C: 阿昔莫司

D: 洛伐他汀

答案: D

48. 下述药物中不可用于治疗深部真菌感染的是

A: 伊曲康唑

B: 两性霉素

C: 灰黄霉素

D: 制霉菌素

答案: C

49. 对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用

A: 氯喹

B: 依米丁

C: 替硝唑

D: 喹碘方

答案: A

50. 作用于造血祖细胞，促进其增殖和分化，促进成熟细胞向外周血释放的药品是

A: rhGM-CSF

B: 硫酸亚铁

C: 维生素 B12

D: 人血白蛋白

答案: A

51. 糖尿病和胰腺炎血症患者应慎用的药物是

A: 螺内酯

B: 甘露醇

C: 呋塞米

D: 氢氯噻嗪

答案: D

52. 糖皮质激素的抗中毒性休克作用是

A: 提高机体对细菌内毒素的耐受力

B: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶

C: 提高中枢神经系统的兴奋性

D: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理

答案: A

53. 深部真菌感染首选药，静脉滴注用于真菌性肺炎、心内膜炎的药物是

A: 制霉菌素

B: 两性霉素 B

C: 膦甲酸钠

D: 奥司他韦

答案: B

54. 重度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选()

A: 5-HT

B: 5-HT

C: 奥美拉唑+口服地塞米松

D: 每日化疗前，应用 5-HT

答案: B

55. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 在使用万古霉素的第 4 个维持剂量给药前测定谷浓度

B: 万古霉素是浓度依赖性抗菌药物

C: 该患者用法不能维持全天稳定的血药浓度

D: 该万古霉素浓度偏低

答案: B

56. 阿托品用于全麻前给药的目的是()

A: 减少麻醉药的用量

B: 增强麻醉效果

C: 预防心动过缓

D: 减少呼吸道腺体分泌

答案: D

57. 体内缺乏维生素 B1 会导致

- A: 脂溢性皮炎
- B: 脚气病
- C: 贫血
- D: 不孕症

答案：B

58. 糖尿病患者、颅内活动性出血患者禁用()

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 乳果糖
- C: 甘油
- D: 硫酸镁

答案：C

59. 属于肾小管上皮细胞钠离子通道抑制剂的是()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 呋塞米
- C: 阿米洛利
- D: 乙酰唑胺

答案：C

60. 伴有前列腺增生的哮喘患者不宜选用的药物是

- A: 磷酸二酯酶抑制剂
- B: 白三烯受体阻断剂
- C: M 胆碱受体阻断剂
- D: 长效 B2 受体激动剂

答案：C

61. 去乙酰毛花苷在体内失去葡萄糖基和乙酸转化为

- A: 洋地黄毒苷
- B: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）
- C: 地高辛
- D: 毛花苷丙（西地兰 C）

答案：C

62. 可降低同型半胱氨酸水平的维生素是

- A: 烟酸
- B: 泛酸钙
- C: 维生素 B
- D: 叶酸

答案：D

63. 氨基糖苷类抗生素对哪类细菌无效

- A: 革兰阴性菌
- B: 铜绿假单胞菌
- C: 厌氧菌
- D: 结核杆菌

答案：C

64. 治疗侵袭性曲霉菌病首选（）

- A: 氟康唑
- B: 氟胞嘧啶
- C: 伏立康唑
- D: 灰黄霉素

答案：C

65. 频繁、剧烈无痰干咳患者宜选用

- A: 可待因
- B: 右美沙芬
- C: 喷托维林
- D: 地关索酯

答案：A

66. 属于阴道局部用药的是

- A: 地屈孕酮
- B: 聚甲酚磺醛
- C: 环磷酰胺
- D: 阿霉素

答案：B

67. 以下药物中，不属于眼用局麻药的是()

- A: 奥布卡因
- B: 丁卡因
- C: 利多卡因
- D: 阿托品

答案：D

68. 我国研制的可用于抗氯喹恶性疟和恶性疟脑型凶险发作的药物是

- A: 青蒿素
- B: 乙胺嘧啶
- C: 伯氨喹
- D: 磷酸咯萘啶

答案：D

69. 癫痫部分性发作首选()。

- A: 苯妥莫钠
- B: 奥卡西平
- C: 乙琥胺
- D: 氯巴占

答案: B

70. 有关氨茶碱平喘作用的叙述错误的是

- A: 激活腺苷酸环化酶
- B: 促进肾上腺素释放
- C: 拮抗腺苷受体
- D: 激活磷酸二酯酶

答案: D

71. 可拮抗维生素 B6 或增加维生素 B6 经肾脏排泄，引起贫血或周围神经炎的是

- A: 糖皮质激素
- B: 异烟肼
- C: 丙磺舒
- D: 雌激素

答案: B

72. 下列不属于一线抗结核药的是

- A: 乙硫异烟胺
- B: 吡嗪酰胺
- C: 链霉素
- D: 利福平

答案：A

73. 属于第二代喹诺酮类药物的是

- A: 诺氟沙星
- B: 萘啶酸
- C: 莫西沙星
- D: 吡哌酸

答案：D

74. 可导致神经毒性(手指、足趾麻木、腱反射消失)的抗肿瘤药是

- A: 博来霉素
- B: 柔红霉素
- C: 长春新碱
- D: 紫杉醇

答案：C

75. 作用优于磺酰脲类，适用餐后血糖升高的治疗药是

- A: 阿卡波糖
- B: 格列本脲
- C: 二甲双胍
- D: 格列齐特

答案：A

76. 通过激动胰高血糖素样肽-1 受体降低血糖的药物

- A: 二甲双胍
- B: 胰岛素皮下注射
- C: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- D: 艾塞那肽

答案：D

77. 螺内酯临床常用于()

- A: 醛固酮升高引起的水肿
- B: 急性肾衰竭
- C: 尿崩症
- D: 脑水肿

答案：A

78. 因全身应用可产生严重的肾毒性、故目前仅限于局部应用的是

- A: 杆菌肽
- B: 替考拉宁
- C: 万古霉素
- D: 去甲万古霉素

答案：A

79. (2015 年真题) 长期大量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，须注意适当补充()。

- A: 维生素 A 和维生素 D
- B: 维生素 C 和烟酸
- C: 维生素 E 和叶酸
- D: 维生素 B 和维生素 K

答案：D

80. 下述哪种疾病不适合外用糖皮质激素治疗

- A: 钱币状湿疹
- B: 异位性皮炎
- C: 未根治的体股癣

D: 固定性药疹

答案: C

81. 阿司匹林的作用是()

A: 促进纤维蛋白溶解

B: 抑制血小板聚集

C: 抑制纤维蛋白溶解

D: 促凝血因子合成

答案: B

82. 通过增强 AT-III 的活性发挥抗凝作用的是

A: 维生素 B12

B: 香豆素类

C: 肝素

D: 维生素 K1

答案: C

83. (2018 年真题) 因抑制血管内皮的前列腺素的生成, 使血管内的前列腺素和血小板中的血栓素动态平衡失调而致血栓形成风险增加的非甾体抗炎药是 ()

A: 吲哚美辛

B: 塞来昔布

C: 双氯芬酸

D: 阿司匹林

答案: B

84. 用于肿瘤化疗引起的中性粒细胞减少症的药物是()

A: 非格司亭

- B: 利可君
- C: 糖皮质激素
- D: 沙格司亭

答案：A

85. 对抗胰岛素降血糖作用的药物是

- A: 蛋白同化激素
- B: 口服降血糖药
- C: 磺胺类药
- D: 甲状腺素

答案：D

86. 用于白色念珠菌、隐球菌和球孢子菌等引起的感染的药物是

- A: 咪康唑
- B: 两性霉素 B
- C: 益康唑
- D: 制霉菌素

答案：D

87. 属于第一代喹诺酮类药物的是

- A: 萘啶酸
- B: 莫西沙星
- C: 诺氟沙星
- D: 吡哌酸

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/848031045044007022>