

2024 年福建省连城县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库大全及一套答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 治疗系统性红斑狼疮选用

- A: 甲硝唑
- B: 吡嗪酮
- C: 氯喹
- D: 甲苯咪唑

答案：C

2. 可降低外周血管阻力，还可减轻前列腺增生症状的药物是()

- A: 利血平
- B: 坎地沙坦
- C: 格列吡嗪
- D: 哌唑嗪

答案：D

3. 可沉积于牙齿和骨中，造成牙齿黄染的药物是()

- A: 链霉素
- B: 四环素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 青霉素

答案：B

4. 可抑制胃酸分泌，升高胃及十二指肠内 pH，防止胰酶失活的是

- A: 乳酸菌素
- B: 胃蛋白酶
- C: 碳酸氢钠
- D: 雷尼替丁

答案：D

5. 氨基糖苷类作用机制

- A: 抑制细菌细胞壁合成
- B: 抑制细菌蛋白质合成
- C: 干扰细菌核酸代谢
- D: 抑制细菌糖代谢

答案：B

6. (2016 年真题) 属于 M 胆碱受体激动剂的降低眼压药是

- A: 毛果芸香碱
- B: 甘露醇
- C: 乙酰唑胺
- D: 噻吗洛尔

答案：A

7. 作用机制是抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶 IV 的药物是()

- A: 异烟肼
- B: 氧氟沙星
- C: 红霉素
- D: 阿莫西林

答案：B

8. 可用于金黄色葡萄球菌等革兰阳性菌所致严重感染的是

- A: 利奈唑胺+苯丙醇胺
- B: 磷霉素钠+万古霉素
- C: 磷霉素氨丁三醇
- D: 利奈唑胺+哌替啶

答案：B

9. 多柔比星用药后 1~2 日可出现

- A: 红色尿
- B: 黄色尿
- C: 绿色尿
- D: 橙色尿

答案：A

10. 克拉维酸与阿莫西林配伍使用是因前者可()

- A: 延缓阿莫西林经肾小管的分泌
- B: 抑制 β -内酰胺酶
- C: 扩大阿莫西林的抗菌谱
- D: 减少阿莫西林的不良反应

答案：B

11. 变异型心绞痛不宜选用的药物是()

- A: 胍乙啶
- B: 硝苯地平
- C: 硝酸甘油
- D: 普萘洛尔

答案：D

12. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 卡莫司汀
- B: 泼尼松
- C: 表柔比星
- D: 多西他赛

答案：A

13. 可抑制维生素 K 环氧化酶活性的抗凝血药是

- A: 达比加群酯
- B: 华法林
- C: 氨甲环酸
- D: 依诺肝素

答案：B

14. 以下药物中，不属于抗胆碱能扩瞳药的是

- A: 阿托品
- B: 新福林
- C: 东莨菪碱
- D: 后马托品

答案：B

15. 对小肠和结肠平滑肌无明显作用的促胃肠动力药是

- A: 西沙比利
- B: 甲氧氯普胺
- C: 多潘立酮
- D: 伊托必利

答案：C

16. 患儿，男，6 岁。三天前出现咳嗽，流涕，体温 38℃，诊断为普通感冒。适用于该患儿的药物为

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 尼美舒利
- C: 保泰松
- D: 曲马多

答案：A

17. (2018 年真题) 可用于降低眼压的药物是 ()

- A: 利福平
- B: 卡替洛尔
- C: 左氧氟沙星
- D: 阿托品

答案：B

18. (2018 年真题) 不属于减鼻充血药的是 ()

- A: 色甘酸钠
- B: 羟甲唑啉
- C: 伪麻黄碱
- D: 麻黄碱

答案：A

19. 属于胆固醇吸收抑制剂的是 ()。

- A: 阿昔莫司
- B: 依折麦布
- C: 非诺贝特
- D: 阿托伐他汀

答案：B

20. 关于地西泮的作用特点，叙述错误的是

- A: 剂量加大可引起麻醉
- B: 小于镇静剂量时即有抗焦虑作用
- C: 有良好的抗癫痫作用
- D: 可增强其他中枢抑制药的作用

答案：A

21. （2021 年真题）血培养结果为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，首选的抗菌药物是（）

- A: 青霉素 G
- B: 万古霉素
- C: 头孢唑林
- D: 左氧氟沙星

答案：B

22. 属于必需氨基酸，人体不能合成或合成速度不能满足人体需要的是

- A: 复方氨基酸注射液(3AA)
- B: 赖氨酸
- C: 复方氨基酸注射液(18AA)
- D: 精氨酸

答案：B

23. 突然停药可导致反跳现象的是

- A: 哌唑嗪
- B: 可乐定
- C: 硝酸甘油
- D: 氨氯地平

答案：C

24. 与卡比马唑合用应谨慎的是

- A: 甲状腺素
- B: 放射性碘
- C: 糖皮质激素
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：B

25. 呋塞米静脉注射用于儿童，一日最大量是

- A: 6mg / kg
- B: 8mg / kg
- C: 2mg / kg
- D: 4mg / kg

答案：A

26. 属于长效糖皮质激素的是

- A: 泼尼松龙
- B: 甲羟孕酮
- C: 地塞米松
- D: 尼尔雌醇

答案：C

27. 关于奥司他韦作用特点的说法，错误的是()

- A: 治疗流感时，首次使用奥司他韦应当在流感症状出现后的 48 小时以内
- B: 1 岁以上儿童可以使用奥司他韦
- C: 奥司他韦可用于甲型和乙型流感的治疗

D: 应严格掌握奥司他韦适应证,不能用于流感的预防

答案: D

28. 长期频繁使用可致眼部真菌感染

A: 更昔洛韦

B: 利巴韦林

C: 四环素可的松

D: 氯霉素

答案: C

29. 可引起眼睛疼痛不适的是

A: 异丙托溴铵

B: 茶碱

C: 氨溴索

D: 乙酰半胱氨酸

答案: A

30. 选择性舒张脑血管的药物是

A: 硝苯地平

B: 维拉帕米

C: 氟桂利嗪

D: 地尔硫革

答案: C

31. 铁剂用于治疗

A: 溶血性贫血

B: 巨幼红细胞性贫血

C: 再生障碍性贫血

D: 小细胞低血红蛋白性贫血

答案：D

32. 属于抗炎类保肝药的是

A: 多烯磷脂酰胆碱

B: 双环醇

C: 还原型谷胱甘肽

D: 异甘草酸镁

答案：D

33. 肾上腺糖皮质激素类药物对电解质的影响是

A: 抑制磷的排泄

B: 抑制钾的排泄

C: 抑制钙的排泄

D: 抑制钠的排泄

答案：D

34. 患者，女，55 岁，晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院。查体：138/90mmHg，心率 120 次/分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

A: 中度透过血-脑屏障

B: 胃肠道吸收不完全

C: 以原型药物经肾脏排泄

D: 较易进入中枢神经系统，可致神经系统不良反应

答案：D

35. (2019 年真题) 患者女，58 岁，血糖升高 10 年，口服二甲双胍治疗，高血压病史 5 年，未规律治疗，近期查体：血压 158/95mmHg，尿常规示蛋白尿 (+++)，适宜该患者使用的降压药物是 ()

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 依那普利
- D: 甲基多巴

答案：C

36. 患者，男，29 岁。因反酸、烧心、胸骨后隐痛 1 个月余就诊。胃镜检查提示，反流性食管炎。最适用于该患者的药物是

- A: 尼扎替丁
- B: 西咪替丁
- C: 雷尼替丁
- D: 奥美拉唑

答案：D

37. 葡萄球菌引起的感染应选用

- A: 利福平
- B: 夫西地酸
- C: 阿昔洛韦
- D: 头孢他啶

答案：B

38. 偏头痛，三叉神经痛选用

- A: 丙戊酸钠
- B: 布桂嗪
- C: 多奈哌齐

D: 佐匹克隆

答案：B

39. 通过影响葡萄膜巩膜通道促进房水流出的的是

A: 前列腺素衍生物

B: α_2 受体激动剂

C: 拟胆碱药

D: 碳酸酐酶抑制剂

答案：A

40. 用药过程中需要监护迟发性腹泻的是()

A: 紫杉醇

B: 多柔比星

C: 长春碱类

D: 伊立替康

答案：D

41. 属于第四代头孢菌素的药物的是()。

A: 头孢哌酮

B: 头孢拉定

C: 头孢吡肟

D: 头孢氨苄

答案：C

42. (2021 年真题) 患者，男，54 岁。拟行膝关节置换术，围手术期宜选用的预防用抗菌药物()

A: 头孢他啶

B: 头孢噻肟

C: 头孢曲松

D: 头孢唑林

答案：D

43. (2016 年真题) 散瞳药阿托品滴眼液的禁用人群是

A: 眼底检查者

B: 青光眼患者

C: 虹膜睫状体炎患者

D: 睫状肌麻痹患者

答案：B

44. 氯吡格雷与奥美拉唑因竞争共同的肝药酶而避免联合应用，该肝药酶是

A: CYP2C19

B: CYP2E1

C: CYP1A2

D: CYP2D6

答案：A

45. 链霉素首选用于()

A: 伤寒、副伤寒

B: 布鲁菌病

C: 鼠疫、土拉菌病

D: 钩端螺旋体病

答案：C

46. 肾上腺皮质功能不全采用

A: 糖皮质激素替代疗法

B: 早期、大剂量、短期应用糖皮质激素

C: 抗结核药与糖皮质激素合用

D: 抗菌药物与糖皮质激素合用

答案：A

47. 癫痫部分性发作首选()。

A: 奥卡西平

B: 苯妥莫钠

C: 氯巴占

D: 乙琥胺

答案：A

48. 下列不属于抗肿瘤药的是

A: 三尖杉酯碱

B: 氟胞嘧啶

C: 长春碱

D: 长春新碱

答案：B

49. 葡萄糖和胰岛素一起静脉滴注，可以用来治疗的是

A: 低钾血症

B: 高钠血症

C: 低钠血症

D: 高钾血症

答案：D

50. (2016 年真题) 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食、增加运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片 20mg/d 治疗

A: Hcy

B: CK

C: Cr

D: BUN

答案：B

51. 以降低三酰甘油为主要治疗目标时，首选的调血脂药是

A: 依折麦布

B: 辛伐他汀

C: 瑞舒伐他汀

D: 非诺贝特

答案：D

52. 属于肾小管上皮细胞钠离子通道抑制剂的是()

A: 乙酰唑胺

B: 阿米洛利

C: 呋塞米

D: 氢氯噻嗪

答案：B

53. (2015 年真题) 我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗疟药是()。

A: 伯氯喹

B: 氯喹

C: 青蒿素

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 奎宁

答案: C

54. (2018 年真题) 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐, 宜选用的止吐治疗方案是 ()

- A: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦, 化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松
- B: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
- C: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松, 化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼
- D: 化疗前使用昂丹司琼, 化疗后不需要继续使用止吐药

答案: A

55. 硫脲类药物的基本作用是

- A: 抑制甲状腺蛋白水解酶
- B: 抑制碘泵
- C: 抑制甲状腺素的生物合成
- D: 抑制 Na^+-K^+ 泵

答案: C

56. (2016 年真题) 哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: 短效 β_2 受体激动剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: 吸入性糖皮质激素

答案: B

57. 属于 CYP2C9 的诱导剂, 可以减少氟伐他汀的生物利用度 50% 的是

- A: 地高辛
- B: 红霉素

C: 利福平

D: 烟酸

答案: C

58. 在体内消除缓慢，有蓄积性的药物是

A: 哌替啶

B: 利多卡因

C: 洋地黄毒苷

D: 阿托品

答案: C

59. 下列对孕激素作用的描述，哪一项是不正确的()

A: 抑制子宫平滑肌的收缩

B: 促进乳腺腺泡发育，为哺乳做准备

C: 大剂量抑制卵巢排卵

D: 促进女性性器官的发育成熟

答案: D

60. 属于润滑性泻药的是

A: 乳果糖

B: 聚乙二醇 4000

C: 甘油（开塞露）

D: 酚酞

答案: C

61. 曲霉菌主要通过呼吸道侵入机体，主要侵犯()

A: 脑

B: 心脏

C: 肺脏

D: 窦腔

答案: C

62. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

A: 注射与口服并用

B: 短期口服给药

C: 长期口服给药

D: 注射给药

答案: B

63. 用于耐甲氧西林的金葡萄菌引起的严重感染()

A: 克拉霉素

B: 万古霉素

C: 红霉素

D: 克林霉素

答案: B

64. 下列哪种药物与碳酸钙合用时，易发生高钙血症

A: 阿莫西林

B: 噻嗪类利尿剂

C: 氧化镁

D: 四环素类

答案: B

65. 降低肾素活性最强的药物是

- A: 硝苯地平
- B: 卡托普利
- C: 可乐定
- D: 普萘洛尔

答案：D

66. 硫脲类最重要的不良反应是

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 粒细胞下降
- C: 甲状腺素
- D: 血管神经性水肿

答案：B

67. 格列本脲的降糖作用机制是

- A: 胰岛素皮下注射
- B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- C: 二甲双胍
- D: 静脉用胰岛素

答案：B

68. (2019 年真题) 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

- A: 螺内酯
- B: 呋塞米
- C: 贝那普利
- D: 比索洛尔

答案：C

69. (2018 年真题) 配制静脉输液时, 应选择氯化钠注射液或乳酸钠林格注射液稀释, 不得使用葡萄糖注射液稀释的抗真菌药是 ()

- A: 两性霉素 B
- B: 伏立康唑
- C: 卡泊芬净
- D: 氟康唑

答案: C

70. 布美他尼属于下列哪类利尿药

- A: 碳酸酐酶抑制药
- B: 高效能利尿药
- C: 保钾利尿药
- D: 中效能利尿药

答案: B

71. (2018 年真题) 关于氨基糖苷类药物作用特点的说法, 错误的是 ()

- A: 氨基糖苷类药物对多数需氧的革兰阴性杆菌具有很强的杀菌作用
- B: 氨基糖苷类药物是浓度依赖型速效杀菌剂
- C: 氨基糖苷类药物常见的不良反应为耳毒性和肾毒性
- D: 氨基糖苷类药物主要抑制细菌蛋白质合成, 影响细菌细胞壁黏肽的合成

答案: D

72. 眼底散瞳检查宜选用

- A: 拉坦前列素滴眼剂
- B: 碘苷滴眼剂
- C: 氯霉素滴眼剂

D: 托吡卡胺滴眼剂

答案：D

73. 用于先兆性流产和习惯性流产

A: 雷洛昔分

B: 地塞米松

C: 黄体酮

D: 米非司酮

答案：C

74. ACEI 与 () 联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸及血糖的不良影响。

A: 噻嗪类利尿剂

B: 人促红素

C: 留钾利尿剂

D: β 受体阻断剂

答案：A

75. (2018 年真题) 可与奎尼丁发生与 P 糖蛋白有关的相互作用的药物是 ()

A: 达比加群酯

B: 肝素钠

C: 华法林

D: 低分子肝素

答案：A

76. 丙烯胺类抗真菌的代表药为 ()

A: 伊曲康唑

B: 特比萘芬

C: 伏立康唑

D: 卡泊芬净

答案: B

77. 长期服用避孕药产生的不良反应不包括

A: 心律失常

B: 类早孕反应

C: 胃肠道反应

D: 月经失调

答案: A

78. 利多卡因对哪种心律失常无效()

A: 室上性

B: 室性期前收缩

C: 心室纤颤

D: 阵发性室性心动过速

答案: A

79. 下列哪种疼痛不用吗啡治疗

A: 神经压迫性疼痛

B: 急性锐痛

C: 胆绞痛及肾绞痛

D: 癌性剧痛

答案: A

80. 氟西汀的作用机制是

A: 抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解

B: 抑制突触前膜对去甲肾上腺素的再摄取

C: 抑制 5-HT 及去甲肾上腺素的再摄取

D: 选择性抑制 5-HT 的再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度

答案：D

81. 可用于急慢性支气管炎的治疗，还能用于环磷酰胺出血性膀胱炎治疗的药物是

A: 羧甲司坦

B: 氨溴索

C: 溴己新

D: 乙酰半胱氨酸

答案：D

82. 主要作用于远曲小管和集合管、直接阻止 Na^+ 通道而抑制 Na^+-K^+ 交换，伴有血钾升高的药物是

A: 氨苯蝶啶

B: 乙酰唑胺

C: 螺内酯

D: 甘露醇

答案：A

83. 患者男，8 岁，静脉滴注美洛西林后立即出现胸气短、呼吸困难喉头水肿，考虑为青霉素类抗生素的过敏反应按照其发生机制，该患者发生的过敏反应在分型上属于（）

A: III 型变态反应

B: I 型变态反应

C: IV 型变态反应

D: II 型变态反应

答案：B

84.（2017 年真题）属于选择性 5-HT₄ 受体激动剂，促进乙酰胆碱释放的促胃肠动药是（）

- A: 昂丹司琼
- B: 甲氧氯普胺
- C: 莫沙必利
- D: 多潘立酮

答案：C

85. 抑制核苷酸还原酶

- A: 羟基脲
- B: 阿糖胞苷
- C: 氟尿嘧啶
- D: 甲氨蝶呤

答案：A

86. 抑制胃酸分泌作用最强的是（）

- A: 雷尼替丁
- B: 法莫替丁
- C: 西咪替丁
- D: 奥美拉唑

答案：D

87. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 托拉塞米

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 乙酰唑胺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/848071134043007022>