

2024 年福建省建宁县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试及答案【精选题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 合并三度房室传导阻滞的高血压患者不宜选用

- A: 卡托普利
- B: 多沙唑嗪
- C: 维拉帕米
- D: 哌唑嗪

答案：C

2. 很多药物存在血液系统影响，会造成某些血细胞增多或减少头孢拉定主要会造成

- A: 中性粒细胞减少
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 嗜碱性粒细胞增多
- D: 嗜酸性粒细胞减少

答案：B

3. 患者，男，72 岁，因病毒性感冒而致发热，体温 39.2℃，伴轻咳、痰多且黏稠。今日“支气管哮喘”宿疾复发。家人前来药店购买对乙酰氨基酚片、右美沙芬片、氨溴索片、沙丁胺醇气雾剂。药师提供的用药指导中，错误的是

- A: 右美沙芬宜睡前服用
- B: 沙丁胺醇气雾剂每次 1~2 喷，第 1 小时内每 20 分钟给药一次，随后调整为每 3~4h 一次

C: 右美沙芬和氨溴索同时服用

D: 服药期间禁止饮酒

答案: C

4. 防心绞痛药物

A: 甘草合剂

B: 胃黏膜保护剂

C: 去氨加压素

D: 硝酸甘油

答案: D

5. 癫痫持续状态的好发年龄段是

A: 1 岁以内及 65 岁以上

B: 65 岁以上

C: 6 岁以内

D: 55 岁以上

答案: A

6. 单侧头痛伴光敏感、恶心、呕吐提示

A: 偏头痛

B: 脑血管意外

C: 脑肿瘤

D: 脑膜炎

答案: A

7. 低比重尿主要见于

A: 糖尿病

B: 急性肾小球肾炎

C: 尿崩症

D: 急性肾衰竭少尿期

答案: C

8. 通过抑制磷酸二酯酶，升高 cAMP 水平，加强心肌收缩力的非苷类药物是

A: 地高辛

B: 米力农

C: 卡维地洛

D: 洋地黄毒苷

答案: B

9. 解热镇痛药用于退热属于对症治疗，因此两次用药的间隔时间应该是

A: 2~4 小时

B: 3~5 小时

C: 5~7 小时

D: 4~6 小时

答案: D

10. 以质量调整生命年或者质量调整预期寿命为量化指标所开展的药物经济学评价方法属于查

A: 成本-效果分析

B: 最小成本分析

C: 成本-效用分析

D: 成本-效益分析

答案: C

11. 冠心病患者如不能耐受 ACEI，可考虑给予

- A: 地高辛
- B: α 受体拮抗剂
- C: β 受体激动剂
- D: AR

答案：D

12. (2021 年真题) 下列组合中，属于联合化疗的是 ()

- A: CHOP 方案 (环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+泼尼松)
- B: MTX 方案 (甲氨蝶呤小剂量鞘内注射+甲氨蝶呤大剂量静脉输注)
- C: VEGF 抑制剂+ALK 抑制剂 (贝伐珠单抗+奥希替尼)
- D: CTX+美司钠 (环磷酰胺+美司钠)

答案：A

13. 血液制品应放在 ()。

- A: 凉暗库
- B: 常温库
- C: 专用仓库
- D: 低温库

答案：D

14. 在治疗痛风时，应用尿酸药的过程中应多饮水，一日尿量宜保持在

- A: 500ml 以上
- B: 1000ml 以上
- C: 1500ml 以上
- D: 2000ml 以上

答案：D

15. (2019 年真题) 湿疹患者的实验室检查结果常会出现

- A: 中性粒细胞减少
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 淋巴细胞减少
- D: 淋巴细胞增多

答案: B

16. 患者, 女 67 岁出现认知功能障碍 5 年, 诊断为阿尔茨海默病, 予以美金刚治疗。下列药物中, 可增加美金刚血药浓度的是 ()

- A: 碳酸氢钠
- B: CYP3A4 制剂
- C: 氯化铵
- D: CYP2D6 抑制剂

答案: A

17. 依据生物钟规律, 适宜睡前服用的药品是

- A: 苯海拉明
- B: 沙丁胺醇
- C: 奥利司他
- D: 氟伏沙明

答案: B

18. IV 期临床试验样本数为

- A: 100~300 例
- B: 20~30 例
- C: 常见病 ≥ 2000 例
- D: 常见病 ≥ 1000 例

答案：C

19. 患者，女，48 岁，身高 158cm，体重 72kg。最近因感觉易疲劳、怕冷、嗜睡、记忆力逐渐减退等情况前来就医。医生检查发现，患者眼睑和手部皮肤水肿，声音嘶哑、毛发稀落。实验室检查示：血清 TSH 水平升高。确诊为甲状腺功能减退症。

- A: 3-4 周
- B: 2-3 周
- C: 6-12 周
- D: 4-6 周

答案：D

20. 正常剂量氯化钾的妊娠毒性分级是()

- A: B 级
- B: X 级
- C: A 级
- D: C 级

答案：C

21. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别) 右眼

- A: NS
- B: LD
- C: O
- D: DOL

答案：C

22. 女性红细胞沉降率的正常范围值

- A: 0~5mm/h

B: 0~10mm/h

C: 0~15mm/h

D: 0~20mm/h

答案: D

23. 妊娠期间，药物致畸的高敏感期是

A: 妊娠 3 天

B: 受精后 3 周~3 个月

C: 受精后 3 周以内

D: 妊娠 18 天

答案: B

24. 6 个月~2 岁婴幼儿白细胞计数正常参考区间是

A: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9 / L$

B: $(200 \sim 300) \times 10^9 / L$

C: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9 / L$

D: $(100 \sim 300) \times 10^9 / L$

答案: C

25. 降钙素属于

A: 激素替代剂

B: 骨形成刺激剂

C: 骨吸收抑制剂

D: 促进骨矿化剂

答案: C

26. 需要用 10%酒精或植物油冲洗的是

A: 毛发被毒物污染

- B: 皮肤污染酚类毒物
- C: 眼内污染毒物
- D: 眼内进入固体腐蚀性颗粒

答案：B

27. 苯妥英钠可能导致的多种不良反应中, 不包括()

- A: 共济失调
- B: 牙龈增生
- C: 视物模糊
- D: 低血糖

答案：D

28. 下列中药、化学药联合应用, 不存在重复用药的是

- A: 曲克芦丁片联用维生素 C 片
- B: 鼻炎康片联用马来酸氯苯那敏片
- C: 消渴丸联用格列本脲片
- D: 新癬片联用吡哆美辛胶囊

答案：A

29. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期, 最易受到外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期为胎儿发育的最后阶段, 器官形成过程已经大体完成并继续发育, 某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 头孢菌素
- B: 碳青霉烯类
- C: 青霉素
- D: 氟喹诺酮类

答案：D

30. 杨某，女，19 岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性啰音；WBC $>13\times 10$

- A: 链霉素
- B: 利福霉素
- C: 青霉素 G
- D: 左氧氟沙星

答案：D

31. 适用于有完整子宫，仍希望有月经样出血的妇女

- A: 雌孕激素序贯用药
- B: 单纯雌激素补充治疗
- C: 单纯孕激素补充治疗
- D: 雌孕激素连续联合用药

答案：A

32. 作为预防用药错误策略，制定新药新知识培训制度，归属于

- A: 人员知识培训
- B: 管理规范到位
- C: 科学发展
- D: 环境与流程的优化与持续改进

答案：A

33. 作用于靶器官的多巴胺受体，神经系统副作用罕见的是

- A: 多潘立酮
- B: 西沙必利
- C: 甲氧氯普胺
- D: 莫沙必利

答案：A

34. 真菌引起的阴道炎宜选用

- A: 咪康唑
- B: 庆大霉素
- C: 聚甲酚磺醛
- D: 甲硝唑

答案：A

35. 糖尿病酮症酸中毒患者应选用

- A: 二甲双胍
- B: 胰岛素
- C: 大剂量碘剂
- D: 格列本脲

答案：B

36. 可引起驾驶员视物模糊的药物是

- A: 抗过敏药
- B: 阿米洛利
- C: 双嘧达莫
- D: 东莨菪碱

答案：D

37. 在中成药活胃胶囊、神曲胃痛片、陈香白露片、复方陈香味片、复方田七胃痛片中，所含有的共同组分是

- A: 碳酸镁
- B: 氢氧化铝
- C: 碳酸氢钠
- D: 氧化镁

答案：C

38. 通过阻断 β 受体，同时具有血管扩张作用的非苷类药物是

- A: 卡维地洛
- B: 米力农
- C: 洋地黄毒苷
- D: 地高辛

答案：A

39. 利血平+氢氯噻嗪

- A: 抑制乙醛脱氢酶
- B: 抑制氧化代谢反应
- C: 造成听神经和肾功能不可逆性损害
- D: 产生有利的药物相互作用

答案：D

40. 由肝脏清除，但并无明显毒性反应的药物

- A: 须谨慎使用，必要时减量给药
- B: 必须减量应用
- C: 一般无须调整剂量
- D: 尽可能避免使用

答案：A

41. 应在餐前服用的药物是

- A: 呋塞米片
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 氨茶碱片
- D: 吡罗昔康片

答案：B

42. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

- A: 伪麻黄碱
- B: 苯海拉明
- C: 愈创木酚甘油醚
- D: 右美沙芬

答案：A

43. 告知"坦洛主要用于良性前列腺增生症，不能作为抗高血压药"属于

- A: 药品不良反应
- B: 新药信息
- C: 药物相互作用
- D: 禁忌证

答案：D

44. 患者，女，64岁，患2型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片0.5gtidpo，瑞格列奈片1mg tidpo，阿托伐他汀钙片20mg qdpo等药物治疗。

- A: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何时候固定时间给药
- B: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等
- C: 瑞格列奈片应于餐前服用
- D: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用

答案：D

45. 育龄期妇女癫痫可酌情选用（）

- A: 卡马西平

B: 丙戊酸钠

C: 乙琥胺

D: 托吡酯

答案：A

46. (2021 年真题) 患者, 男, 45 岁, 因消化不良 (上腹饱胀, 餐后明显) 来药店咨询。下列说法错误的是 ()

A: 应除外器质性疾病

B: 可用助消化药对症治疗

C: 进餐时不要摄入过多的液体

D: Hp 感染是引起消化不良的常见原因

答案：D

47. 利尿降压药的常见不良反应是

A: 水、电解质紊乱

B: 体位性低血压

C: 咳嗽

D: 首剂现象

答案：A

48. (2016 年真题) 治疗口腔溃疡时, 贴敷于溃疡处, 每处 1 片, 一日不得超过 3 片的药物是 ()。

A: 冰硼咽喉散

B: 地塞米松粘贴片

C: 甲硝唑口腔粘贴片

D: 西地碘含片

答案：B

49. 患者，男，70 岁，良性前列腺增生症病史 5 年，应用 $\alpha 1$ 肾上腺素能受体阻断剂特拉唑嗪治疗，可能导致的不良反应是

- A: 乳腺增生
- B: 干咳
- C: 尿潴留
- D: 体位性低血压

答案：D

50. 适宜餐前服用的助消化药是

- A: 法莫替丁
- B: 硫糖铝
- C: 乳酸菌素
- D: 铝碳酸镁

答案：C

51. 患尿路感染，在无病原学结果前，一般首选（）

- A: 针对革兰阳性球菌有效的抗菌药物
- B: 针对革兰阴性杆菌有效的抗菌药物
- C: 针对革兰阳性杆菌有效的抗菌药物
- D: 针对革兰阴性球菌有效的抗菌药物

答案：B

52. （2018 年真题）患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：

- A: 质子泵抑制剂餐后服用
- B: 甲硝唑餐后服用
- C: 铋剂餐后服用
- D: 甲硝唑餐前服用

答案：B

53. 在医生的指导下使用已证明对胚胎与胎儿无害的药物，即

- A: 选用对胎儿危害较小的药物
- B: 用药必须有明确的指征和适应证
- C: 禁止用试验性药
- D: 可用可不用的药物应尽量不用或少用

答案：B

54. 轻微的反应或疾病、症状不发展、一般无需治疗，应判为

- A: 弱轻度
- B: 重度
- C: 轻度
- D: 中度

答案：C

55. 卡马西平使环孢菌素疗效降低属于()。

- A: 与血浆蛋白结合
- B: 作用于同一受体的拮抗作用
- C: 酶诱导作用
- D: 排泄

答案：C

56. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件，具有

- A: 经济性、法律性和合理性
- B: 技术性、经济性和合法性
- C: 法律性、技术性和经济性
- D: 技术性、有效性和经济性

答案：C

57. 可引起眩晕或幻觉的药物是

- A: 阿米洛利
- B: 氯苯那敏
- C: 东莨菪碱
- D: 右美沙芬

答案：D

58. 不能发现"长时间应用才能发生或停药后迟发"的药品不良反应，缘于

- A: 管理漏洞
- B: 考察不全面
- C: 观察时间短
- D: 病例数目少

答案：C

59. 药师应对“患者投诉”，下列说法不正确的是

- A: 保存有形证据
- B: 接待者应举止大方，行为端庄
- C: 当事人需要亲自接待
- D: 尽快将投诉人带离现场

答案：C

60. 肌酸激酶超过正常值可

- A: 诊断黄疸
- B: 诊断痛风
- C: 诊断贫血

D: 诊断心肌梗死

答案：D

61. 蛋白酶抑制剂

A: 利巴韦林

B: 依非韦伦

C: 利托那韦

D: 齐多夫定

答案：C

62. 去甲肾上腺素和特异性 5-羟色胺能抗抑郁药

A: 氟伏沙明

B: 氯米帕明

C: 米氮平

D: 吗氯贝胺

答案：C

63. 以下"规范应用白三烯受体拮抗剂治疗慢性阻塞性肺疾病"的叙述中，不正确的是

A: 不适用于轻、中度哮喘和稳定期的控制

B: 在治疗 COPD 时不宜单独应用

C: 不宜首选治疗急性哮喘

D: 不宜用于急性发作

答案：A

64. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

A: 门冬胰岛素

B: 维生素 C

C: 青霉素

D: 非那雄胺

答案: D

65. 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药

B: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药

C: 酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药

D: 酚麻美敏口服液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

答案: C

66. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度中度贫血为

A: 60~90g / L

B: 30~60g / L

C: 90~120g / L

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 120～160g / L

答案：A

67. 6 岁以下的儿童应该慎用的抗过敏药品是

- A: 庆大霉素
- B: 四环素
- C: 依巴斯汀
- D: 氯雷他定

答案: C

68. 抑制前列腺内双氢睾酮水平，达到降低雄激素水平，提高最高尿流率

- A: 索利那新
- B: 度他雄胺
- C: 哌唑嗪
- D: 特拉唑嗪

答案: B

69. 多柔比星的通用名是

- A: 病毒唑
- B: 无环鸟苷片
- C: 克毒星
- D: 阿霉素

答案: D

70. 稳定型心绞痛的临床表现不包括

- A: 胸痛
- B: 针刺或刀扎样锐性痛
- C: 压迫、发闷
- D: 多持续 3~5 分钟

答案：B

71. 脂肪或酪蛋白消化不良（儿童）可呈现

- A: 鲜血便
- B: 白陶土便
- C: 乳凝块便
- D: 柏油黑便

答案：C

72. 导致妊娠期妇女口服药物吸收减慢，达峰时间滞后，生物利用度下降的主要原因是

- A: 妊娠时雌激素分泌减少，孕激素分泌增多
- B: 妊娠时胃酸分泌增多，胃肠活动增强
- C: 妊娠时体液总量和细胞外液都有所增加
- D: 妊娠时胃酸分泌减少，胃肠活动减弱

答案：D

73. 下列关于抗失眠药物治疗策略的说法，正确的是

- A: 药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测
- B: 失眠继发于或伴发于其他疾病时，应同时治疗原发或伴发疾病
- C: 焦虑障碍患者存在失眠时，以抗失眠药物治疗为主
- D: 原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯二氮革类抗失眠药

答案：B

74. 患者，女，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见 WBC $15 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 克林霉素
- B: 左氧氟沙星
- C: 罗红霉素
- D: 庆大霉素

答案：B

75. 用药期间尿液可呈橘红色的抗结核药物是

- A: 链霉素
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：D

76. 在药师应该具备的诸项专业技能中，作为药师的最基本工作的是

- A: 处方点评
- B: 处方调剂
- C: 处方审核
- D: 药品警戒技能

答案：B

77. 口服可治疗肝豆状核变性病的是

- A: 依地酸钙钠
- B: 青霉胺
- C: 二巯丁二钠
- D: 二巯丙醇

答案：B

78. (2015 年真题) 在处方适宜性审核时，应特别注意是否有潜在临床意义的相互作用和配伍禁忌。下列药物合用会有不良互相作用的是（ ）。

- A: 头孢哌酮和舒巴坦
- B: 甲氧氯普胺和氯丙嗪
- C: 苄丝肼和左旋多巴
- D: 阿莫西林和克拉维酸钾

答案：B

79. 适用于夜间服用的药物是

- A: 利尿药
- B: 糖皮质激素
- C: 氨基糖苷类
- D: 他汀类

答案：D

80. 判断尿路感染是复发还是再感染，多以在停药后几周再发为依据

- A: 6 周
- B: 5 周
- C: 4 周
- D: 3 周

答案：A

81. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排除毒物的同时，应积极使用特效拮抗剂。

- A: 二巯丁二钠
- B: 依地酸钙钠
- C: 二巯丙醇

D: 青霉胺

答案: C

82. 禁止与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括

A: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

B: 5-HT

C: 苯二氮

D: 三环类药物

答案: C

83. 是否增加房颤患者死亡率尚无定论，可谨慎地用于房颤的心室率控制的是()

A: 地高辛

B: 地尔硫

C: 美托洛尔

D: 普罗帕酮

答案: A

84. 下列药品宜冷处贮藏但不应冷冻的是:

A: 双歧三联活菌制剂

B: 甘露醇注射剂

C: 氯化钠注射液

D: 卡前列甲酯栓剂

答案: A

85. 医师无权调配处方

A: 技术性

B: 法律性

C: 经济性

D: 有效性

答案: B

86. 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管

A: 糖浆剂

B: 泡腾片

C: 胶囊剂

D: 粉剂

答案: D

87. 下列五种内服药品中，应在餐前服用的药物是

A: 呋塞米片

B: 吡罗昔康片

C: 氨茶碱片

D: 胶体果胶铋胶囊

答案: D

88. 治疗反复性偏头痛推荐应用的处方药是

A: 谷维素

B: 阿司匹林

C: 苯妥英钠

D: 麦角胺咖啡因

答案: D

89. 使用片、粒、袋、支等清晰易懂的计数单位，是针对

A: 交代药物的用量

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 交代药品贮存条件与方法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/855300330120012033>