

9.8介入血管外科护理基础理论考试

您的姓名： [填空题] *

您的部门： [单选题] *

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/> 介入血管外一科 | <input type="radio"/> 介入血管外二科 | <input type="radio"/> 介入血管外三科 |
| <input type="radio"/> 介入血管外四科 | <input type="radio"/> 介入复合手术部 | |

其它信息如工号： [填空题] *

1.病室最适宜的温度和相对湿度分别是（ ） [单选题] *

- A. 14~16℃; 30%~40%
- B. 16~18℃; 40%~50%
- C. 16~18℃; 50%~60%
- D. 18~22℃; 50%~60% (正确答案)
- E. 22~24℃; 60%~70%

2.4 护士配置化疗药物时应佩戴（ ） [单选题] *

- A. 无菌手套
- B. 一次性 PVC 手套
- C. 一次性橡胶手套
- D. 双层乳胶手套
- E. 乳胶手套内套一副 PVC 手套 (正确答案)

3.6 护士处理医嘱时，应先执行（ ） [单选题]*

- A. 停止医嘱 (正确答案)
- B. 临时医嘱
- C. 临时备用医嘱
- D. 长期备用医嘱
- E. 新开的长期医嘱

4.7 提示高热病人退热期可能发生虚脱表现的是（ ） [单选题]*

- A. 皮肤潮红、寒战、出汗
- B. 头晕、恶心、无汗
- C. 脉搏呼吸渐慢、无汗
- D. 脉细速、四肢厥冷、出汗 (正确答案)
- E. 脉细速、面色潮红、无汗

5.8 可使血压测量值偏高的因素是（ ） [单选题]*

- A. 手臂位置过高
- B. 袖带过紧
- C. 袖带过松 (正确答案)
- D. 袖带过宽
- E. 眼睛视线高于水银柱弯月面

6.10 为膀胱高度膨胀病人导尿，第一次放尿超过 1000ml 时可导致（ ） [单选题]

*

- A. 胆红素尿
- B. 血尿 (正确答案)
- C. 蛋白尿
- D. 尿频尿痛
- E. 反射性尿失禁

7. 11、当病人胆道完全堵塞时，因胆汁不能进入肠道，粪便呈（ ） [单选题]*

- A. 鲜红色
- B. 暗红色
- C. 柏油样便
- D. 陶土色 (正确答案)
- E. 果酱样便

8. 12 发挥药效最快的给药途径是（ ） [单选题]*

- A. 口服给药
- B. 皮肤粘膜给药
- C. 吸入给药
- D. 皮下注射
- E. 静脉注射 (正确答案)

9. 13 输液过程中容易导致静脉痉挛的原因是（ ） [单选题]*

- A. 输液速度过快
- B. 液体注入皮下组织
- C. 针头阻塞

- D. 患者肢体抬举过高
- E. 输入的药液温度过低 (正确答案)

10. 14、下列不符合铺床省力原则的是 () [单选题]*

- A. 备齐用物，按顺序放置
- B. 身体尽量靠近床沿
- C. 上身前倾，两膝直立 (正确答案)
- D. 下肢前后分开，降低重心
- E. 使用肘部力量，动作轻柔

11. 15、采集静脉血标本时，以下操作正确的是 () [单选题]*

- A. 抽取全血标本后，注入干燥试管
- B. 为危重病人采集血标本，可从输液针头处抽取
- C. 采集血培养标本后，迅速注入抗凝试管内
- D. 同时抽取不同类型的血标本时注入顺序为:血培养瓶→抗凝试管→干燥试管 (正确答案)
- E. 血清标本注入试管后，应轻轻旋转摇匀

12. 17、心肺复苏时，判断和评估呼吸的时间不能超过 () [单选题]*

- A. 5 秒
- B. 6 秒
- C. 8 秒
- D. 10 秒 (正确答案)
- E. 15 秒

13.19 消化性溃疡病人饮食宜少量多餐，其意义是（ ） [单选题]*

- A. 避免胃窦部过度扩张 (正确答案)
- B. 中和胃酸
- C. 减轻腹痛
- D. 减少对胃刺激
- E. 促进消化

14.20 尿路刺激征是指（ ） [单选题]*

- A. 多尿、尿频、尿急
- B. 多尿、尿急、尿痛
- C. 多尿、尿急、腰痛
- D. 尿频、尿急、尿痛 (正确答案)
- E. 尿急、尿痛、腰痛

15.21 门静脉高压患者出血的特点是（ ） [单选题]*

- A. 以呕血为主，可自行停止
- B. 以便血为主，可自行停止
- C. 有呕血、便血，可自行停止
- D. 有呕血、便血，不可自行停止 (正确答案)
- E. 出血量大，不可自行停止

16.24 对于癫痫持续发作病人，护士首先应做的准备是（ ） [单选题]*

- A. 做好约束准备
- B. 准备地西泮静脉注射 (正确答案)

- C. 准备 20% 甘露醇静脉注射
- D. 准备鼻饲抗癫痫药
- E. 准备 50% 葡萄糖静脉注射

17.25 关于脑出血的护理措施，下列叙述错误的是（ ） [单选题]*

- A. 绝对卧床休息 24 小时，此后可以慢慢活动 (正确答案)
- B. 各项治疗、护理操作集中进行，以减少刺激
- C. 置病人平卧位，头偏向一侧或侧卧位
- D. 过度烦躁不安的病人可遵医嘱适量应用镇静药
- E. 每 2~3 小时应协助病人变换体位一次

18.26 等渗性缺水病人体液变化的特点是（ ） [单选题]*

- A. 细胞内液、细胞外液均减少
- B. 细胞内液减少，细胞外液正常
- C. 细胞外液减少，细胞内液正常 (正确答案)
- D. 细胞外液减少，细胞内液增多
- E. 细胞内液减少，细胞外液增多

19.27 为休克病人行扩容治疗时，首选的液体是（ ） [单选题]*

- A. 5%葡萄糖溶液
- B. 10%葡萄糖溶液
- C. 平衡盐溶液 (正确答案)
- D. 生理盐水
- E. 血浆

20. 28. 术后病人早期呕吐的最常见原因是（ ） [单选题]*

- A. 急性胃扩张
- B. 水电解质紊乱
- C. 麻醉反应 (正确答案)
- D. 急性肠梗阻
- E. 胃肠蠕动受抑制

21. 30. 静脉推注化学治疗药物时局部疼痛、肿胀，应采取的措施是（ ） [单选题]

*

- A. 减慢推注速度
- B. 停止输注，采取处理措施 (正确答案)
- C. 稀释药物滴注
- D. 更换药液
- E. 重新配置药液

22. 31. 胃大部切除术后使用胃肠减压时若胃管堵塞应（ ） [单选题]*

- A. 重新置管
- B. 加压吸引
- C. 停止减压
- D. 可用 10~20ml 生理盐水冲洗胃管 (正确答案)
- E. 夹住胃管暂停减压

23. 32. 护士注意甲状腺切除术后病人发音和吞咽情况是为了评估有无（ ） [单选题]*

- A. 伤口出血
- B. 神经损伤 (正确答案)
- C. 麻醉清醒
- D. 气管塌陷
- E. 痰液阻塞

24. 34、 T管和腹腔引流管护理措施不同的是 () [单选题]*

- A. 保持引流管的通畅
- B. 更换引流袋时要无菌操作
- C. 观察引流量、色和性状
- D. 拔管前须试行夹管 1-2日 (正确答案)
- E. 引流袋不得高于引流出口

25. 35、 长期卧床病人预防足下垂畸形的措施是 () [单选题]*

- A. 禁止踝关节的活动
- B. 使踝关节长期处于跖屈
- C. 抬高患肢
- D. 睡软床
- E. 经常做踝关节的主动或被动锻炼 (正确答案)

26. 36、 以下关于医疗废物管理错误的是 () [单选题]*

- A. 可疑患者产生的生活垃圾应归于黑色垃圾袋 (正确答案)
- B. 应当使用专用医疗废物收集桶
- C. 医疗废物桶应加盖并有明显标识

D. 存放医疗废物的容器应防渗

E. 可疑患者使用后的医疗废物需采用双层黄色医疗废物袋

27. 37、开启的无菌包有效期为（ ），铺好的无菌盘有效期为（ ） [单选题]*

A. 12 小时;4小时

B. 12 小时;8小时

C. 24 小时;4小时 (正确答案)

D. 24 小时;8小时

E. 24 小时;12小时

28. 40、被 HIV 阳性患者血液、体液污染的锐器刺伤时，应进行血源性传播疾病的血清学水平基线检查，在（ ）内抽血查 HIV 抗体，报告医院感染管理部门、保健科，进行登记;根据暴露级别及病毒载量水平实施预防性用药方案。 [单选题]*

A. 4 小时

B. 8 小时

C. 12 小时

D. 24 小时 (正确答案)

E. 36 小时

29. 41、静脉注射需针尖与皮肤呈（ ）进针。 [单选题]*

A. $15^{\circ}\sim 30^{\circ}$ (正确答案)

B. $30^{\circ}\sim 45^{\circ}$

C. $20^{\circ}\sim 30^{\circ}$

D. $15^{\circ}\sim 35^{\circ}$

~30°

30. 42) [单选题]*

- A. 12~24 小时
- B. 24~48 小时
- C. 36~72 小时
- D. 48~72 小时
- E. 72~96 小时 (正确答案)

31. 43 成人雾化吸入合适的氧气流量是 () [单选题]*

- A. 3~5L/min
- B. 3~6L/min
- C. 5~8L/min
- D. 6~8L/min (正确答案)
- E. 6~9L/min

32. 45 进行鼻饲操作时, 应缓慢注入鼻饲液或药液, 每次注入量不超过 () [单选题]*

- A. 100ml
- B. 150ml
- C. 200ml (正确答案)
- D. 250ml
- E. 300ml

心环形向外消毒皮肤，直径大于（ ） [单选题]*

- A. 5cm
- B. 6cm
- C. 7cm
- D. 8cm (正确答案)
- E. 9cm

34. 47、进行女性患者导尿操作时，将导尿管轻轻插入尿道内（ ），见尿后再插入（ ）左右。 [单选题]*

- A. 3~4cm;1cm
- B. 4~6cm;1cm (正确答案)
- C. 5~7cm;1cm
- D. 4~6cm;2cm
- E. 5~7cm;2cm

35. 48、大量不保留灌肠常用灌肠液为（ ） [单选题]*

- A. 0.1%~0.2%肥皂水溶液和生理盐水 (正确答案)
- B. 50%硫酸镁溶液和生理盐水
- C. 0.1%~0.2%肥皂水溶液和液状石蜡
- D. 50%硫酸镁溶液和液状石蜡
- E. 0.1%~0.2%肥皂水溶液和 50% 硫酸镁溶液

36. 49、以下可进行冷湿敷的部位是（ ） [单选题]*

- B. 足底
- C. 心前区
- D. 腹部
- E. 前额 (正确答案)

37.52 PPD 试验 () 后观察结果。 [单选题]*

- A. 12~24 小时
- B. 24~48 小时
- C. 36~48 小时
- D. 48~72 小时 (正确答案)
- E. 64~72 小时

38.53 一级防护用品不包括 () [单选题]*

- A. 医用防护口罩 (正确答案)
- B. 一次性工作帽
- C. 工作服
- D. 一次性乳胶手套
- E. 丁腈手套

39.54 关于 PICC 维护, 以下需每 48 小时更换 1 次的是 () [单选题]*

- A. 纱布敷料 (正确答案)
- B. 无菌透明敷料
- C. 肝素帽

E. PICC 导管

40.55 下列关于皮下注射，错误的是（ ） [单选题]*

- A. 长期注射患者，应交替更换注射部位
- B. 严格执行护理查对技术和无菌技术操作原则
- C. 对于过于消瘦的患者，可以绷紧注射部位的皮肤，并适当增大针头刺入角度 (正确答案)
- D. 注射少于 1ml 的药液时，必须用 1ml 注射器抽吸药液，以保证注入药液量准确无误
- E. 药物需现配现用

41.56 疫情防控期间将生活垃圾临时分为（ ） [单选题]*

- A. 一般生活垃圾和危险生活垃圾
- B. 一般生活垃圾和特殊疫情生活垃圾
- C. 特殊生活垃圾和涉疫情生活垃圾
- D. 危险垃圾和涉疫情生活垃圾
- E. 一般生活垃圾和涉疫情生活垃圾 (正确答案)

42.61 病房抢救车处于备用状态，（ ）需进行清理，必须保证抢救用物处于完好备用状态，各物品均在有效期内使用。 [单选题]*

- A. 每周 (正确答案)
- B. 每半个月
- C. 每月
- D. 每三周
- E. 必要时

43. 62

责范围以外的护理工作而发生的缺陷均由（ ）承担责任。 [单选题]*

- A. 实习生
- B. 进修人员
- C. 护士长
- D. 卫生员
- E. 带教者及安排者 (正确答案)

44. 74、 禁忌使用鼻饲法的患者是（ ） [单选题]*

- A. 口腔手术后
- D. 破伤风患者
- C. 昏迷患者
- D. 人工冬眠患者
- E. 食管静脉曲张出血患者 (正确答案)

45. 75、 在进行各种诊疗护理操作前需认真执行查对制度，核对腕带时不包括（ ）
[单选题]*

- A. 科室
- B. 住院号
- C. 护理级别 (正确答案)
- D. 姓名、 年龄
- E. 性别、 诊断

) 小时

内据实补记。 [单选题]*

A.2 小时

B.6 小时 (正确答案)

C.4 小时

D.8 小时

E.5 小时

47.80、预防压疮时，为缓解对局部的压迫不宜使用（） [单选题]*

A.海绵垫

B.橡皮气圈 (正确答案)

C.气垫褥

D.水褥

E.海绵褥

48.81、气管内吸痰一次吸取时间不应超过 15s，其主要原因是（） [单选题]*

A.引起病人缺氧和发绀 (正确答案)

B.吸痰器工作时间过长易损坏

C.吸痰管吸痰时间过长易阻塞

D.引起病人刺激性呛咳造成不适

E.吸痰用物暴露过久易造成细菌污染

49.86、患者女性，24 岁，因化脓性扁桃体炎，需注射抗生素，皮试阴性，输液 5 分钟后患者出现胸闷、气急、面色苍白、脉搏细弱、血压下降，首先给予的急救措施是（） [单选题]*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/855310040032011324>