

2023-2024 年云南省通海县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库带答案（满分必刷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于雄激素类的是()

- A: 他莫昔芬
- B: 甲地孕酮
- C: 睾酮
- D: 己烯雌酚

答案：C

2. 主要治疗躁狂症，对躁狂和抑郁交替发作的双相情感性精神障碍有很好的治疗和预防的药物是

- A: 碳酸锂
- B: 阿立哌唑
- C: 氯氮平
- D: 利培酮

答案：A

3. 可用于防治泌尿系统结石的是

- A: 氯化钾
- B: 枸橼酸钾
- C: 氯化钠
- D: 氯化钙

答案：B

4. 用于血氨升高所致精神症状的治疗的是

- A: 赖氨酸
- B: 复方氨基酸注射液(18AA)
- C: 复方氨基酸注射液(3AA)
- D: 精氨酸

答案：D

5. 戈那瑞林属于

- A: 雌激素类
- B: 促性腺激素释放激素类似物
- C: 促性腺激素
- D: 短效口服避孕药

答案：B

6. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 顺铂
- B: 奥沙利铂
- C: 泼尼松
- D: 吉西他滨

答案：A

7. 竹红菌甲素属于

- A: 其他光敏剂
- B: 肾上腺皮质激素类
- C: 重金属元素及其化合物
- D: 补骨脂素及其衍生物

答案：A

8. 用于治疗鼓膜未穿孔的急性中耳炎、外耳道炎的药品是()。

- A: 过氧乙酸溶液
- B: 高锰酸钾溶液
- C: 苯酚溶液
- D: 酚甘油滴耳液

答案：D

9. 属于第三代头孢菌素的药物是()。

- A: 头孢哌酮
- B: 头孢氨苄
- C: 头孢拉定
- D: 头孢吡肟

答案：A

10. (2018 年真题) 围手术期为预防革兰阴性杆菌感染, 可选用 ()

- A: 氨曲南
- B: 头孢唑林
- C: 青霉素 G
- D: 万古霉素

答案：A

11. 以下药物治疗高血压时，给药次数为一日 2 次给药的是

- A: 硝苯地平缓释片
- B: 氨氯地平片
- C: 非洛地平缓释片
- D: 硝苯地平控释片

答案：A

12. 下列硝酸酯药物相互作用中，可以合用的是

- A: 与他汀类药物合用
- B: 与麻黄碱合用
- C: 与硝普钠合用
- D: 与西地那非合用

答案：A

13. 属于非麻醉性镇痛药的是

- A: 美沙酮
- B: 可待因
- C: 布洛芬
- D: 吗啡

答案：C

14. 属于外周多巴胺受体阻断剂，直接阻断胃肠道多巴胺 D

- A: 昂丹司琼
- B: 多潘立酮
- C: 甲氧氯普胺
- D: 莫沙必利

答案：B

15. 呋塞米的适应证不包括

- A: 高钠血症
- B: 充血性心力衰竭
- C: 高钾血症
- D: 高血压危象

答案：A

16. 最易引起严重二重感染的药物是()

- A: 诺氟沙星
- B: 庆大霉素
- C: 四环素
- D: 青霉素

答案：C

17. 服用抗帕金森病药恩他卡朋的患者，其尿液可变成

- A: 深蓝色
- B: 淡绿色
- C: 红棕色
- D: 蓝绿色

答案：C

18. 可作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

- A: 氨曲南
- B: 阿莫西林
- C: 克拉维酸
- D: 亚胺培南

答案：A

19. 入睡困难患者首选哪种催眠药物

- A: 谷维素
- B: 艾司唑仑
- C: 氯硝西泮
- D: 劳拉西泮

答案：B

20. 作用强而持久，不仅对子宫底，而且对子宫颈部都有很强的收缩作用，剂量稍大即产生强直性收缩，不适用于催产或引产，主要用于产后子宫出血或子宫复原不佳的是

- A: 地诺前列酮
- B: 麦角新碱
- C: 普拉睾酮
- D: 缩宫素

答案：B

21. 布美他尼属于下列哪类利尿药

- A: 碳酸酐酶抑制药
- B: 保钾利尿药
- C: 高效能利尿药
- D: 中效能利尿药

答案：C

22. 可拮抗维生素 B6 或增加维生素 B6 经肾脏排泄，引起贫血或周围神经炎的是

- A: 丙磺舒
- B: 雌激素
- C: 糖皮质激素
- D: 异烟肼

答案：D

23. (2021 年真题) 水溶性他汀类药物能够选择性抑制肝脏胆固醇合成，而对肾上腺、性腺、心脏、大脑等部位的胆固醇合成影响极低，既有效降低了血清胆固醇水平，又减少了肝脏以外组织不良反应的发生。水溶性较强的他汀类药物是 ()

- A: 洛伐他汀
- B: 辛伐他汀
- C: 普伐他汀
- D: 氟伐他汀

答案: C

24. 用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的 2 型糖尿病患者宜首选

- A: 低精蛋白锌胰岛素
- B: 格列喹酮
- C: 普通胰岛素
- D: 二甲双胍

答案: D

25. 阿司匹林的作用是 ()

- A: 促凝血因子合成
- B: 促进纤维蛋白溶解
- C: 抑制血小板聚集
- D: 抑制纤维蛋白溶解

答案: C

26. 适用于心功能比较稳定的 II ~ III 级心力衰竭患者的是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 米力农
- C: 卡维地洛

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 氯沙坦

答案: C

27. (2019 年真题) 服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险，为降低此风险，应采取的措施是 ()

- A: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用
- B: 应长期合用质子泵抑制剂
- C: 使用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染
- D: 不推荐 65 岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防

答案：C

28. 可用于治疗老年骨质疏松，属于维生素 D 代谢产物的是

- A: 利拉鲁肽
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 瑞格列奈
- D: 骨化三醇

答案：D

29. 下列属于吗氯贝胺作用机制的表述是

- A: 选择性抑制 5-HT 的再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度
- B: 抑制 A 型单胺氧化酶，减少 5-HT、去甲肾上腺素的降解
- C: 抑制突触前膜去甲肾上腺素的再摄取
- D: 抑制突触前膜 5-HT、去甲肾上腺素的再摄取

答案：B

30. 对革兰阳性菌作用强，对革兰阴性菌作用弱的药物是

- A: 第一代头孢菌素
- B: 第三代头孢菌素
- C: 第四代头孢菌素
- D: 第二代头孢菌素

答案：A

31. 可用于治疗肝性脑病的药物是

- A: 利那洛肽
- B: 欧车前
- C: 番泻叶
- D: 多库酯钠

答案：A

32. 患者，男，29 岁。因反酸、烧心、胸骨后隐痛 1 个月余就诊。胃镜检查提示，反流性食管炎。最适用于该患者的药物是

- A: 雷尼替丁
- B: 尼扎替丁
- C: 西咪替丁
- D: 奥美拉唑

答案：D

33. 关于地高辛作用特点的说法，正确的是

- A: 地高辛通过激动 $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶增强心肌收缩力
- B: 地高辛口服生物利用度小于 50%
- C: 地高辛静脉注射后作用持续时间为 2-3h
- D: 地高辛不经细胞色素 P450 酶代谢，以原型药物从肾脏排泄

答案：D

34. 属于选择性 5-HT

- A: 昂丹司琼
- B: 甲氧氯普胺
- C: 多潘立酮

D: 莫沙必利

答案: D

35. 对于急性白血病在一线耐药时使用，但作为二线用药的药物是

A: 吡柔比星

B: 柔红霉素

C: 多柔比星

D: 表柔比星

答案: C

36. 选择性舒张脑血管的药物是

A: 硝苯地平

B: 氟桂利嗪

C: 维拉帕米

D: 地尔硫革

答案: B

37. 对革兰阳性菌作用强，而对革兰阴性菌作用弱的药物是

A: 第二代头孢菌素

B: 第一代头孢菌素

C: 第三代头孢菌素

D: 第四代头孢菌素

答案: B

38. 抑制质子泵而减少胃酸分泌的药物是

A: 法莫替丁

B: 枸橼酸铋钾

C: 谷丙胺

D: 奥美拉唑

答案: D

39. 氯化钾的禁忌证是

A: 应用强心苷类药

B: 妊娠期高血压疾病

C: 急、慢性肾功能不全

D: 急性脱水

答案: C

40. 关于胺碘酮描述，正确的是

A: 只对室性心动过速有效

B: 对室上性和室性心动过速都有效

C: 只对室上性心动过速有效

D: 特异性针对房颤有效

答案: B

41. 在使用减毒活流感疫苗后一段时间内不应服用奥司他韦，该时间是

A: 2 周内

B: 3 周内

C: 4 周内

D: 1 周内

答案: A

42. (2018 年真题) 对沙眼、结核性眼病及某些病毒性眼病均有治疗作用的药物是 ()

A: 卡替洛尔

B: 阿托品

C: 利福平

D: 左氧氟沙星

答案: C

43. (2021 年真题) 痰培养结果为铜绿假单胞菌，宜选用的抗菌药物是
()

A: 苄星青霉素

B: 哌拉西林他唑巴坦

C: 青霉素 G

D: 苯唑西林

答案: B

44. 目前仍用作一线抗结核药的是

A: 链霉素

B: 二氯沙奈

C: 甲硝唑

D: 青蒿素

答案: A

45. 吗啡的镇痛作用机制主要是

A: 诱发精神错乱

B: 加重呼吸抑制

C: 增强镇静作用

D: 增强止痛效果

答案: C

46. 格列本脲的作用特点是

A: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性

B: 直接抑制肝糖原分解和糖原异生

C: 抑制胰高血糖素的分泌

D: 增强胰岛素的作用

答案：B

47. (2021 年真题) 血浆消除半衰期相对较长 (14~16min)，可间隔 30min 静脉注射 2 次……药物是 ()

A: 尿激酶

B: 重组链激酶

C: 替奈普酶

D: 瑞替普酶

答案：D

48. (2017 年真题) 前庭功能失调 (眩晕) ()

A: 哌拉西林

B: 米诺环素

C: 左氧氟沙星

D: 甲硝唑

答案：B

49. 治疗重型幼年型糖尿病的是

A: A 和 B 均无效

B: 磺酰脲类

C: 二甲双胍

D: 胰岛素

答案：D

50. (2018 年真题) 可用于治疗厌氧菌及产 ESBL 的革兰阴性杆菌感染的药物是 ()

- A: 头孢唑林
- B: 头孢他啶
- C: 头孢米诺
- D: 头孢呋辛

答案: C

51. 治疗慢性室性心律失常的药物是 ()

- A: 胺碘酮
- B: 奎尼丁
- C: 维拉帕米
- D: 美西律

答案: D

52. 下列药物中，与蛋白同化激素无相互作用的是

- A: 环孢素
- B: 华法林
- C: 他克莫司
- D: 青霉素

答案: D

53. (2020 年真题) 关于维 A 酸软膏治疗痤疮的说法，错误的是

- A: 有明确的致畸性，妊娠期妇女禁用
- B: 使用初期可能出现皮肤干燥或脱屑，对紫外光敏感性增强，宜在睡前使用
- C: 为了加强疗效，可以一日多次给药
- D: 不宜用于皮肤皱褶部位

答案：C

54. 严重肝病患者应减量慎用、肾功能减退患者应避免使用的是

- A: 红霉素
- B: 氟胞嘧啶
- C: 异烟肼
- D: 青霉素

答案：B

55. 典型失神性发作（小发作）首选（）。

- A: 氯巴占
- B: 乙琥胺
- C: 奥卡西平
- D: 苯妥英钠

答案：B

56. 两性霉素 B 与（）合用具有协同作用。

- A: 氟胞嘧啶
- B: 酮康唑
- C: 伊曲康唑
- D: 利福平

答案：A

57. 糖皮质激素的适应证，不包括

- A: 风湿性关节炎
- B: 活动性肺结核
- C: 系统性红斑狼疮
- D: 再生障碍性贫血

答案：B

58. 噻嗪类利尿药的利尿作用机制是

- A: 抑制远曲小管近端 Na^+-Cl^- 同向转运系统
- B: 增加肾小球滤过
- C: 抑制远曲小管 K^+-Na^+ 交换
- D: 抑制近曲小管碳酸酐酶，减少 H^+-Na^+ 交换

答案：A

59. 以下关于制霉菌素的描述中，错误的是

- A: 局部外用治疗浅表真菌感染
- B: 对念珠菌属抗菌活性较高，但易产生耐药性
- C: 口服吸收很少
- D: 作用机制与两性霉素 B 相似

答案：B

60. 易导致血糖异常的药品是

- A: 头孢哌酮
- B: 多西环素
- C: 庆大霉素
- D: 加替沙星

答案：D

61. 下述属于 5-HT

- A: 莫沙必利
- B: 伊托必利
- C: 甲氧氯普胺
- D: 多潘立酮

答案：A

62. (2015 年真题) 辅助治疗不孕症的维生素是 ()。

A: 维生素 B5

B: 维生素 E

C: 烟酸

D: 维生素 B2

答案：B

63. 治疗流行性细菌性脑膜炎最合适的联合用药是 ()

A: 青霉素+四环素

B: 青霉素+克林霉素

C: 青霉素+磺胺嘧啶

D: 青霉素+链霉素

答案：C

64. 甲氨蝶呤主要用于 ()

A: 髓母细胞瘤

B: 儿童急性白血病

C: 室管膜瘤

D: 慢性粒细胞性白血病

答案：B

65. 下列关于直接凝血酶抑制剂的优势描述，错误的是

A: 不能灭活纤维蛋白结合的凝血酶

B: 可预测抗凝效果，无需监测国际标准化比值 (INR)

C: 治疗剂量下不会引起血小板减少

D: 选择性高

答案：A

66. 与顺铂合用，致高尿酸血症的药物是

- A: 苯海拉明
- B: 丙磺舒
- C: 呋塞米
- D: 甲氨蝶呤

答案：B

67. 雌激素类药和孕激素类药均可用于()

- A: 乳房胀痛
- B: 前列腺癌
- C: 晚期乳腺癌
- D: 绝经期综合征

答案：B

68. 以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌

- A: 严重低血压者
- B: 已使用西地那非者
- C: 急性前壁心肌梗死
- D: 青光眼患者

答案：C

69. 患者，男性，45 岁。有支气管哮喘病史 20 余年。因阵发性室上性心动过速入院治疗，出院后又多次发作，应选用预防反复发作的治疗药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 利多卡因

C: 维拉帕米

D: 美西律

答案: C

70. 异甘草酸镁作为保护肝细胞药的作用机制是

A: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用

B: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

C: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平

D: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞

答案: B

71. 在动物骨髓造血组织中含量较多，有促进白细胞增生及抗放射线作用的是

A: 鲨肝醇

B: 丙酸诺龙

C: 维生素 B4

D: 小檗胺

答案: A

72. 急性白血病患者接受化疗期间出现了手指、足趾麻木、腱反射迟钝等不良反应，最有可能导致上述症状的药物是

A: 甲氨蝶呤

B: 环磷酰胺

C: 长春新碱

D: 曲妥珠单抗

答案: C

73. 下列药物属于第四代头孢菌素的是

- A: 头孢氨苄
- B: 头孢呋辛
- C: 头孢噻肟
- D: 头孢吡肟

答案：D

74. 易引起吉海反应的药物是()

- A: 庆大霉素
- B: 青霉素
- C: 四环素
- D: 诺氟沙星

答案：B

75. 慢性外耳道炎时局部滴用，促使耳道干燥，可选用()

- A: 2%酚甘油
- B: 赛洛唑啉
- C: 3%硼酸乙醇
- D: 伪麻黄碱

答案：C

76. 中和胃酸的药物是()

- A: 奥美拉唑
- B: 氢氧化铝
- C: 雷尼替丁
- D: 哌仑西平

答案：B

77. 属于嘌呤类抗代谢类药物的是()

- A: 长春瑞滨
- B: 吉西他滨
- C: 巯嘌呤
- D: 甲氨蝶呤

答案: C

78. 以下可作为缓解轻、中度急性哮喘症状首选药的是

- A: 特布他林
- B: 孟鲁司特
- C: 沙美特罗
- D: 氨茶碱

答案: A

79. 甲亢术前准备的正确给药方法是

- A: 只给硫脲类
- B: 先给碘化物，术前两周再给硫脲类
- C: 先给丙硫氧嘧啶，术前两周再给碘化物
- D: 只给碘化物

答案: C

80. 下列关于钠的作用特点描述，错误的是

- A: 调节体液渗透压、电解质及酸碱平衡
- B: 调节体内水量的恒定
- C: 不能调节体内水量的恒定
- D: 维持血压

答案: C

81. 艾司奥美拉唑的活性形式是

- A: 奥沙拉嗪
- B: 巴柳氮
- C: 美沙拉嗪
- D: 亚磺酰胺

答案: D

82. (2018 年真题) 属于电解质补充药, 可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是 ()

- A: 异甘草酸镁
- B: 门冬氨酸钾镁
- C: 多烯磷脂酰胆碱
- D: 双环醇

答案: B

83. 用药期间应注意监测血气和酸碱平衡的是

- A: 复方氨基酸注射液(18AA)
- B: 复方氨基酸注射液(3AA)
- C: 精氨酸
- D: 赖氨酸

答案: C

84. 可使洋地黄化时发生心脏传导阻滞, 尤其是同时静脉注射钙盐时, 该药物是

- A: 呋塞米
- B: 克拉霉素
- C: 胺碘酮

D: 硫酸镁

答案：D

85. 以下关于氯吡格雷使用的描述，错误的是

- A: 发现氯吡格雷抗血小板作用不足者可检测 CYP2C19 基因型
- B: 在需要进行择期手术的患者，如抗血小板治疗并非必须，则应在术前停用氯吡格雷 7 日以上
- C: 超过常规服药时间的 12 小时后漏服，应在下次常规服药时间服用加倍剂量
- D: 如果漏服，在常规服药时间的 12 小时内漏服，应立即补服一次标准剂量，并按照常规服药时间服用下一次剂量

答案：C

86. 患儿，女，8 岁。长期发热，伴有精神不振、头痛、胸闷气短等症状，诊断为草绿色链球菌引起的心内膜炎。

- A: 干扰细菌细胞壁合成
- B: 与细菌 50S 核糖体结合，抑制蛋白质合成
- C: 干扰 DNA 的合成
- D: 与细菌 30S 核糖体结合，抑制蛋白质合成

答案：A

87. 为阳离子表面活性剂，有广谱杀菌、抑菌作用，吸附在细菌胞壁后，改变其表面结构和渗透平衡，使胞浆内成分渗漏，高浓度时可使胞浆凝固，抑制细胞壁修复而呈杀菌作用，且不易产生耐药性的消毒防腐药是

- A: 依沙吖啶
- B: 氯己定

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 过氧乙酸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/855311211200012033>