

口腔颌面影像诊断学考核试题

一、选择题

1. 牙齿及根尖周疾病以哪种影像检查为主（ ）[单选题]。

A.CBCT

B.合翼片

C.根尖片✓

D.华特位片

E.合片
- 2.牙源性边缘性颌骨骨髓炎在 X 线片上骨膜反应的表现是（ ）[单选题]。

A.密度减低影

B.不显影

C.密质骨增厚

D.密质骨破坏

E.密质骨外骨膜成骨✓
3. 曲面断层片无法显示的组织是 （ ）[单选题]。

A.牙齿

B.牙槽骨

C.颞下颌关节

D.上颌窦

E.下颌下腺✓

4.上颌骨 Le Fort I 型骨折，骨折线一般不累及下列哪个部位（ ）[单选题]。

A.梨状孔下部

B.眶底、眶下✓

C.牙槽突

D.上颌结节

E.翼突

5. X 线片中显示密度最高的组织是（ ）[单选题]。

A.牙槽骨

B.牙髓

C.牙周膜

D.牙本质

E.牙釉质✓

6. 颌骨良性肿瘤的主要 X 线表现为（ ）[单选题]。

A．骨质破坏

B．边界清晰✓

C．有骨膜反应

D．有空腔形成

E．有虫蚀样破坏

7．关于唾液腺造影，以下说法错误的是（ ）[单选题]。

A. 需要局麻下进行✓

B. 一般需经唾液腺导管口注射对比剂

C. 腮腺导管口的标志为上颌第二磨牙相对应的颊粘膜上

D. 下颌下腺导管开口于舌下肉阜

E. 对比剂一般含碘

8. 电离辐射对正常口腔颌面组织的影响不包括（ ）[单选题]。

A.口腔黏膜及颌面皮肤损害

B.唾液腺损伤

C.味觉影响

D.牙髓影响✓

E.牙颌系统影响

9.颞下颌关节造影主要用于检查（ ）[单选题]。

A.关节骨组织

B.关节韧带

C.关节盘✓

D.血管和神经

E.肌肉组织

10．颈部软组织损伤时应注意什么部位的骨折（ ）[单选题]。

A.下颌骨喙突

B.下颌骨角部

C.下颌骨升支

D.下颌骨颈孔区

E.下颌骨髁状突✓

11.和 CT 相比， 磁共振检查技术的优点是（ ）[单选题]。

A.图像清晰

B.层面连续

C.可区分肿瘤的良恶性

D.不用造影剂增强即能显示肌、血管以及肿瘤的浸润范围✓

E.对骨组织病变显示好

12．化脓性颌骨骨髓炎急性期的 X 线表现是（ ）[单选题]。

A.骨小梁有斑点状吸收

B.有骨膜反应

C.有死骨形成

D.破坏区周围有骨质增生

E.颌骨未见明显异常✓

13.有关颌骨含牙囊肿下列说法不正确的是（ ）[单选题]。

A.单囊多见

B.最好发于后牙区

C.手术后不易复发

D.囊腔中可含发育不同阶段的牙

E.多囊多见✓

14. 在上颌根尖片能看到的颌骨正常解剖结构是（ ）[单选题]。

A.营养管

B.颧突✓

C.下颌管

D.颞孔

E.颞棘

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

15．已确诊为涎石病者，不宜作（ ）[单选题]。

A.进酸性食物

B.X 线平片

C.涎腺造影✓

D.抗感染治疗

E.多饮水

16.下颌骨最容易发生骨折的部位是（ ）[单选题]。

A．髁突颈部、乙状切迹、下颌颈孔区以及下颌正中部

B．髁突颈部、下颌角部、喙突以及下颌正中部

C．髁突颈部、下颌角部、下颌颈孔区以及下颌正中部✓

D．髁突颈部、下颌角部、下颌颈孔区以及下颌骨

E．髁突、喙突、下颌角、下颌正中部

17. 超声检查的目的不包括（ ）[单选题]。

A.确定有无占位性病变

B.判断是囊性还是实性肿块

C.明确肿块的良恶性✓

D.仅为肿瘤良恶性提供诊断依据

E.确定肿块与邻近重要血管的关系

18. 根尖周病时 X 线片检查不能明确诊断的为（ ）[单选题]。

A．根尖部是否有牙骨质增生

B. 急性根尖周炎✓

C. 根尖囊肿

D. 慢性根尖周炎

E. 根尖致密性骨炎

19.颞下颌关节造影术检查时，临床上采用最多造影的部位是（ ）[单选题]。

A.关节上腔✓

B.关节下腔

C.关节囊

D.关节间隙

E.关节韧带

20. 人类在受孕多少天左右对辐射、药物或病毒都很敏感，常引起先天性畸形（ ）[单选题]。

A.10 天（C）

B.15 天

C.20 天

D.25 天

E.35 天✓

21.颧骨、颧弓复合体骨折临床上最佳的检查方法为（ ）[单选题]。

A．华氏位和曲面体层

B．曲面体层和颧弓位

C．华氏位和经咽侧位

D．华氏位和颧弓位

E．CBCT 及螺旋 CT✓

22. 阴性结石应当采用哪种方法检查（ ）[单选题]。

A．涎腺造影✓

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

B . 核素显像

C . X 线平片

D . CT

E . CBCT

23 . 混合性牙瘤多位于颌骨的 () [单选题]。

A . 上颌前牙区

B . 上颌后牙区

C . 下颌升支区

D . 下颌前牙区

E . 下颌后牙区 ✓

24. 投照根尖片时 X 线中心线通过被检查牙的 () [单选题]。

A. 牙根的尖部

B. 牙根的中部 ✓

C. 牙根的 1/3

D. 牙根的 2/3

E. 牙根的上部

25. 易造成猛性龋的颌骨骨髓炎是 () [单选题]。

A. 牙源性边缘性颌骨骨髓炎

B. 牙源性中央性颌骨骨髓炎

C. 颌骨放射性骨坏死 ✓

D. Garre 骨髓炎

E. 化学性骨髓炎

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

26.患者成年女性，诊断为颞下颌关节紊乱病，以下最不可能的诊断是（ ）[单选题]。

A．颞下颌关节脱位✓

B．咀嚼肌紊乱疾病

C．关节结构紊乱疾病

D．关节炎性疾病

E．骨关节病

27.X 线片上显示在金属充填物窝洞边缘有密度减低的不规则窄缝，边缘不光滑，提示（ ）[单选题]。

A.急性龋

B.慢性龋

C.静止龋

D.继发龋✓

E.平滑面龋

28．患者，女，62岁，车祸致颌骨骨折，X线片显示骨折线横过鼻部，眶部，再经过颧骨上方，达翼突的是（ ）[单选题]。

A． LeFortI 型骨折

B． LeFortII 型骨折

C． LeFortIII 型骨折✓

D． 不对称型骨折

E． 纵形骨折

29.患者男性，25岁，右面部外伤史，腮腺造影显示导管中段造影剂漏出（ ）[单选题]。

A.下颌下腺导管瘘

B.下颌下腺腺体瘘

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

C.腮腺导管痿✓

D.腮腺腺体痿

E.腮腺良性肥大

30.显示上下牙的牙冠部，常用于检查邻面龋，髓室，牙槽嵴顶高度的是（ ）[单选题]。

A.根尖片

B.咬合片

C.合翼片✓

D.口底片

E.曲面断层片

31.关于骨肉瘤的影像学表现以下说法不正确的是（ ）[单选题]。

A.骨质破坏

B.骨膜反应

C.死骨形成✓

D.瘤骨形成

E.软组织肿块形成

32.1895 年 12 月 28 号 Roentgen (伦琴) 发现 X 射线之后，多长时间用于拍摄牙科 X 线片（ ）[单选题]。

A.3 周

B.4 周

C.5 周

D.2 周✓

E.6 周

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

33.口腔种植前非常有必要进行的影像学检查是（ ）[单选题]。

- A.根尖片
- B.曲面断层片
- C.CBCT✓
- D.螺旋 CT
- E.核磁共振

34.对放射敏感性最高的动物（ ）[单选题]。

- A.小鼠
- B.兔
- C.大鼠
- D.人✓
- E.豚

35．儿童复发性腮腺炎的造影表现是（ ）[单选题]。

- A.末梢导管扩张✓
- B.主导管充盈缺损
- C.主导管呈羽毛状、花边状
- D.分支导管密集
- E.腺体萎缩

36．下列何种因素与放射性骨坏死的发生关系最为密切（ ）[单选题]。

- A．照射野大小
- B．射线种类
- C．照射方式

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

D．照射剂量✓

E．个体敏感性

37.在骨关节病变常见的 X 线改变中，如下哪一种 X 线表现是不可能存在的（ ）[单选题]。

A．髌突骨赘

B．髌突硬化

C．髌突囊样变

D．关节正常结构消失，形成骨球✓

E．髌突小凹陷缺损

38.根尖片上的骨硬板是（ ）[单选题]。

A.牙槽窝内壁的影像✓

B.牙槽嵴顶的影像

C.牙本质的影像

D.牙骨质的影像

E.牙周膜的影像

39.牙釉质发育不全影像学表现不包括（ ）[单选题]。

A．牙冠密度减低

B．牙冠磨耗变短小

C．与邻牙接触点消失

D．牙釉质缺损

E．牙根短小✓

40. 牙内陷不包括（ ）[单选题]。

A．畸形舌侧窝

B . 畸形舌侧尖

C . 畸形中央尖✓

D . 畸形根面沟

E . 牙中牙

41 . 下列疾病中，哪一个是面裂囊肿（ ）[单选题]。

A.鼻腭管囊肿✓

B.根尖周囊肿

C.残余囊肿

D.含牙囊肿

E.牙源性角化囊肿

42. 与螺旋 CT 相比，口腔颌面锥形束 CT 的劣势是（ ）[单选题]。

A . 密度分辨率✓

B . 体积大小

C . 空间分辨率

D . 设备费用

E . 辐射剂量

43 . 有大块死骨形成且不易脱落的颌骨骨髓炎是（ ）[单选题]。

A. 牙源性中央性颌骨骨髓炎

B. 牙源性边缘性颌骨骨髓炎

C. Garre 骨髓炎

D. 颌骨放射性骨坏死✓

E. 颌骨砷毒性坏死

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

44.先天性缺牙最好采用（ ）[单选题]。

A．根尖片

B．口腔全景片✓

C．头颅侧位片

D．CBCT

E．螺旋 CT

45．涎腺肿瘤的首选影像学检查方法是（ ）[单选题]。

A．MRI

B．CT

C．B 超检查✓

D．造影检查

E．CBCT

46．牙骨质-骨结构不良不包括（ ）[单选题]。

A.根尖周牙骨质-骨结构不良

B.局灶性牙骨质-骨结构不良

C.繁茂型牙骨质-骨结构不良

D.成牙骨质细胞瘤✓

E.家族性巨大型牙骨质瘤

47.口腔颌面目前专用设备不包括（ ）[单选题]。

A.磁共振✓

B.CBCT

C.口腔 X 线机

非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

D.曲面体层 X 线机

E.X 线头影测量机

48. 患者女，59 岁，右侧下颌骨体部疼痛数月。X 线显示 46 深龋，根尖周可见大面积骨质破坏，边缘弥散，其内可见游离团块样高密度影。最可能诊断（ ）[单选题]。

A.颌面骨结核

B.颌骨中心性癌

C.颌骨放射性骨坏死

D.牙源性边缘性颌骨骨髓炎

E.牙源性中央性颌骨骨髓炎✓

49 . 能观察下颌下腺导管结石的片位是（ ）[单选题]。

A.上颌前部合片

B.上颌后部合片

C.下颌前部合片

D.下颌后部合片✓

E.合翼片

50.根尖周病不包括（ ）[单选题]。

A.根尖周炎

B.牙内吸收✓

C.牙骨质增生

D.牙骨质-骨结构不良

E.致密性骨炎

51.下颌髁突骨折后常发生内弯移位，因此常加拍（ ）[单选题]。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/856021233234011031>