

2024 年海南省文昌市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题大全附答案 (突破训练)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 能有效控制症状，但单独使用不能改善 FEV1 的长期下降，也不能改变 COPD 患者的病死率的药物是 ()

- A: 茶碱
- B: 短效 β_2 -受体激动剂
- C: 吸入型糖皮质激素
- D: 非甾体抗炎药 $B\beta$ -受体阻断剂

答案: C

2. 慢性痛风和痛风性肾病为抑制尿酸生成可选用

- A: 别嘌醇
- B: 秋水仙碱
- C: 苯溴马隆
- D: 泼尼松龙

答案: A

3. 复发

- A: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再次出现菌尿，菌种与上次相同
- B: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- C: 宜选用毒性小的抗菌药物

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数 $>10^5$ cfu / ml

答案：A

4. 抗高血压药物属于血管紧张素 II 受体阻断剂的是（）

A: 氢氯噻嗪

B: 依那普利

C: 缬沙坦

D: 氨氯地平

答案：C

5. 初步的临床药理学及人体安全性评价试验阶段，属于

A: II 期临床试验

B: III 期临床试验

C: IV 期临床试验

D: I 期临床试验

答案：D

6. 常用抗消化性溃疡药的合理应用餐后服用吸收缓慢，可于早、晚餐前及睡前服用的是（）

A: 替普瑞酮

B: 瑞巴派特

C: 质子泵抑制剂

D: 吉法酯

答案：B

7. 患者，女，57 岁，患骨质疏松症伴 Paget 病，该患者避免使用的治疗药是

- A: 特立帕肽
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 雷洛昔芬
- D: 鲑鱼降钙素

答案：A

8. 患者，男，67 岁，患带状疱疹，皮疹愈合后出现持续 1 个月左右疼痛，可给予的止痛药物是

- A: 吗啡
- B: 加巴喷丁
- C: 布洛芬
- D: 山莨菪碱

答案：B

9. 一般来讲，细菌药敏试验的报告不包括

- A: 药敏试验（细菌名称、药物通用名、试验方法以及敏感结果判定）
- B: 临床信息（送检科室、临床诊断、标本类型等）
- C: 临床治疗方案
- D: 涂片、培养鉴定

答案：C

10. （2015 年真题）静脉注射青霉素的适宜溶媒是（ ）。

- A: 50%葡萄糖注射液
- B: 0.9 氯化钠注射液
- C: 5%葡萄糖注射液
- D: 复方氯化钠注射液

答案：B

11. 咳嗽较弱者宜选用的药物是

- A: 右美沙芬
- B: 喷托维林
- C: 苯丙哌林
- D: 氨溴索

答案：B

12. 患者，女，16 岁，近两日因排尿困难就医。经医生询问，患者有尿急、尿频、尿痛、排尿不适、下腹痛等症状，且尿液比平时浑浊且有异味，医生测量体温为 37.4℃，确诊为尿路感染。

- A: 复方磺胺甲噁唑
- B: 青霉素
- C: 氨苄西林
- D: 头孢噻肟

答案：B

13. 需 2~10℃ 冷处保存，并避免冻结的药品

- A: 脂肪乳
- B: 胰酶片
- C: 低精蛋白胰岛素注射剂
- D: 利福平片

答案：C

14. 影响维生素 B₁₂ 吸收的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 甲氨蝶呤
- C: 苯巴比妥
- D: 苯妥英钠

答案：A

15. 不宜选静滴 5%碳酸氢钠注射液、碱化尿液的情况是是

- A: 苯巴比妥中毒
- B: 苯妥英钠中毒
- C: 异戊巴比妥中毒
- D: 司可巴比妥中毒

答案：C

16. 下列药物中，可呈现肝药酶抑制作用的是

- A: 利福平
- B: 地塞米松
- C: 异烟肼
- D: 苯巴比妥

答案：C

17. 可用于治疗沙眼的处方药是

- A: 硫酸锌
- B: 酞丁安滴眼剂
- C: 红霉素眼膏
- D: 磺胺醋酰钠

答案：D

18. 主要用于抗真菌的药物是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 氟胞嘧啶
- C: 阿糖腺苷
- D: 阿糖胞苷

答案：B

19. 糖尿病患者服用后可使血糖降低或升高的药物是

- A: 头孢哌酮
- B: 培氟沙星
- C: 加替沙星
- D: 培高利特

答案：C

20. “效用指标是患者对某种药物治疗的主观满意程度(质量调整生命年或质量调整预期寿命)，着重分析医疗成本与患者生活质量提升之间的关系”是指

- A: 成本—效益分析方法
- B: 最大效果分析方法
- C: 最小成本分析方法
- D: 成本—效用分析方法

答案：D

21. 合并三度房室传导阻滞的高血压患者不宜选用

- A: 卡托普利
- B: 维拉帕米
- C: 多沙唑嗪
- D: 哌唑嗪

答案：B

22. 及早用药以利于杀灭结核菌株

- A: 联合
- B: 适量

C: 早期

D: 规律

答案: C

23. 属于蛋白酶抑制剂的是 ()

A: 齐多夫定

B: 利巴韦林

C: 依非韦伦

D: 利托那韦

答案: D

24. (2018 年真题) 根据中国营养学会推荐, 老年人在每日饮食之外, 应补充的元素钙剂量为 ()

A: 100mg

B: 500~600mg

C: 2000~4000mg

D: 50mg

答案: B

25. (2018 年真题) 患者, 女, 50 岁, 近期出现失眠、潮热、出汗、烦躁等不适症状, 临床诊断为围绝经期综合征, 在使用激素替代治疗之前应先排除禁忌证。下列情况不属于禁忌证但属于慎用的是 ()

A: 严重肝功能障碍

B: 耳硬化症

C: 乳腺增生

D: 近 6 月内患活动性静脉栓塞性疾病

答案: C

26. 可引起粪便红细胞增多的是

- A: 溶血性黄疸
- B: 阻塞性黄疸
- C: 细菌性痢疾
- D: 急性胰腺炎

答案：C

27. 设置专供患者阅读的《顾客药物信息详解》的是

- A: 《药物事实与比较》
- B: 《中国国家处方集》
- C: 《美国药典药物信息》
- D: 《马丁代尔药物大典》

答案：C

28. (2019 年真题) 艾滋病抗病毒治疗强调须多种药物联合治疗，俗称“鸡尾酒疗法”，目前国内免费治疗的一线方案是

- A: 拉米夫定+司他夫定+奈韦拉平
- B: 齐多夫定+依非韦伦+利托那韦
- C: 替诺福韦+依非韦伦+雷特格韦
- D: 拉米夫定+替诺福韦+齐多夫定

答案：A

29. 患者，男，65 岁，良性前列腺增生病史 3 年，高血压病史 2 年，咳嗽，咳痰 10 余年，伴哮喘，尤以活动后明显，因近半月咳嗽加重入院，主诉便秘，每周 2 次排便，长期口服硝苯地平控释片 30mg/qd，血压控制良好。体格检查：体温 36.6℃，P82 次/分，R22 次/分，端坐位，喘息貌，桶状胸，双肺叩诊过清音，散在干啰音，双肺下少许湿罗音，辅助检查：血常规 WBC 11.2×10^9

- A: 硝苯地平控释片
- B: 布地奈德混悬液
- C: 氨溴索注射液
- D: 异丙托溴铵溶液

答案：D

30. 急、慢性肾小球肾炎可引起

- A: 尿胆红素检测阳性
- B: 尿酸碱度增高
- C: 尿蛋白检测阳性
- D: 尿酸碱度降低

答案：C

31. 黏膜保护剂

- A: 多潘立酮
- B: 铝碳酸镁
- C: 埃索美拉唑
- D: 法莫替丁

答案：B

32. 稳定型心绞痛的临床表现不包括

- A: 压迫、发闷
- B: 多持续 3~5 分钟
- C: 针刺或刀扎样锐性痛
- D: 胸痛

答案：C

33. 易引起冠脉痉挛、心肌缺血的药物

- A: 紫杉醇
- B: 环磷酰胺
- C: 氟尿嘧啶
- D: 阿霉素

答案：C

34. 心衰治疗中能够快速控制体液潴留的药物是（）

- A: 利尿剂
- B: 肾上腺素
- C: β 受体阻断剂
- D: 阿托品

答案：A

35. 在检查尿沉渣的项目中，最能提示是肾实质性病变的证据是

- A: 尿沉渣结晶
- B: 尿沉渣白细胞
- C: 尿沉渣磷酸盐结晶
- D: 尿沉渣管型

答案：D

36. 治疗需用 10%葡萄糖注射液 1000ml，现仅有 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液，分别取 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液多少毫升进行配制

- A: 200ml，800ml
- B: 111ml，889ml
- C: 889ml，111ml
- D: 500ml，500ml

答案：B

37. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 利伐沙班
- B: 肝素
- C: 华法林
- D: 氯吡格雷

答案：D

38. 患者，男，50 岁。患梗阻性黄疸，其粪外观可呈现

- A: 鲜血便
- B: 白陶土样便
- C: 乳凝块便
- D: 细条便

答案：B

39. 服后有幻觉、精神错乱、眩晕、嗜睡、视力模糊

- A: 布洛芬
- B: 金刚烷胺
- C: 西咪替丁
- D: 硝酸甘油

答案：B

40. 属于抗酸药的是

- A: 哌仑西平
- B: 三硅酸镁
- C: 替普瑞酮
- D: 奥美拉唑

答案：B

41. 能使鼻黏膜血管收缩，减轻充血，缓解鼻塞

A: 氯雷他定片

B: 泼尼松片

C: 萘甲唑林滴鼻液

D: 孟鲁司特钠片

答案：C

42. 可在一定程度上准确反映肾小球滤过功能损害程度的是

A: 尿素氮

B: 肌酐

C: 淀粉酶

D: 胆固醇

答案：B

43. 治疗非心源性栓塞性缺血性脑卒中，宜选用的药物是（）

A: 依诺肝素钠

B: 氯吡格雷

C: 尿激酶

D: 达比加群酯

答案：B

44. 服用柳氮磺吡啶的注意事项不正确的是

A: 必要时服用碱化尿液的药物

B: 服用期间应避免饮水

C: 服用期间应多饮水

D: 禁用于对磺胺类药物过敏者

答案：B

45. 同时患有滴虫及念珠菌性阴道炎应首选的药品是

- A: 制霉菌素
- B: 曲古霉素
- C: 硝酸咪康唑
- D: 甲硝唑

答案：B

46. 过敏性鼻炎首选的药物是

- A: 糖皮质激素
- B: 麻黄碱
- C: 氯雷他定
- D: 阿托品

答案：C

47. 大剂量易引起碱血症的抗酸药是

- A: 奥美拉唑
- B: 碳酸氢钠
- C: 莫沙必利
- D: 西沙必利

答案：B

48. 关于新型抗凝药物，下列说法不正确的是

- A: 达比加群酯直接作用于凝血酶(主要是 IIa 因子)
- B: 与食物和药物相互作用小
- C: 需监测 INR
- D: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节

答案：C

49. 慢性肾脏病降压治疗首选的是

- A: ACEI
- B: 钙制剂
- C: RAAS 拮抗剂
- D: ARB

答案：C

50. 静脉滴注青霉素的适宜溶媒是

- A: 5%葡萄糖注射液
- B: 0.9%氯化钠注射液
- C: 50%葡萄糖注射液
- D: 复方氯化钠注射液

答案：B

51. 适用于伴有前列腺体积增大的良性前列腺增生症的是（）

- A: 特拉唑嗪
- B: 非那雄胺
- C: 奥昔布宁
- D: 米多君

答案：B

52. 用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

- A: 20 天之内
- B: 15 天之后
- C: 10 天之后
- D: 15 天之内

答案：D

53. 痛风急性发作期应禁用的药物是

- A: 布洛芬
- B: 碳酸氢钠
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

答案：D

54. (2018 年真题) 患者, 男 58 岁, 高血压病史 5 年, 吸烟史 40 年, 日均 40 支, 6 小时前出现左侧肢体无力, 并逐渐加重, 不能站立, 家属发现其说话迟钝含混, 右侧嘴唇变浅, 意识清楚, 到某院急诊 BP190/120mmHg, 血常规基本正常, 行头部 MRI 检查后, 诊断为急性脑梗死。

- A: 尼莫地平注射液 20mgqdiv
- B: 胞二磷胆碱注射液 200mgqdiv
- C: 呋塞米片 200mgqdp
- D: 甘露醇注射液 250mlq6hiv

答案：D

55. 多潘立酮药物不良反应

- A: 性功能障碍
- B: 男性乳房女性化
- C: 睡眠障碍
- D: 黑便

答案：B

56. 服用维生素 A、维生素 D 等应该食用的是

- A: 脂肪

B: 食醋

C: 酒

D: 食盐

答案：A

57. 属于浓度依赖性抗菌药，评估此类药物的 PK / PD 参数主要有 C_{max} / MIC 或 AUC_{0-24} / MIC ，提高此类抗菌药物疗效的策略主要是提高 C_{max} ，一般推荐日剂量单次给药方案的药物是

A: 氨茶碱

B: 头孢克洛

C: 利奈唑胺

D: 左氧氟沙星

答案：D

58. 洋地黄中毒的风险因素没有

A: 低钾血症

B: 心肌缺血缺氧

C: 高钾血症

D: 甲状腺功能减退

答案：C

59. 选择性单胺氧化酶 A 抑制剂

A: 氯米帕明

B: 米氮平

C: 吗氯贝胺

D: 氟伏沙明

答案：C

60. (2018 年真题) 患者, 女, 30 岁, 既往体健, 无癫痫病史怀孕 8 个月, 突然出现抽搐, 从小腹开始, 发展至全身, 口唇发绀, 意识丧失, 诊断为子痫, 应选用的治疗方法是 ()

- A: 50%硫酸镁溶液口服
- B: 5%氯化钙注射液静脉滴注
- C: 50%葡萄糖注射液湿敷
- D: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射

答案: D

61. 下列症状不属于高血压临床表现的是

- A: 口干
- B: 头晕
- C: 心悸
- D: 头痛

答案: A

62. 以高 TG 为主血症首选

- A: 非诺贝特
- B: 依折麦布
- C: 阿昔莫司
- D: 氟伐他汀

答案: A

63. 以下对于高血压患者的健康教育说法, 错误的是

- A: 高血压患者需要控制体重, BMI 尽可能控制在 $<24\text{kg/m}^2$
- B: 减少食用油摄入 ($<25\text{g/d}$), 鼓励摄入单不饱和脂肪酸 (橄榄油等)
- C: 每日吃新鲜蔬菜和水果

D: 减少烹调用盐，每人每日食盐量不超过 0.5g

答案：D

64. 患者,77 岁,因感冒发热咳嗽,自服酚麻美敏片、维 C 银翘片,三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是()

A: 氯苯那敏

B: 对乙酰氨基酚

C: 银翘

D: 维生素

答案：A

65. 可稀释痰液，并借助咳嗽反射以帮助痰液排出，避免阻塞气道的药品是

A: 布地奈德

B: 扎鲁司特

C: 羧甲司坦

D: 沙丁胺醇

答案：C

66. 下列用于治疗咳嗽的药物中，属于祛痰剂的是

A: 可待因

B: 羧甲司坦

C: 右美沙芬

D: 氨溴索

答案：D

67. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L(正常参考范围 <7.8mmol / L)，甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考范围 0.56~1.70mmol / L)，总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考范围 <5.2mmol / L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.18mmol / L(正常参考范围 2.1~3.1mmol / L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L(正常参考范围 1.2~1.65mmol / L)，血肌酐 50 μmol / L(正常参考范围 45~84 μmol / L)，尿蛋白(++)。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 氢氯噻嗪
- B: 依那普利
- C: 特拉唑嗪
- D: 复方利血平

答案：B

68. 具有退热、缓解头痛和全身痛的解热镇痛药是

- A: 伪麻黄碱
- B: 菠萝蛋白酶
- C: 颠茄浸膏片
- D: 阿司匹林

答案：D

69. (2017 年真题) 患者男,70 岁,典型的“面具脸”“慌张步态”表现,临床诊断为帕金森病患者同时患有前列腺增生不宜选用的药物是 ()

- A: 普拉克索
- B: 甲基多巴
- C: 苯海索
- D: 卡比多巴

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

70. 蛋白酶抑制剂 ()

- A: FIs
- B: NNRTIs
- C: NRTIs
- D: PIs

答案：D

71. 支气管哮喘急性发作期(轻度)可选用的药物是

- A: 孟鲁司特
- B: 异丙托溴铵
- C: 沙丁胺醇
- D: 沙美特罗

答案：C

72. 脂溶性最高，作用快而短的是

- A: 苯巴比妥
- B: 戊巴比妥
- C: 硫喷妥
- D: 巴比妥

答案：C

73. 1%硫酸铜溶液催吐用于解救

- A: 三唑仑中毒
- B: 巴比妥中毒
- C: 磷化锌中毒
- D: 丙咪嗪中毒

答案：C

74. 急性冠状动脉综合征患者使用他汀类药物降低 LDL-C 的目标值为

A: $<70\text{mg} / \text{dl}$

B: $<40\text{mg} / \text{dl}$

C: $<50\text{mg} / \text{dl}$

D: $<60\text{mg} / \text{dl}$

答案：A

75. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛。3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol} / \text{L}$ ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

A: 苯溴马隆

B: 秋水仙碱

C: 别嘌醇

D: 丙磺舒

答案：B

76. 循证医学的证据分级中，"结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论"为几级证据

A: D 级

B: A 级

C: B 级

D: C 级

答案：C

77. 门冬胰岛素归属

A: D 级

B: B 级

C: X 级

D: C 级

答案: B

78. 可能影响儿童骨骼发育的药物是

A: 阿莫西林

B: 华法林

C: 诺氟沙星

D: 头孢克洛

答案: C

79. 可用 1%硫酸铜溶液催吐用于解救的中毒是

A: 丙戊酸钠中毒

B: 丙米嗪中毒

C: 磷化锌中毒

D: 三唑仑中毒

答案: C

80. 以下咨询问题的分类属于药品名称的是

A: 这次拿的"×××"(商品名)是我以前一直服用的"格列齐特"吗

B: 这种药需要服用多久

C: 中午忘吃药了怎么办

D: 这药能治我这种病吗

答案: A

81. 能早期发现患者伤害、尽快地采取干预措施的是

A: 岗位工作问责

B: 病历审查

C: 计算机检测方法

D: 直接观察

答案: C

82. 长期使用可降低血小板数量，可引起紫癜的药物是

A: 卡马西平

B: 文拉法辛

C: 氟西汀

D: 阿苯达唑

答案: D

83. 有关氰化物中毒的解救措施，错误的是

A: 注射硫代硫酸钠

B: 使用活性炭吸附

C: 注射亚硝酸钠

D: 给予亚硝酸异戊酯吸入

答案: B

84. 洗胃液 1:5000 高锰酸钾溶液可用于解救哪类药物中毒

A: 巴比妥类中毒

B: 3911 中毒

C: 1605 中毒

D: 乐果中毒

答案: A

85. 肾脏的功能主要是分泌和排泄尿液、废物、毒物和药物，调节和维持体内环境的平衡。变态反应、感染、肾血管病变、代谢异常、先天性疾病、全身循环和代谢性疾病、药物、毒素对肾脏的损害均可影响肾功能。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 27~62 $\mu\text{mol/L}$

B: 53~97 $\mu\text{mol/L}$

C: 45~84 $\mu\text{mol/L}$

D: 18~35 $\mu\text{mol/L}$

答案：D

86. 患者，女，66 岁，身高 156cm，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 8.7%。

A: 口服 Gt 一葡萄糖苷酶抑制剂

B: 口服磺酰脲类降糖药

C: 饮食干预及运动治疗

D: 口服二甲双胍

答案：D

87. 据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达 80% 左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

A: 青霉素

B: 水溶性维生素

C: 米非司酮

D: 阿莫西林

答案：C

88. 适宜与乳酶生配伍应用的药物是

A: 抗生素

B: 抗酸药

C: 磺胺类药

D: 干酵母

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/856041120100011030>