

儿科第一章

绪论

L分期

分期	时间	点品
用生期	学会周~生后7天	衢世国家医疗卫生水平的揩标，没病率、死亡率最高的阶段
新生儿期	脐带结扎~生后28天	发麻宰和死亡率亦很高, 仅次于明生期
𦍋儿期	出生周岁	①小儿生长发育第一个小峰才 ②容身姿生消化系统嘉乱及营养障碍性疾病 《昭郎老师速记: 𦍋儿期一天一个样)
幼儿期	1岁~3岁	翳发生意外伤需
学静前期	S岁~7岁	智力发育的关键阶段，发浮速度快 《昭曲老师速记. 三岁看大. 七岁看巷)
学翳期	7岁~青春期前	除生殖系统外其各器官外形已接近成人
青吞期	女楔12~岁: 男族1代加*	体格发育一的第二个商峰. 排现第二性征

儿科第二章

L生长发育的一般规律：遵循由上到下，由近到远，由粗到细，由低级到高级，由简单到复杂的规律。 淋巴系统(神经系统)的发育先快后慢，生殖系统发育较晚，特点先慢后快。

2 . 生理性体重下降：生后1周内因奶量摄入不足，水分丢失，胎粪排出，可出现暂时性体重下降，或 称生理性体重下降，约在生后第3~4日达最低点，下降范围为3%~9% ,以后逐渐回升，至出生后第 7~10日应恢复到出生时的体重。

3 . 体格生长

(1)体重：出生时~3kg ， 8个月~8kg ， 1岁~10kg ， 2岁~12kg。计算公式: @<6月婴儿体重 =0.7x月龄+3 ; ②7-12个月龄的婴儿体重=0.25x月龄+6 ; ③1-12岁体重=2x年龄+8。体重反B为L 童近期营养状况, 身高反映的是远期。

(2)身高:

	出生时	1岁	2岁	2岁以后
身高	50cm	75cm	87cm	7x年龄+75

(3)头围和胸围：经眉弓上缘、枕骨结节左右对称环绕头一周的长度为头围。出生时34cm ,1岁时46cm , 2岁时48cm , 5岁时50cm。**1岁时胸围等于头围，均为46cm。**

(4)颅骨发育：前囟一般为1岁-1岁半闭合，最迟为2岁。

脊柱发育：3个月-颈椎生理弯曲，6个月-胸椎生理弯曲，1岁左右-腰椎生理弯曲。

骨化中心：2-9岁腕部骨化中心数目=年龄+1

(5)牙齿的发育：一共20颗，正常乳牙4-10个月开始萌出，3岁出齐，萌出时间> 13个月称为出牙延迟。恒牙骨化从新生儿开始，第一恒牙6岁开始萌出，12岁出齐。

(6)运动和语言发育

6.运动和语言发育			
时间	动作发育	语言发育	的昭居帅迎已
3个月	用卵石·为保号也，用手换东西	咿呀发音	“3”“姨”
6个月	能坐一会，用手玩玩具	能发单音	“6”“摇”
7个月	会翻身，能独坐很久，双手交换玩具	能叫爸爸，妈妈	78 爸
1岁	独走，弯腰拾东西	能叫出物品的名字	1 个名字
2岁	能双脚跳，会用勺子吃饭	会说2~3个字构成的句子	2=2
3岁	能跑，会洗手、洗脸、穿衣	能说短歌谣，能数几个数	三哥

儿科第四章

新生儿总论

1. 新生儿定义：脐带结扎到生后28天内的婴儿。

高危儿定义：指已发生或可能发生危重疾病而需要监护的新生儿。

2. 新生儿的分类

按胎龄：

早产儿26w—37w 足月儿37w—42w 过期产 > 42w

按出生体重：

- ① 正常体重儿 2500g—4000g 低出生体重儿 < 2500 g
- ② 极低体重儿< 1500 g 超低体重儿 < 1000 g

③ 巨大儿> 4000 g

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/856132231025010115>

④