

护师（初级）考试试卷(一)

(考试时间90分钟,总分100分)

准考证号: _____ 姓名: _____

一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- () 1、脑出血最常见的病因是
- A、动脉硬化
 - B、高血压
 - C、高血脂
 - D、风湿性心脏病
 - E、高盐饮食
- () 2、急性化脓性阑尾炎病人的术前准备不包括
- A、禁食、禁水
 - B、备皮
 - C、药物过敏试验
 - D、血、尿、便常规
 - E、灌肠
- () 3、原发性醛固酮增多症患者的尿液变化是
- A、尿多，以白天尿多为主
 - B、尿多，以夜尿多为主
 - C、尿量无变化
 - D、尿量减少
 - E、尿少，以夜尿少为主
- () 4、肛管手术后，为利于手术切口愈合，应避免解大便的时间为
- A、术后48小时内
 - B、术后3天内
 - C、术后3天以上
 - D、术后10日以上
 - E、术后1个月以内
- () 5、产后抑郁最常见于产后
- A、3~4天

- B、5~14天
- C、2周
- D、3~4周
- E、4~6周
- () 6、患者女，60岁。患大叶性肺炎，高热昏迷11天，10天内给予大量抗生素治疗，近日发现其口腔黏膜破溃，创面上附着白色膜状物，拭去附着物可见创面轻微出血。
该患者口腔病变原因可能是
- A、病毒感染
- B、真菌感染
- C、凝血功能障碍
- D、绿脓杆菌感染
- E、维生素缺乏
- () 7、三个月小儿，腹泻2天，每天约10余次，水样便，呕吐，尿少，前囟凹陷，浅昏迷状，呼吸深快，口唇樱红，血清钠156mmol / L，口腔黏膜有白色点片状物，强拭去可见红色疮面。
该患儿患有哪种口腔疾病
- A、溃疡性口腔炎
- B、口腔溃疡
- C、疱疹性口腔炎
- D、鹅口疮
- E、龋齿病
- () 8、下列哪项是诊断病毒性心肌炎最有意义的实验室检查
- A、白细胞增高
- B、血沉增快
- C、心肌钙蛋白增高
- D、血清中和抗体效价增高4倍以上
- E、乳酸脱氢酶增高
- () 9、冻僵
- A、肌肉松弛
- B、肌束颤动
- C、四肢肌肉、关节僵硬
- D、肌肉运动不协调
- E、肌肉痉挛
- () 10、患者第1胎，孕38周，双胞胎，第1胎儿臀位脐带脱垂，臀牵引娩出，第2胎儿头位自娩，产后

20min突然阴道出血200ml，胎盘尚无剥离迹象
该产妇最及时的处理是

- A、手取胎盘
- B、检查软产道，除外损伤
- C、输液，静脉注射麦角新碱
- D、牵引脐带，挤压宫底，迫使胎盘娩出
- E、观察胎盘剥离迹象，协助胎盘娩出

() 11、下列哪项描述符合急性肾炎表现

- A、水肿明显呈指压性凹陷
- B、血清补体正常
- C、尿检查有大量红细胞
- D、血浆蛋白质下降
- E、血胆固醇增高

() 12、患者男性，22岁，转移性右下腹痛8h，右下腹有固定的压痛点，临床诊断为急性阑尾炎，准备手术治疗。

手术后24h内，最常见的并发症是

- A、切口感染
- B、盆腔脓肿
- C、门静脉炎
- D、腹腔内出血
- E、切口裂开

() 13、六十六岁刘女士，肥胖，有糖尿病和失眠史，近来发现血压升高波动在160~170 / 90~100mmHg，伴有头痛头胀，检查血脂正常，心肾无异常发现，有眼底动脉硬化。父亲有高血压和糖尿病。

刘女士的高血压危险分层属于

- A、中危
- B、无任何危险
- C、极高危
- D、低危
- E、高危

() 14、急性肾衰竭死亡的常见原因是

- A、低血钾
- B、高血钾

- C、低血钠
 - D、高血钠
 - E、低血镁
- () 15、属于浅反射的是
- A、颈强直
 - B、巴宾斯基征阳性
 - C、前囟饱满
 - D、提睾反射
 - E、膝腱反射
- () 16、下腹部被车撞伤后出现小腹疼痛伴排尿困难，试插导管可以顺利进入膀胱，注入200ml生理盐水后抽出140ml。应首先考虑
- A、后尿道断裂
 - B、前尿道断裂
 - C、输尿管损伤
 - D、膀胱损伤合并尿道损伤
 - E、膀胱破裂
- () 17、发育正常的10~11个月小儿可以尝试
- A、抬头
 - B、独坐
 - C、独站
 - D、爬行
 - E、跑
- () 18、肝硬化病人情况良好，突然出现大量呕血，提示
- A、胃溃疡出血
 - B、急性胃黏膜病变出血
 - C、食管静脉曲张破裂出血
 - D、反流性食管炎出血
 - E、应激性溃疡出血
- () 19、脑出血
- A、腰穿脑脊液检查
 - B、脑电图检查
 - C、脑血管造影

D、CT、MRI

E、肌肉活组织检查对下列疾病最有意义的检查项目是

- () 20、Reynolds五联征是指
- A、腹痛、寒战高热、黄疸、呕吐、昏迷
 - B、腹痛、寒战高热、腹胀、休克、昏迷
 - C、腹胀、寒战高热、黄疸、休克、昏迷
 - D、腹痛、寒战高热、黄疸、休克、昏迷
 - E、腹泻、寒战高热、黄疸、休克、昏迷
- () 21、护士为甲亢危象患者介绍复方碘口服液的正确服用方法，其正确的是
- A、首剂10~20滴，以后每3~4小时2~5滴，一般使用1~3天后停药
 - B、首剂20~30滴，以后每3~4小时1~5滴，一般使用5~7天后停药
 - C、首剂30~60滴，以后每3~4小时5~10滴，一般使用1~3天后停药
 - D、首剂30~60滴，以后每6~8小时5~10滴，一般使用1~3天后停药
 - E、首剂30~60滴，以后每6~8小时5~10滴，一般使用3~7天后停药
- () 22、患者男，65岁。高血压17年，突发头痛、视物模糊、失语，测血压210 / 130mmHg。下列降压药物应首先选择
- A、卡托普利
 - B、呋塞米
 - C、硝普钠
 - D、维拉帕米
 - E、普萘洛尔
- () 23、患者男，60岁。肺癌患者，在护士静脉推注化疗药物阿霉素20mg+生理盐水20ml的过程中，不慎将药液漏至血管外。以下哪项处理错误
- A、停止注射，拔出针头
 - B、支托痛处
 - C、普鲁卡因注入局部皮下
 - D、局部热敷
 - E、氢化可的松油膏外敷
- () 24、患者男，41岁。因车祸伤致颅内血肿，深昏迷，脑疝形成。实施颅内血肿清除、去骨瓣减压手术，术中输血3600ml，术后入ICU，患者出现皮肤紫斑，切口部位有出血。
2. 在抢救过程中应及时使用
- A、止血剂
 - B、抗生素

C、升压药

D、抗凝剂

E、利尿剂

() 25、原发性醛固酮增多症最常见的病因是

A、肾上腺皮质腺瘤

B、特发性醛固酮增多症

C、原发性肾上腺皮质增生

D、分泌醛固酮的肾上腺癌

E、糖皮质激素可抑制性原发性醛固酮增多症

() 26、下列哪项不属于沟通的基本要素

A、沟通的背景或情景

B、信息发出者

C、信息影响者

D、信息

E、信息接收者

() 27、护士为系统性红斑狼疮患者进行的皮肤护理，应除外

A、切勿热敷红肿疼痛的关节

B、忌用碱性肥皂

C、疼痛时切勿抓挠

D、避免阳光暴晒

E、以10℃水局部湿敷

() 28、轻度一氧化碳中毒时，血液中碳氧血红蛋白的浓度为

A、10%~20%

B、20%~30%

C、30%~40%

D、40%以上

E、50%以上

() 29、关于滴虫性阴道炎，下列哪项是正确的

A、外阴奇痒

B、白带为豆渣样

C、滥用抗生素、雌激素可诱发

D、性伴侣无需同时治疗

E、告知病人每晚用1%乳酸冲洗阴道后，再阴道上药

() 30、原发性肺结核

A、INH配合RFP+EM

B、疗程12个月

B. IN

B、SM为基础配合RFP+EMB等两段疗法，疗程1年半以上

C、短程疗法，疗程6~9个月

D、短程疗法，疗程3个月

E、短程疗法，疗程6个月

() 31、宫颈癌普查

A、三合诊

B、双合诊

C、肛-腹诊

D、肛门指诊

E、盆腔检查

() 32、关于分娩的分期，错误的是

A、总产程是指规律性宫缩开始至胎儿娩出为止

B、第一产程初产妇需要11~12小时

C、第二产程初产妇需要1~2小时

D、第三产程不超过30分钟

E、第二产程经产妇需1小时或数分钟

() 33、孙先生，36岁。无痛性肉眼血尿1周行膀胱镜检查。
防止尿路感染措施错误的是

A、口服抗生素一周

B、勤排尿

C、留置导尿

D、大量饮水

E、保持尿道口清洁

() 34、上消化道出血量大且出血速度快的表现为

A、黑便

B、柏油便

- C、排便可呈暗红或鲜艳
 - D、咖啡色便
 - E、黏液脓血便
- () 35、张女士，46岁。患胃溃疡多年，几天前出现呕血、黑便。该患者胃内有陈旧性出血，其呕吐物颜色呈
- A、鲜红色
 - B、咖啡色
 - C、黄绿色
 - D、暗灰色
 - E、暗红色
- () 36、下列哪项是房间隔缺损的心脏杂音
- A、胸骨左缘第3、4肋可闻及3~5/6级全收缩期返流性杂音
 - B、胸骨左缘第2、3肋间可闻见II~III级收缩期喷射样杂音
 - C、心尖部可闻及高流量舒张期隆隆样杂音
 - D、胸骨左缘第2、3肋间可闻见II~III级舒张期喷射样杂音
 - E、胸骨左缘第2~4肋间可闻见II~III级收缩期喷射样杂音
- () 37、患者男，34岁。较长距离步行后，感下肢疼痛，肌肉抽搐，休息后症状消失，再走一段路后症状又出现。平时有右足发凉、怕冷及麻木感。检查：右足背动脉较左侧搏动减弱。应考虑为
- A、静脉血栓形成
 - B、血栓性静脉炎
 - C、动静脉瘘
 - D、雷诺综合征
 - E、血栓闭塞性脉管炎
- () 38、护士应具有合理的专业知识、较强的实践技能、敏锐的观察能力和分析能力，属于对护士哪一方面的要求
- A、思想素质
 - B、文化素质
 - C、专业素质
 - D、心理素质
 - E、体态素质
- () 39、为预防颅脑损伤患者出现脑水肿，其每日水总摄入量不应超过
- A、500~1000ml

B、1000~1500ml

C、1500~2000ml

D、2000~3000ml

E、2500~3000ml

() 40、心力衰竭病人长期卧床时，最易出现水肿的部位是

A、踝部

B、双眼睑

C、下肢

D、骶尾部

E、胫前

() 41、下列哪种妇科腹部手术，术前需做阴道准备

A、子宫次全切除术

B、输卵管结扎术

C、输卵管成型术

D、陈旧性宫外孕

E、单纯性卵巢囊肿切除术

() 42、初乳

A、产后14天以后分泌的乳汁

B、产后5天内分泌的乳汁

C、产后7天内分泌的乳汁

D、产后7~14天分泌的乳汁

E、产后3天内分泌的乳汁

() 43、脑血管疾病病人常有的“三偏征”是指

A、偏瘫、失语、偏身感觉障碍

B、偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲

C、偏瘫、意识障碍、偏盲

D、颅压偏高、偏瘫、偏身感觉障碍

E、颅压偏高、偏瘫、偏盲

() 44、对于需取得患者书面同意方可进行的医疗活动，以下哪一做法不正确 ()

A、患者不具备完全民事行为能力时，由其法定代理人签字

B、患者因病无法签字时，由其授权的人员签字

C、为抢救患者，在法定代理人或被授权人无法及时签字的情况下，可由责任护士代为签字

D、因实施保护性医疗措施不宜向患者说明情况的，应将有关情况告知患者近亲属，由患者近亲属签署知情同意书，并及时记录

E、患者无近亲属的或者患者近亲属无法签署同意书的，由患者的法定代理人或者关系人签署同意书

() 45、易发生蒂扭转的卵巢肿瘤是

A、浆液性囊腺瘤

B、黏液性囊腺瘤

C、纤维瘤

D、颗粒细胞瘤

E、畸胎瘤

() 46、夜班护士发现一支气管扩张病人咯血约200ml后突然中断，呼吸极度困难，喉部有痰鸣音，表情恐怖，两手乱抓，首先要做的是

A、立即通知医生

B、立即行气管插管

C、清除呼吸道积血

D、给予高流量氧气吸入

E、应用呼吸兴奋剂

() 47、患者平卧，患肢抬高 $70^{\circ} \sim 80^{\circ}$ ，持续60秒，若出现麻木、疼痛、苍白，说明

A、Pratt试验阳性

B、Buerger试验阳性

C、Trendelenburg试验阳性

D、Penthes试验阳性

E、腰交感神经阻滞试验阳性

() 48、罗先生，59岁。诊断为慢性肾小球肾炎、慢性肾衰竭住院治疗，血肌酐为 $467 \mu\text{mol} / \text{L}$ ，尿素为 $19.37\text{mmol} / \text{L}$ ，血红蛋白 $88\text{g} / \text{L}$ ，血压 $180 / 100\text{mmHg}$ ，尿量 $1200\text{ml} / \text{d}$ ，无水肿。经过药物治疗，血钾仍高于正常值，最好采取的治疗措施为

A、血液透析

B、肾移植

C、血液滤过

D、连续性肾脏替代治疗

E、血浆置换

() 49、下列导致急性肾衰竭的病因中属于肾性肾衰竭的是

A、脱水、呕吐、腹泻

- B、烧伤、休克、严重心律失常、心衰
- C、急性肾炎、狼疮性肾炎、紫癜性肾炎
- D、外科手术大出血
- E、输尿管狭窄、肾结石

() 50、患者男，80岁。慢性咳嗽、咳痰10年，近两年来，劳动时出现气短，近两日感冒后病情加重，咳脓痰且不易咳出，查体T:36.8℃，神志清，桶状胸，双肺叩诊过清音，呼吸音低，以慢性支气管炎合并慢性阻塞性肺气肿入院治疗。

对上述患者进行哪项检查有助于确诊

- A、心电图
- B、胸部X线检查
- C、痰液检查
- D、血气分析
- E、脑脊液检查

参考答案

一、单项选择题

1、B

2、E

【解析】急性化脓性阑尾炎病人入院后，需经1~4小时的术前准备，病情严重患者的术前准备时间应缩短。入院后即禁食水，绝对禁止灌肠。因为灌肠可刺激肠壁，使肠腔压力增高，会造成肠管破裂和炎症扩散。故答案为E。

3、B

【解析】原发性醛固酮增多症病人出现多饮、多尿，原因是低血钾对肾小管的损害，可造成肾小管上皮细胞浊肿、颗粒样变及空泡变性，从而影响到肾小管重吸收水的功能，使尿排出增加，每日尿量可达3000~4000ml，因尿多引起口渴多饮；引起夜尿增多的原因主要是长期水钠潴留引起的高血压，使肾小动脉弹力减退。白天人的活动量增加时，由于身体其他脏器的血液需要量也增多，使肾脏血流量相对减少，滤过尿液减少；夜间其他脏器需血量减少，肾动脉血流量增加，尿量亦增加，故形成夜尿量多于日尿量的情况。故选B。解题关键：原发性醛固酮增多症患者多饮、烦渴、尿多，以夜尿多为主。

4、B

5、C

6、B

【解析】1. 根据题意，患者连续用抗生素治疗，因此不考虑是细菌或是病毒感染，排除A、D。凝血功能障碍主要表现为出血，与题意不符，C错误。维生素缺乏会表现口腔溃疡，与题意不符，E错误，因此B是正确答案。过关键点睛：大剂量的应用抗生素会导致耐药菌株产生，容易导致口腔黏膜真菌感染。

2. 0.1%醋酸溶液适用于绿脓杆菌感染，A错误。碳酸氢钠则用于真菌感染，因此B是正确答案。呋喃西林和朵贝尔溶液是广谱抗菌药，对真菌感染效果不佳，C、D错误。生理盐水适用于口腔清洁时，对真菌感染无效，E错误。解题关键：掌握常用口腔护理液的作用及适用范围。

3. 为患者进行口腔护理时，首先要取下患者的义齿，E做法对。对于清醒患者要用漱口液漱口，昏迷患者则不需要，因此C是正确答案。操作前后都要数棉球，防止落在口腔内吸入引起窒息，使棉球的干湿度适宜，用开口器从臼齿处放入，协助开口，然后逐步进行擦拭，A、B、D做法正确，但与题意不符。解题关键：区别昏迷与清醒患者口腔护理的要点。

7、D

8、D

9、C

10、A

11、C

12、D

13、E

14、B

【解析】急性肾衰竭死亡的常见原因是高钾血症。

15、D

【解析】浅反射是刺激皮肤、粘膜引起的肌肉快速收缩反应。包括角膜反射、咽反射、腹壁反射、提睾反射、跖反射、肛门反射等。故答案为D。

病理反射是指锥体束损害时，失去了对脑干和脊髓的抑制功能而出现踝和拇趾背伸的现象，又称锥体束征。病理反射，包括Babinski征、Chaddock征、Oppenheim征、Gordon征。故答案为B。

软脑脊膜受到炎症、出血或理化内环境的改变刺激时可出现一系列提示脑膜受损的病征，称脑膜刺激征。脑膜刺激征包括颈强直、凯尔尼格征、布鲁津斯基征。故答案为A。

颅内压是指颅腔内容物对颅腔壁产生的压力，是由液体静力压和血管动压两因素组成。由于颅腔总容积相对固定，颅内压保持相对稳定。当颅内压过高时，会引起前囟饱满。常见颅内压增高典型表现为：头痛、喷射状呕吐、视乳头水肿。故答案为C。

16、E

17、C

18、C

19、D

【解析】格林——巴利综合征一般认为是神经系统由体液和细胞共同介导的单相性自身免疫性疾病。主要病变为神经根周围神经广泛的炎症性脱髓鞘，有时也累及脊膜、脊髓及脑部、临床特征以发展迅速的四肢对称性无力伴腱反射消失为主。病情严重者出现延髓和呼吸肌麻痹而危及生命。故急性感染性多发性神经炎检查为腰穿脑脊液检查。

癫痫由于异常放电的起始部位和传递方式的不同，癫痫发作的临床表现复杂多样，可表现为发作性运动、感觉、自主神经、意识及精神障碍。故癫痫是大脑异常放电的一种表现，故检查为脑电图检查。

脑出血检查. CT检查颅脑CT扫描可清楚显示出血部位、出血量大小、血肿形态、是否破入脑室以及血肿周围有无低密度水肿带和占位效应等。病灶多呈圆形或卵圆形均匀高密度区，边界清楚，脑室大量积血时多呈高密度铸型，脑室扩大。1周后血肿周围有环形增强，血肿吸收后呈低密度或囊性变。动态CT检查还可评价出血的进展情况。2. MRI和MRA检查对发现结构异常，对检出脑干和小脑的出血灶和监测脑出血的演进过程优于CT扫描，对急性脑出血诊断不及CT。

影像学检查1. 神经影像学检查(1)应常规进行CT检查：多数病例发病24h后逐渐显示低密度梗死灶，发病后2~15天可见均匀片状或楔形的明显低密度灶，大面积脑梗死伴脑水肿和占位效应，出血性梗死呈混杂密度，应注意病后2~3周梗死吸收期，病灶水肿消失及吞噬细胞浸润可与脑组织等密度，CT上难以分辨，称为“模糊效应”。增强扫描有诊断意义，梗死后5~6天出现增强现象，1~2

周最明显，约90%的梗死灶显示不均匀的病变组织。但有时CT不能显示脑干、小脑较小梗死灶。

(2)MRI：可清晰显示早期缺血性梗死、脑干及小脑梗死、静脉窦血栓形成等，梗死后数小时即出现T1低信号、T2高信号病灶，出血性梗死显示其中混杂T1高信号。钆增强MRI较平扫敏感。功能性MRI弥散加权成像(DWI)可早期诊断缺血性卒中，发病2h内即显示缺血病变，为早期治疗提供重要信息。DSA可发现血管狭窄及闭塞部位，显示动脉炎、Moyamoya病、动脉瘤和动静脉畸形等。

20、D

21、E

【解析】甲亢危象时：抑制甲状腺激素释放给予复方碘溶液口服，首次30~60滴，以后每6~8h 5~10滴，或碘化钠每日 0.5~ 1.0g静脉滴注，一般使用3~7天后停药。故答案为E。

22、C

【解析】硝普钠适应证：①高血压急症，如高血压危象（血压骤然升到200/120mmHg）以上，病人感到突然头痛、头晕、视物不清或失明；恶心、呕吐、心慌、气短）、高血压脑病、恶性高血压、嗜铬细胞瘤手术前后阵发性高血压等的紧急降血压，也用于外科麻醉期间进行控制性降压；②用于急性心力衰竭，包括急性肺水肿。故选C。解题关键：高血压危象首选硝普钠，其作用迅速，而且消失也快。

23、D

【解析】若怀疑药物外渗即停止输液，并针对外渗药液的性质给予相应的处理。但严禁局部热敷。抬高患肢，同时采用局部冷敷和冰敷，使血管收缩减少药物吸收，并可降低痛觉神经敏感性。局部封闭，对强刺激药物，可用1%~2%普鲁卡因2ml注射于外溢血管周围皮下组织，进行封闭。故正确答案为D。解题关键：掌握化疗药物外渗的处理。

24、D

【解析】抢救过程中应及时使用抗凝剂，如肝素

25、A

【解析】原发性醛固酮增多症的病因有：①肾上腺皮质腺瘤，最多见，约占80%；②特发性醛固酮增多症；③原发性肾上腺皮质增生；④分泌醛固酮的肾上腺腺癌；⑤糖皮质类固醇可抑制醛固酮增多症；⑥异位分泌醛固酮的肿瘤。故选A。

26、C

27、E

【解析】病人应避免在烈日下活动，必要时穿长袖衣裤，戴遮阳帽、打伞、禁忌日光浴。保持皮肤的清洁卫生，可用清水冲洗皮损处，忌用碱性肥皂，避免化妆品及化学药品，防止刺激皮肤。

28、A

29、E

30、A

【解析】原发性肺结核可采用标准疗法：INH配合RFP+EMB，疗程12个月。粟粒性肺结核和结核性脑膜炎，病情重，应采取两阶段疗法、长程疗法：INH、SM为基础配合RFP+EMB等两段疗法，疗程1年半以上。

31、E

【解析】未婚妇女的妇科检查选择肛-腹诊。肛腹诊一手食指蘸肥皂水伸入直肠，另一手在腹部配合检查，称为肛腹诊。适用于未婚妇女、处女膜闭锁或经期不宜作双合诊者。故答案为C。

32、A

【解析】【考点】产程分期【精析】从开始出现规律宫缩至胎儿胎盘娩出，称总产程，初产妇13~16小时，经产妇6~9小时，正常不超过24小时。第一产程初产妇需11~12小时，经产妇需6~8小时。第二产程初产妇需1~2小时，经产妇数分钟内即可完成，但也可长达1小时。第三产程又称胎盘娩出期。从胎儿娩出到胎盘娩出，需5~15分钟，不应超过30分钟。【避错】本题部分考生易选B，由于误认为是选择正确选项而误选，本题B、C、D、E均为正确选项，只有A错误，总产程是指规律性宫缩开始至胎儿、胎盘娩出为止。

33、C

34、C

35、B

36、B

37、E

【解析】II期以患肢活动后出现间歇性跛行为突出症状。患肢皮肤温度降低、色泽更为苍白，同时出现皮肤干燥、趾（指）甲增厚变形；小腿肌萎缩，足背或胫后动脉搏动消失。正确答案为E。解题关键：间歇性跛行是血栓闭塞性脉管炎的典型症状。

38、C

【解析】专业素质：具备合理的知识结构及比较系统完整的专业理论知识和较强的实践技能。具有敏锐的观察和综合分析、判断能力；树立整体护理观念，能用护理程序解决病人的健康问题。具有开展护理教育和护理研究的能力，勇于创新进取。

39、B

【解析】【考点】颅脑损伤患者的护理【精析】限制水入量：水入量过大可诱发脑水肿，故在最初几日，应保持轻度脱水状态，使水出量略多于水入量。每日总入量为1000~1500ml，一般情况下水入量可按前一日尿量加500ml计算。【避错】本题考查颅脑损伤患者入量的知识点，粗心的考生误以为是考查每日尿量，误选C项，请考生注意读题，本题正确答案为B。@jin

40、D

【解析】心源性水肿的特点是发生在身体最低处，呈下垂性、凹陷性水肿。

41、B

42、C

43、B

44、C

【解析】对按照规定需取得患者书面同意方可进行的医疗活动，应当由患者本人或其委托代理人签署同意书。患者不具备完全民事行为能力时，应当由其法定代理人签字；患者因病无法签字时，应当由其近亲属签字，没有近亲属的，由其关系人签字；为抢救患者，在法定代理人或近亲属、关系人无

法及时签字的情况下，可由本院主管院长或者被授权的负责人签字。因实施保护性医疗措施不宜向患者说明情况的，应当将有关情况通知《知情选择书》中所确定的被告知者。故答案为C。

45、E

【解析】畸胎瘤易发生蒂扭转，因此E是正确答案。浆液性囊腺瘤、黏液性囊腺瘤、纤维瘤、颗粒细胞瘤均不会发生卵巢蒂扭转，故A、B、C、D错误。解题关键：生殖细胞肿瘤中仅成熟畸胎瘤为良性，且易发生蒂扭转。

46、C

【解析】表情恐怖，两手乱抓为窒息的表现，该患者是咯血后出现的症状考虑为咯血引起的血块堵住气道，故首要的护理措施为清除呼吸道积血。

47、B

【解析】Pratt试验：病人仰卧，抬高下肢，在大腿根部扎上止血带，然后从足趾向上至腘窝缠缚第一根弹力绷带，再自止血带处向下，缠绕第二根弹力绷带；让病人站立，一边向下解开第一根弹力绷带，一边向下缠缚第二根弹力绷带，如果在第二根绷带之间的间隙内出现曲张静脉，即意味该处有功能不全的交通静脉。大隐静脉瓣膜功能试验（Trendelenburgtest）：病人平卧，抬高下肢排空静脉，在大腿根部扎止血带阻断大隐静脉，然后让病人站立，10秒内放开止血带，若出现自上而下的静脉逆向充盈，提示瓣膜功能不全。若未放开止血带前，止血带下方的静脉在30秒内已充盈，则表明交通静脉瓣膜关闭不全。根据同样原理在腘窝部扎止血带，可检测小隐静脉瓣膜的功能。深静脉通畅试验（Penthestcst）：用止血带阻断大腿或静脉主干，嘱病人连续用力踢腿或作下蹲活动10余次，随着小腿肌泵收缩迫使浅静脉血向深静脉回流而排空。若在活动后浅静脉曲张更为明显、张力增高，甚至出现胀痛，提示深静脉不通畅。Buerger试验患者平卧，患肢抬高 $70^{\circ} \sim 80^{\circ}$ ，持续60秒，若出现麻木、疼痛、苍白，存在肢体动脉供血不足，下垂肢体后，皮色恢复时间由正常的10~20秒延长到45秒以上，且颜色不均，呈斑片状，故本题选B。解题关键：Buerger试验阳性患肢抬高 $70^{\circ} \sim 80^{\circ}$ ，持续60秒，出现麻木、疼痛、苍白。

48、A

49、C

50、D

【解析】1. 该患者有慢性支气管炎的病史，现感冒诱发病情加重，初步诊断为慢性支气管炎合并慢性阻塞性肺气肿。现在最重要的诊断是要确认患者是否伴发呼吸衰竭。血气分析：静息状态吸空气时动脉血氧分压(PaO) $< 8.0\text{kPa}$ (60mmHg)、动脉血二氧化碳分压(PaCO) $> 6.7\text{kPa}$ (50mmHg)，为II型呼吸衰，单纯动脉血氧分压降低则为I型呼吸衰，故选D。解题关键： PaO 低于(60mmHg)，或伴有 PaCO 高于50mmHg，即为呼吸衰竭。

2. COPD急性发作的主要原因是呼吸道感染，主要病原菌为肺炎链球菌和流感嗜血杆菌。因而积极抗感染是COPD急性发作期治疗的主要环节，针对病原菌选择敏感的抗生素给予口服或静脉注射治疗。故选A。解题关键：呼吸衰竭治疗首先积极治疗原发病，有感染时应使用抗生素，去除诱发因素。

护师（初级）考试试卷(二)

(考试时间90分钟,总分100分)

准考证号: _____ 姓名: _____

一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- () 1、慢性心力衰竭发病机制下列哪项不妥
- A、慢性心衰早期通过心率加快、心肌肥厚及心腔扩大可提高心排血量
 - B、心衰早期神经内分泌系统激活，增加血管阻力，水钠潴留以维持血液灌注压
 - C、失代偿期心肌肥厚致心肌损伤和坏死
 - D、失代偿时持续心脏扩大，可加重心肌损伤
 - E、失代偿期神经内分泌系统长期活性增加仍可维持血液灌注压
- () 2、患者女，35岁。近一段时间出现不规则阴道出血，经量增多，并感到阴道排液也增多，并有恶臭。建议做
- A、阴道分泌物悬滴检查
 - B、子宫颈活体组织检查
 - C、分段诊断性刮宫
 - D、阴道侧壁涂片
 - E、内诊检查
- () 3、孕妇骨盆外测量数值最小的是
- A、髂棘间径
 - B、髂嵴间径
 - C、骶耻外径
 - D、粗隆间径
 - E、坐骨结节间径
- () 4、下列哪项是肾结石肾绞痛最佳的止痛方法
- A、针刺
 - B、肾区热敷
 - C、阿托品+哌替啶肌注
 - D、阿托品穴位注射
 - E、利多卡因局部封闭
- () 5、患者女，40岁。突然剧烈头痛、呕吐、眼睑下垂，见右眼球活动受限，呈外展位，瞳孔扩大，对光反应消失，视力正常。查：颈项强直，克氏征(+)。

如果腰椎穿刺，脑脊液的成分改变为

- A、正常
- B、以大量白细胞增多为主
- C、以大量蛋白质增加为主
- D、以大量红细胞增多为主
- E、以葡萄糖减少为主

() 6、关于胎膜早破对母儿的影响，下列哪项是正确的

- A、不增加产褥感染的发生率
- B、不对妊娠和分娩造成影响
- C、影响产程进展
- D、导致急产
- E、可导致脐带脱垂和胎儿宫内窘迫

() 7、为减少支气管扩张患者呼吸道感染的发生，尤应重点做好下列哪项护理工作

- A、保持一定的温度
- B、保持口腔清洁
- C、卧床休息
- D、高蛋白易消化饮食
- E、病室空气流通

() 8、属于客观方面的健康资料是

- A、黑蒙
- B、疼痛
- C、水肿
- D、愉快
- E、乏力

() 9、一般病人术前血红蛋白大于多少方可手术

- A、6g/dl
- B、8g/dl
- C、10g / dl
- D、12g/dl
- E、14g/dl

() 10、吴女士，35岁，因卵巢肿瘤住院择期手术。

术前为其插导尿管时尿道口和小阴唇的消毒顺序是

- A、自上而下，由外向内
- B、自下而上，由内向外
- C、自下而上，由外向内
- D、自上而下，由内向外
- E、由外向内，再由内向外

() 11、易发生日射病

- A、高热出汗只饮蒸馏水
- B、多汗不饮水
- C、头部直接日光照射
- D、高热环境多饮盐汽水
- E、高热无汗、意识障碍

() 12、为了切实做到尊重病人自主性或决定，医生向病人提供信息时要避免

- A、适量
- B、适度
- C、开导
- D、诱导
- E、理解

() 13、患者女，42岁。从楼梯上摔下，双下肢不能活动，腹股沟以下皮肤感觉消失，大小便失禁，3周来院就诊。

该患者最可能的损伤平面定位是

- A、颈髓
- B、胸髓
- C、圆锥
- D、腰膨大
- E、马尾

() 14、下列哪项是皮肤黏膜淋巴结综合征的首选药物

- A、阿司匹林
- B、双嘧达莫
- C、白蛋白
- D、丙种球蛋白
- E、肾上腺糖皮质激素

() 15、一名患急性喉炎的小儿，安静时可听到喉鸣，并有吸气性呼吸困难，听诊可闻管状呼吸音，患儿心率加快，约130次/分，该患儿喉梗阻程度为

- A、I度
- B、II度
- C、III度
- D、IV度
- E、V度

() 16、下列哪项是最常见的输血反应

- A、发热反应
- B、过敏反应
- C、溶血反应
- D、急性肺水肿
- E、枸橼酸钠中毒反应

() 17、类风湿关节炎具特征的是

- A、尺侧偏向畸形
- B、关节呈杵状
- C、有近端梭状指
- D、关节疼痛
- E、关节附近肌萎缩

() 18、适用于宫颈病变的是

- A、宫颈或宫颈管活体组织检查
- B、阴道分泌物悬滴检查
- C、输卵管通畅检查
- D、子宫镜检查
- E、阴道后穹隆穿刺术

() 19、肾病综合征病人应给予

- A、普通饮食
- B、高蛋白饮食
- C、低蛋白饮食
- D、无盐饮食
- E、流质饮食

() 20、患者男性，65岁，3年前起出现中上腹部隐痛，呈间歇性，通常于饭前或饭后4~5小时发生，偶尔睡眠时发生疼痛，进食后疼痛可好转。当地医务室诊为“胃炎”服药后缓解。4天前上腹疼痛加剧，服阿托品无效，进食后不缓解，昨日排柏油样便2次、每次约100g，故来院诊治。体

检：口唇略苍白，无发绀，两肺无异常；心律齐，无病理性杂音；腹软，中上腹有轻度压痛，肝脾未及，移动性浊音(-)。实验室检查：WBC $5.0 \times 10^9 / L$ Hb100g / L尿常规(-)，大便隐血(+++)。

为明确诊断，需做何检查

A、X线钡餐检查

B、胃镜检查

C、血尿酸酶检查

D、腹部平片

E、肝功能检查

() 21、某1岁患儿，其母患开放性肺结核，出生时未接种卡介苗，72h前作OT试验1:100浓度，今局部红、硬直径为10mm，宜采用下列哪项措施

A、动态观察

B、接种卡介苗

C、抗结核治疗

D、脑部摄片

E、血沉检查

() 22、患者男，48岁。有肝硬化病史8年，最近出现腹水而在家休息，4天前开始解黑便，今天淡漠少言，反应迟钝就诊，怀疑有肝性脑病可能。

肝性脑病的治疗与下列哪项措施无关

A、灌肠或导泻清除肠内积血

B、静脉滴注谷氨酸钠

C、口服新霉素

D、便秘时可用米醋稀释灌肠

E、给予复方甘草合剂止咳祛痰

() 23、下列哪项不是自发性气胸病人的一般治疗措施

A、卧床休息

B、氧气吸入

C、给予镇静、镇痛药物

D、支气管痉挛者可使用氨茶碱等支气管扩张药

E、剧烈刺激性干咳者不给予可待因等药物镇咳

() 24、下列哪一项不是病毒性心肌炎的护理诊断

A、心肌敏感性降低

B、潜在并发症：心律失常

- C、舒适改变
 - D、活动无耐力
 - E、潜在并发症：心力衰竭
- () 25、损伤后胸腔内压力进行性增加，是
- A、张力性气胸
 - B、急性脓胸
 - C、多根多处肋骨骨折
 - D、慢性脓胸
 - E、开放性气胸
- () 26、章女士，因不孕症行输卵管造影术，护士指导其术后禁止性生活和盆浴的时间是
- A、1周
 - B、2周
 - C、3周
 - D、4周
 - E、5周
- () 27、胆总管结石好发部位是
- A、上段
 - B、中段
 - C、中上段
 - D、中下段
 - E、下段
- () 28、重症哮喘
- A、起病急、缓解快，常于春秋季节发病
 - B、慢性病程，有发作性喘息和哮鸣音
 - C、严重哮喘发作24h以上，一般治疗不能缓解
 - D、突然吸气性呼吸困难伴哮鸣音
 - E、慢性咳嗽咳痰多年，逐渐出现活动后气短
- () 29、肝癌可能
- A、AFP增加特高
 - B、血淀粉酶 $>500\text{U/L}$
 - C、内生肌酐清除率 $<25\text{ml/min}$
 - D、血清FT、FT增高

E、餐后2h血糖超过11.1mmol / L

() 30、小腿部感染

A、热水袋

B、热湿敷

C、烤灯

D、热水坐浴

E、温水浸泡

() 31、马女士，27岁，妊娠29周。近期常感疲乏、无力、心悸。护理体检：面色苍白，血压正常，HR108次 / 分，心尖区可闻及II级柔和吹风样收缩期杂音，Hb80g/L，RBC 2.5×10^9 /L，血清铁 $6.0 \mu\text{mol} / \text{L}$ ，白细胞及血小板计数正常。该患者的诊断为

A、妊娠期早期心力衰竭

B、妊娠合并心脏病

C、妊娠合并再生障碍性贫血

D、妊娠合并缺铁性贫血

E、妊娠合并巨幼红细胞性贫血

() 32、人体实验的道德原则中维护受试者权益是指()

A、人体实验应该预测到所有的风险和预期的价值

B、人体实验应该以不损害人们的健康为前提

C、人体实验应该是没有风险的

D、人体实验的危险应该是很小的

E、人体实验的危险不能超过实验带来的利益

() 33、甲状腺功能亢进的患者应给予

A、普通饮食

B、低蛋白饮食

C、低盐饮食

D、低脂肪饮食

E、高蛋白饮食

() 34、化脓性脑膜炎患儿出现哪项表现提示有脑疝危险

A、喷射性呕吐

B、前囟膨隆

C、惊厥

D、瞳孔大小不等及呼吸改变

E、全身中毒症状

- () 35、患者男，35岁。自二楼跌下，臀部着地，无意识丧失，背痛，15分钟内送达医院。拍片发现第1胸椎椎体压缩性骨折，无脱位，两下肢神经功能基本正常。观察中出现瘫痪，渐加重，最大可能是
- A、脊髓休克
 - B、脊髓损伤
 - C、脊髓断裂
 - D、硬膜外出血，脊髓受压
 - E、脊髓震荡
- () 36、下列哪项不是重型胎盘早剥
- A、无腹痛
 - B、脉搏细弱
 - C、产妇面色苍白
 - D、阴道出血量少
 - E、妊娠高血压疾病病人血压可在正常范围
- () 37、急性胰腺炎的主要临床表现是
- A、腹膜炎体征
 - B、腹胀
 - C、体温增高
 - D、腹痛
 - E、恶心呕吐
- () 38、张女士，60岁。突发胸骨后剧烈疼痛1小时，入院诊断为急性心肌梗死。遵医嘱给予尿激酶溶栓治疗，护士应在多长时间内将药物静脉输注完
- A、30分钟内
 - B、60分钟内
 - C、90分钟内
 - D、120分钟内
 - E、180分钟内
- () 39、食管癌发病情况是
- A、男多于女，年龄在40岁以上多见
 - B、男多于女，年龄在70岁以上多见
 - C、女多于男，年龄在70岁以上多见
 - D、女多于男，年龄在60岁以上多见

E、男多于女，年龄在50岁以上多见

- () 40、护士为肾部分切除术后的患者制订的护理计划中，强调患者采取绝对卧床的时间是
- A、4天
 - B、6天
 - C、8天
 - D、12天
 - E、14天
- () 41、患者男，25岁。以“高热、剧烈胸痛、咳嗽3天”入院。查左侧胸部有明显胸腔积液体征，结合有关辅助检查结果，初步诊断为“化脓性胸膜炎、大量胸腔积液”。
下列胸水细胞数检查结果中，符合该病人特点的是
- A、 $5 \times 10^6/L$
 - B、 $50 \times 10^6/L$
 - C、 $100 \times 10^6/L$
 - D、 $300 \times 10^6/L$
 - E、 $1000 \times 10^6/L$
- () 42、能协助诊断子宫内膜癌经济有效的方法是
- A、分段诊断性刮宫
 - B、诊断性刮宫
 - C、阴道后穹窿脱落细胞检查
 - D、宫腔冲洗法
 - E、宫颈刮片检查
- () 43、罗先生，59岁。诊断为慢性肾小球肾炎、慢性肾衰竭住院治疗，血肌酐为 $467 \mu\text{mol}/L$ ，尿素为 $19.37\text{mmol}/L$ ，血红蛋白 $88\text{g}/L$ ，血压 $180/100\text{mmHg}$ ，尿量 $1200\text{ml}/d$ ，无水肿。
该病人蛋白质的摄入量应为
- A、 $<0.4\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$
 - B、 $0.4 \sim 0.6\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$
 - C、 $0.6 \sim 0.8\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$
 - D、 $0.8 \sim 1.0\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$
 - E、 $1.0 \sim 1.2\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$
- () 44、下列哪项是支气管哮喘病人的每天需水量
- A、 $>1000\text{ml}$
 - B、 $>1500\text{ml}$

C、>2000ml

D、>2500ml

E、>3000ml

() 45、张女士，36岁。孕产孕36周，妊娠合并糖尿病入院待产。检查：血压150/80mmHg. 空腹血糖7mmol / L，尿糖(++)，尿白细胞2~4个 / 高倍视野，宫底高度38cm，胎心率正常。对该孕妇分娩的新生儿，下列哪项护理措施不妥

A、早期进行母乳喂养

B、按早产儿进行监护

C、新生儿娩出30分钟开始滴服25%葡萄糖液

D、观察新生儿有无低钙血症

E、注射胰岛素

() 46、原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别是

A、腹痛性质不同

B、腹膜刺激征有无

C、腹胀程度

D、腹腔内有无原发性病变

E、全身感染现象

() 47、关于慢波睡眠的描述，下列哪项是正确的

A、慢波睡眠分为五个时期

B、入睡期是睡眠时相入睡最浅的一期

C、第二时相睡眠逐渐加深，不易被唤醒

D、中度睡眠期生命体征不规则

E、深睡期不利于促进体力恢复

() 48、下列不属于化学消毒剂使用方法的是

A、擦拭法

B、干烤法

C、浸泡法

D、熏蒸法

E、喷雾法

() 49、关于雾化吸入药物的作用，不正确的叙述是

A、氨茶碱可解除支气管痉挛

B、 α -糜蛋白酶可稀化痰液

C、沙丁胺醇(舒喘灵)可帮助祛痰

D、地塞米松可减轻呼吸道黏膜水肿

E、庆大霉素可消除呼吸道炎症

() 50、使用短效口服避孕药，开始服第一片的时间一般为

A、月经来潮前第5天

B、月经来潮的第5天

C、月经来潮的第10天

D、月经干净后第5天

E、性生活前8小时

参考答案

一、单项选择题

1、E

【解析】【考点】心力衰竭发病机制【精析】在慢性心力衰竭早期，机体通过心率加快、心肌肥厚、心脏扩大提高心肌收缩力，增加心脏容量；通过交感神经兴奋、肾素-血管紧张素-醛固酮系统的激活，代偿性增加血管阻力和潴留水、钠以维持灌注压；心房增加心房钠尿肽的释放，扩张血管，排钠利尿，对抗由于交感神经兴奋和肾素-血管紧张素-醛固酮系统激活造成的不利影响。到心力衰竭失代偿期，心肌肥厚到一定程度时，心肌蛋白质和核酸合成受抑制，发生心肌损伤和坏死，持续性心脏扩大使心肌耗氧量增加，加重心肌的损伤；神经内分泌系统长期活性增加，加重血流动力学紊乱，直接损伤心肌细胞，导致心脏排出量不足，出现呼吸困难、乏力、循环淤血等心力衰竭症状。故本题应选E。【避错】本题应注意慢性心力衰竭在早期和失代偿期不同的发病机制，一般疾病到了失代偿期正常的生理功能已不能维持，且有一定程度的损坏，故E比较容易选出。

2、C

【解析】根据患者病情怀疑为宫颈癌，因此选择分段诊断性刮宫进一步确诊。阴道分泌物悬滴检查、子宫颈活体组织检查一般用于妇科炎症检查，排除A、B。阴道侧壁涂片、内诊检是妇科学查方式，不能确诊，排除D、E，故本题选C。解题关键：诊断性刮宫是确诊宫颈癌的首选方法。

3、E

4、C

【解析】肾绞痛发作时通过单独或联合药物应用，如注射阿托品、哌替啶、钙离子阻滞剂、黄体酮等可缓解肾绞痛。

5、D

【解析】1. 该患者表现为较为严重的蛛网膜下腔出血的症状和体征，且“右眼球活动受限，呈外展位，瞳孔扩大，对光反应消失，视力正常”，可考虑为因动脉瘤的部位、毗邻解剖结构及动脉瘤大小而引起的症状。患者以前无高血压病史，不能诊断为高血压脑出血。故选A。解题关键：对于突发的颅脑出血，如果有高血压史，考虑高血压出血；无高血压史考虑动脉瘤破裂。

2. 动脉瘤破裂，大量血液进入蛛网膜下腔，脑脊液里有大量的红细胞。故选D。解题关键：脑出血性疾病，脑脊液检查自然抽出的是血性液，故以大量红细胞增多为主。

3. 脑血管造影是确诊颅内动脉瘤必需的检查方法，对判明动脉瘤的准确位置、形态、内径、数目、血管痉挛和确定手术方案都十分重要。首次造影阴性，但高度怀疑动脉瘤者，应在3个月后重复造影。故选C。解题关键：对于血管异常有选的诊断方法为血管造影术。

4. 除颅内肿瘤很少出血，引起血性脑脊液外，其他四种疾病都可能出血，从而在腰椎穿刺时，引出血性脑脊液，需要与颅内动脉瘤进行鉴别，故选C。解题关键：脑脊液血性的原因包括出血、血管畸形，颅内肿瘤如不侵犯血管一般不会造成血管破裂。

6、E

7、B

8、C

9、C

【解析】Hb低于6g/dl时应给予红细胞，尤其是急性贫血，高于10g/dl时则不必输用，可适应手术的创伤，故选C。

10、D

11、C

12、D

13、C

【解析】1. 脊髓圆锥含有自主神经和副交感神经，主要负责膀胱和直肠的反射及生殖器的功能，即支配膀胱及肛门括约肌和邻近皮肤、阴唇、阴囊、阴茎海绵体、阴茎勃起和射精。单纯脊髓圆锥损伤的临床特点为膀胱过度膨胀与麻痹性失禁、大便失禁、性功能障碍，鞍区骑跨感觉障碍，运动障碍因位于第3尾椎(S)以下，故双下肢感觉、肌力和反射都正常。故选C。解题关键：脊髓圆锥损伤表现为膀胱、直肠及生殖器的功能损伤。

2. 脊髓完全性损伤表现为损伤平面以下的感觉、运动功能完全消失。由于该患者损伤平面以下的感觉、运动功能完全消失，包括肛门周围的感觉和肛门括约肌的收缩运动，不出现球海绵体反射。所以该患者为脊髓完全性损伤，故选B。

3. 由于该患者为一个完全性的脊髓损伤，所以他的预后仍为完全瘫痪，他的神经功能不可能得到恢复。故选A。解题关键：完全性脊髓损伤患者的神经功能不能恢复。

14、A

15、B

【解析】小儿喉梗阻分为4度：Ⅰ度：患儿安静时如正常儿，活动后出现吸气性喉鸣及呼吸困难。胸部听诊呼吸音清楚。Ⅱ度：患儿安静时也出现喉鸣及呼吸困难。胸部听诊可闻喉传导音及支气管呼吸音，心率稍快，120~140次/分。Ⅲ度：除有喉鸣及呼吸困难外，有阵发性烦躁不安，口唇及指、趾发绀，口周发青或苍白。胸部听诊呼吸音明显降低，心率140~160次/分。Ⅳ度：严重呼吸困难，呈衰竭状态，呼吸无力、昏睡、面色苍白、发灰。胸部听诊呼吸音几乎消失，心音微弱低钝，心率或快或慢，不规律，血压下降，最终昏迷，出现濒死状态。根据题干，患儿安静时可听到喉鸣，并有吸气性呼吸困难，听诊可闻管状呼吸音，患儿心率加快，约130次/分，可判断为喉梗阻Ⅱ度。故答案为B。

16、A

17、A

18、A

19、B

20、B

【解析】1. 呕血和（或）黑便：是上消化道出血的特征性表现。 2. 出血量400ml以内可无症状，出血量中等可引起贫血或进行性贫血、头晕软弱无力，突然起立可产生晕厥、口渴，肢体冷感及血压偏低等。大量出血达全身血量30—50%（约1500—2500ml）即可产生休克，表现为烦躁不安或神志

不清、面色苍白、四肢湿冷、口唇发绀、呼吸困难、血压下降至测不到，脉压差缩小（小于3.33-4kpa）及脉搏快而弱（脉率大于120次/分）等，若处理不当，可导致死亡； 3. 氮质血症； 4. 中度或大量出血病例，于24小时内发热，多在38.5度以下，持续数日至一周不等； 5. 体征：消瘦，左锁骨上凹淋巴结肿大、上腹包块者多见于胃癌；蜘蛛痣、脾大、腹水者多见于门脉高压胃底食管静脉曲张破裂；黄疸、胆囊肿大、剧烈上腹痛，呕血呈条状血块，提示肝外型胆道出血；皮肤粘膜出血提示有全身性疾病，如皮肤粘膜尤其颜面、上肢皮肤及口腔、鼻咽部粘膜有毛细血管扩张和毛细血管瘤，见于遗传性出血性毛细血管扩张症。根据患者体征，故考虑为上消化道出血。

上消化道出血病因，胃镜直接观察，即能确定，并可根据病灶情况作相应的止血治疗。做纤维胃镜检查注意事项有以下几点：①胃镜检查的最好时机在出血后24~48小时内进行。②处于失血性休克的病人，应首先补充血容量，待血压有所平稳后做胃镜较为安全。③事先一般不必洗胃准备，但若出血过多，估计血块会影响观察时，可用冰水洗胃后进行检查。

？ 上消化道出血护理措施： 1、安静卧床，保温、防止着凉或过热，一般不用热水袋保温过热可使周围血管扩张，血压下降，避免不必要的搬动，呕血时应立即将病人头偏向一侧，以免血液呛入气管而造成窒息。 2、给予精神安慰，解除病人恐惧心理。 3、立即建立一条静脉通路，同时争取时间尽快用9号针头进行输液。开始输液宜快，一般用生理盐水，林格氏液加乳酸钠，低分子右旋糖酐或其他血浆代用品，同时做好血交错试验，准备输血，输血量及速度，可依据出血的程度而定。如进行加压输血时，护士应密切守护，严防输血终了，空气随之进入血管造成栓塞。

4、止血措施： （1）按医嘱给止血药，如6-氨基乙酸加入10%Glucose中经静脉滴入等。

（2）食管曲张破裂出血，用垂体后叶素时，稀释后应缓慢静脉注射或静脉输入，速度不宜过快，以防出现副作用（对高血压、冠心病及孕妇忌用）。用三腔管压迫止血时，其护理参见三腔管的应用。 （3）冰盐水洗胃法：用特制有两个口的胃管插入胃内（无特制管可用普通胃管，肝硬化病人用三腔管即可）。用50ml注射器向胃管内缓慢注入0-4℃生理盐水，而从另一开口吸引，反复进行持续灌洗，用水量根据病情而定，一般用水量为10,000ml左右，30分钟使胃内温度下降，起到止血作用。

（4）在500ml生理盐水中，加去甲肾上腺素10-20mg，经胃管缓慢滴入，如能口服者，可每2h口服50ml，以降低门静脉压，从而对食管胃底静脉曲张破裂出血产生止血效果，但对有动脉硬化者应慎用。 （5）如在紧急情况下，进行纤维胃镜检查者，应做好术前准备。 5、饮食护理，在呕血、恶心、呕吐和休克的情况下应禁食。待上述症状缓解后，溃疡病病人应给牛奶、蛋糕或豆浆等富于蛋白质的流质饮食，以后再改变饮食种类和增加食量，食管下端静脉曲张破裂出血病人的饮食，应根据其肝功能障碍程度予以调节，下三腔管的病人，出血停止24h后从胃管内注入流质饮食，有意识障碍的病人，应给予无蛋白质饮食，有腹水者，应适当限制钠盐摄入。 6、做好口腔和皮肤的护理，因出血病人口腔有腥臭味，应每日三次清洗口腔。浮肿病人应加强皮肤护理，防止发生褥疮。 7、严密观察病情： （1）注意测量体温、脉搏、血压的变化，如发热者，可给物理降温，记录24h出入水量，尿比重。 （2）注意呕吐物及粪便的性状，量及颜色，呕血及便血的颜色，取决于出血量的多少及血在消化道内停留的时间，如出血量多，停留的时间短，颜色新鲜或有血块，出血量少，停留时间长则颜色比较暗或黑色，伴有呕吐者，一般比单纯黑便者出血量大，当病人出现口渴、烦躁，出冷汗、黑朦、晕厥等症状时，应考虑有新鲜出血。

（3）如有了血性休克，可按休克病人常规护理。如出现意识朦胧或烦躁不安时，应置床档，防止坠床。 （4）上消化道大量出血后，由于血液中蛋白的分解产物在肠内吸收，易引起氮质血症。因此肝硬化病人应按医嘱认真做好灌肠内积血，以减少氨的产生和吸收。 （5）门V高压引起的食道胃底静脉曲张破裂出血的病人，应密切观察昏迷的前驱症状，早期治疗是非常重要的，如出现肝昏迷，按昏迷病人常规护理。

非曲张静脉上消化道大量出血的止血措施 （1）凝血酶（Thrombin）500U~20000U，1~6小时1次，

口服或经内镜给药。此外，用药时应给与H₂RA或PPI等抑制胃酸分泌药。(2)抑制胃酸分泌药奥美拉唑(洛赛克)首量80mg静脉注射后以40mg,每12小时1次静脉滴注,一般3~5日1疗程。(3)立止血(reptilase)1~2U日2次,急性出血静脉注射,非急性出血肌肉注射。(4)内镜下高频电凝、钳夹止血法(5)介入治疗 严重消化道大量出血在既无法进行内镜治疗,不能耐受手术时,可采用选择性肠系膜动脉造影找到出血灶并同时进行血管栓塞治疗。故选择D答案。

上消化道大出血的临床表现有:(1)出血与黑粪:是上消化道出血的特征性表现。出血部位在幽门以上者常有呕血和黑粪,在幽门以下者常仅表现为黑粪。呕血与黑粪的颜色、性状与出血量和速度有关。呕血呈鲜红色提示出血量大且速度快;如呕血呈棕褐色咖啡渣样,则表明血液在胃内停留时间长。柏油样黑粪,黏稠而发亮,是因血红蛋白中铁与肠内硫化物作用形成硫化铁所致;粪便呈暗红甚至鲜红色,提示出血量大且速度快,血液在肠内推进快,须与下消化道出血鉴别。(2)出血性周围循环衰竭:出血时,循环血容量急剧减少,导致心排血量降低,病人可出现头晕、心悸、乏力、出汗、口渴等组织缺血的表现。出血量大时病人可出现低血容量休克。(3)发热:大量出血后,多数病人在24h内出现发热,一般不超过38.5°C,可持续3~5d。发热可能与循环血容量减少,急性周围循环衰竭,导致体温调节中枢功能障碍有关。(4)氮质血症:可分为肠源性、肾前性和肾性氮质血症。上消化道大量出血后,肠道中血液的蛋白质消化产物被吸收,引起血中尿素氮增高,称为肠性氮质血症。血尿素氮多在一次出血后数小时上升,24~48h达到高峰,3~4d恢复正常,如病人血尿素氮持续增高超过3~4d,而血容量已基本纠正且出血前肾功能正常,则提示上消化道继续出血或有再次出血。出血导致周围循环衰竭,使肾血流量和肾小球滤过率减少,致氮质潴留,是血尿素氮增高的肾前性因素。如无活动性出血,且血容量已基本补足而血尿素氮仍高,尿量仍少,则有急性肾衰竭的可能。(5)血象改变:大量出血后,均有急性失血性贫血的表现。

21、C

22、E

【解析】(1)肝性脑病的诱发因素包括:①消化道出血;②感染;③低钾性碱中毒:大量放腹水;④摄入大量高蛋白质饮食;⑤低血容量与缺氧;⑥大量饮酒、大手术、麻醉、安眠药等可诱发肝性脑病;⑦其他:如便秘、低血糖等。故选B。解题关键:大部分肝性脑病是由各型肝硬化(病毒性肝炎肝硬化最多见)和门体分流手术引起。(2)肝性脑病治疗包括:①减少肠内毒素的生成和吸收:开始数天内禁食蛋白质;灌肠或导泻(清除肠内的积食、积血或其他含氮物),可用生理盐水或弱酸性溶液灌肠。抑制肠道细菌生长(口服新霉素)。②促进有毒物质的代谢清除:谷氨酸钾和谷氨酸钠可与氨结合生成谷氨酰胺而降低血氨。③对症治疗。④其他治疗。故选E。解题关键:氨中毒是肝性脑病的主要原因,因此减少氨的吸收和加强氨的排出是药物治疗的主要手段。(3)乳果糖口服后在结肠内被乳酸菌、厌氧菌等分解为乳酸和醋酸,降低结肠pH,使肠腔呈酸性,从而减少氨的形成与吸收;乳果糖剂量30ml,每日3~4次口服,也可鼻饲。故选D。解题关键:乳果糖的主要作用是降低结肠pH。

23、E

24、A

25、A

26、B

27、E

28、C

29、A

30、E

【解析】通过温水浸泡能达到消炎、镇痛、清洁、消毒创口的目的，用于手、足、前臂、小腿部感染。

31、D

32、E

33、E

34、D

35、D

【解析】脊髓损伤分为脊髓震荡、脊髓休克、不完全性脊髓损伤、完全性脊髓损伤、脊髓圆锥综合征、马尾损伤，都与椎体骨折几乎同时发生。该患者在发生骨折15分钟后才逐渐瘫痪并加重，应该是血肿增大，逐渐压迫导致的。故选D。解题关键：血肿增大致脊髓受压不与骨折同步。

36、A

37、D

38、A

39、A

40、E

【解析】肾切除术后一般需平卧2~3日，如无腹胀、能进食，可以逐步下床活动。如施行肾部分切除，肾修补，肾固定等手术，术后必须绝对卧床14天，以免影响手术效果。故答案为E。

41、E

【解析】1. 少量积液体检时可无异常发现。中等量或以上的积液可有以下体征：视诊：患侧胸廓饱满、肋间隙增宽、呼吸运动受限，腹式呼吸运动增强。触诊：气管移向健侧，患侧呼吸运动减弱，语音震颤减弱或消失。叩诊：积液区为浊音或实音。听诊：积液区呼吸音减弱或消失，语音共振减弱或消失。积液上方可闻及减弱的支气管呼吸音。故选D。解题关键：积液区呼吸音减弱或消失，不能闻及湿啰音。

2. 当机体患病时，由于病痛的困扰，特别是当疾病发展到一定程度时，就会出现一些特征性的面容与表情。急性面容表现为面色潮红、兴奋不安，鼻翼扇动，口唇疱疹，表情痛苦。多见于许多急性热病，如高烧、肺炎、疟疾、流行性脑脊髓膜炎等。故选C。解题关键：急性面容通常由于疼痛而致表情痛苦。

3. 白细胞的正常范围：成人 $(4.0\sim 10.0)\times 10^9/L$ ；儿童 $(5.0\sim 12.0)\times 10^9/L$ ；新生儿 $(15.0\sim 20.0)\times 10^9/L$ 。因为化脓性胸膜炎是细菌性感染，所以白细胞总数肯定会增多。故选E。解题关键：化脓性胸膜炎胸水白细胞升高。

42、A

【解析】最常用、最可靠的确诊方法是分段刮宫。

43、C

44、D

45、E

【解析】妊娠合并糖尿病的治疗饮食控制很重要，首选药物是胰岛素，禁用磺脲类降糖药，终止妊娠前需促进胎肺成熟，预防新生儿呼吸困难窘迫综合征。分娩期、产褥期应严密监测血糖，减少胰岛素的用量。

46、D

47、B

48、B

【解析】根据化学消毒剂的使用方式,可集中归纳为3类: (1)用消毒剂溶液进行浸泡、擦拭、喷洒或气溶胶喷雾消毒。多数消毒剂可用此种方式。(2)用消毒剂气体或烟雾进行熏蒸。杂环类气体消毒剂、甲醛、过氧乙酸及含氯消毒剂及其复方等可用此种方式。(3)直接用药物粉剂处理。主要为含氯消毒剂。故干烤法不属于化学讲消毒剂的使用方法。

49、C

50、B

【解析】【考点】药物避孕**【精析】**短效口服避孕药从月经来潮的第5天起，每晚1片，连服22日，不能间断，若漏服应在12小时内补服1片。故本题应选B。**【避错】**考生可以根据短效口服避孕药的作用机制改变子宫内膜形态和功能出发来记忆，一般子宫内膜增生期的开始是从月经周期的第5天开始的。

护师（初级）考试试卷(三)

(考试时间90分钟,总分100分)

准考证号: _____ 姓名: _____

一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- () 1、小儿肺炎时，室内最适宜的温湿度是
- A、18~20℃，60%
 - B、20~22℃，70%以上
 - C、22~24℃，40%
 - D、22~24℃，30%
 - E、18~20℃，50%
- () 2、少女，14岁初潮。主诉月经期出现下腹痉挛性疼痛且向大腿内侧放射，伴有恶心、呕吐、面色苍白，出冷汗，需服止痛药和卧床休息才能缓解。行肛门检查和盆腔B超检查，无异常表现。该病例初步考虑是
- A、原发性痛经
 - B、继发性痛经
 - C、子宫发育不良
 - D、子宫内膜异位症
 - E、子宫腺肌症
- () 3、韩先生，58岁。在火灾中重度烧伤，左上肢Ⅲ度烧伤，头、面、颈部浅Ⅱ度至深Ⅱ度烧伤，右上肢红斑改变。P145次/分，BP75/50mmHg，患者意识模糊，四肢湿冷。下列哪项是补液有效最重要的监测指标
- A、脉搏和血压
 - B、每小时尿量
 - C、中心静脉压
 - D、患者神志
 - E、肢体末梢循环
- () 4、医疗机构从业人员行为规范是什么时候发布实施的 ()
- A、2011年5月26日
 - B、2012年5月26日
 - C、2011年6月26日
 - D、2012年6月26日

E、2013年1月26日

- () 5、对非语言性沟通理解正确的是
- A、非语言性沟通都是无声的
 - B、在交流过程中，非语言沟通不起关键作用
 - C、非语言性沟通都是无意识的
 - D、非语言性沟通都是有意识的
 - E、非语言性沟通可以有声的
- () 6、作结核菌素试验的主要目的是
- A、判断结核有无活动性
 - B、测定人体是否受过结核菌感染
 - C、增强机体对结核菌的免疫力
 - D、明确肺结核患者是否需隔离治疗
 - E、诊断是否患有肺结核
- () 7、陈先生，75岁。因慢性阻塞性肺气肿合并肺部感染入院治疗，护士遵医嘱给予输液治疗。输液过程中患者擅自将滴速调至70滴 / 分，1小时后患者出现胸闷、呼吸困难、咳嗽、咯粉红色泡沫样痰。
- 针对上述表现，考虑该患者可能出现
- A、发热反应
 - B、过敏反应
 - C、空气栓塞
 - D、急性肺水肿
 - E、心肌梗死
- () 8、前列腺增生发生排尿困难的程度主要决定于
- A、前列腺的大小
 - B、病人年龄
 - C、增生的部位
 - D、是否癌变
 - E、是否钙化
- () 9、原发性肝癌肝外血性转移最多见于
- A、骨
 - B、脑
 - C、肺
 - D、胃

E、胰腺

() 10、伤后出现脑受压症状的是

A、颅前窝骨折

B、颅中窝骨折

C、颅盖凹陷骨折

D、颅后窝骨折

E、颅盖线形骨折

() 11、患者男，49岁。突然神志丧失，呼吸不规则，即刻进行心肺复苏，判断心脏按压是否有效的主要方法是

A、测血压

B、呼喊患者看其是否清醒

C、触及桡动脉搏动

D、触及颈动脉搏动

E、胸部起伏

() 12、下列哪项是消化性溃疡最常见的并发症

A、出血

B、穿孔

C、幽门梗阻

D、癌变

E、感染

() 13、患者男，40岁。2小时前吃完午饭后打篮球时出现腹部剧烈疼痛，呈持续性，腹胀，呕吐宿食，含少量血性液体，口渴，烦躁不安，中腹部可扪及压痛包块，移动性浊音阳性，肠鸣音减弱，血常规：WBC $15.4 \times 10^9 / L$ ，发病以来未排便排气。

该患者目前主要的护理问题是

A、排便困难

B、活动无耐力

C、皮肤完整性受损

D、个人应对无效

E、体液不足

() 14、二尖瓣狭窄伴心房颤动的患者，其左心房血栓脱落时，最常栓塞的部位是

A、脑

B、肾

- C、冠状动脉
 - D、脾
 - E、肠系膜动脉
- () 15、符合脾破裂的检验结果是
- A、甲胎蛋白阳性
 - B、血清总胆红素升高
 - C、腹部穿刺抽出不凝血
 - D、血肌酐升高
 - E、血清PSA增加
- () 16、周先生，58岁。无痛性全程肉眼血尿半个月，B超检查发现肾脏有5cm×6cm大小实质性占位。
术后监测24小时尿量的主要目的是
- A、为了观察患者术后是否平稳
 - B、为了监测患者的肝功能
 - C、为了监测患者的肾功能
 - D、为了观察患者的有无出血
 - E、为了监测患者的心脏功能
- () 17、中暑衰竭患者的主要表现是
- A、剧烈头痛
 - B、肺水肿
 - C、脑水肿
 - D、高热
 - E、周围循环衰竭
- () 18、某学生登山时不慎扭伤踝关节，1小时后来到了医务室就诊，正确的处理方法是
- A、热敷
 - B、冷敷
 - C、冷热敷交替使用
 - D、热水足浴
 - E、夹板固定
- () 19、张女士，42岁。计划输液1500ml，滴速约为50滴 / 分（输液器滴系数为15），上午8时开始，预计何时输液完成
- A、下午1时30分
 - B、下午2时15分

- C、下午2时30分
- D、下午3时15分
- E、下午3时30分
- () 20、甲状腺大部切除术后一回到病房，护士就要求病人回答问题，目的是为了评估其有无
- A、意识障碍
- B、神经损伤
- C、麻醉清醒
- D、记忆受损
- E、痰液阻塞
- () 21、下列避孕方法中失败率较高的是
- A、放置宫内节育器
- B、按期口服避孕药
- C、使用避孕套
- D、避孕针
- E、安全期避孕
- () 22、足月臀位产儿，生后即不安，前囟饱满，唇微发绀，双肺呼吸音清，心率128次/分，血清钙 2.5mmol/L ，最可能的诊断是
- A、维生素D缺乏性手足抽搐症
- B、化脓性脑膜炎
- C、新生儿败血症
- D、新生儿颅内出血
- E、感染性肺炎
- () 23、患者女，26岁。产后4周。母乳喂养。1天前出现右乳胀痛，伴畏寒，发热，白细胞计数为 $13\times 10^9/L$ 。其感染的致病菌最可能是
- A、金黄色葡萄球菌
- B、溶血性链球菌
- C、大肠埃希菌
- D、无芽胞厌氧菌
- E、白色念珠菌
- () 24、执行床边隔离的软组织化脓性感染是
- A、疖
- B、痈

- C、丹毒
- D、急性淋巴管炎
- E、急性蜂窝织炎

() 25、按新九分法计算双上肢表面积是

- A、46%
- B、18%
- C、37%
- D、27%
- E、9%

() 26、患儿，女，2岁，运动发育落后，自主运动不协调，下肢肌张力增高，抱起时双腿交叉呈剪刀样，最有可能的诊断是

- A、脑性瘫痪
- B、癫痫局限性发作
- C、癫痫小发作
- D、癫痫大发作
- E、注意力缺陷多动症

() 27、侵蚀性葡萄胎转移患者的护理不恰当的是

- A、阴道转移时注意观察阴道有无破溃出血
- B、肺转移患者注意遵医嘱给镇静剂
- C、脑转移患者注意观察生命体征
- D、阴道转移时注意观察阴道有无排液
- E、肺转移患者注意大咯血时防窒息

() 28、使用人工呼吸机时，每分钟通气量应调节为

- A、4~6L/min
- B、6~8L/min
- C、8~10L/min
- D、10~12L/min
- E、12~14L/min

() 29、患者徐某，64岁，患糖尿病10年，常规进行胰岛素6U，餐前30min，H，tid。

选择合适的注射部位是

- A、臀中、小肌
- B、臀大肌

- C、腹部
 - D、股外侧肌
 - E、前臂外侧
- () 30、有里急后重者多由何病引起
- A、食管炎
 - B、急性胃炎
 - C、肠结核
 - D、直肠癌
 - E、甲亢
- () 31、下列哪项是休克的病理生理基础
- A、多系统器官功能障碍或衰竭
 - B、动-静脉短路
 - C、有效循环血量锐减和组织灌注不足
 - D、心功能不全
 - E、弥散性血管内凝血
- () 32、输液中发生肺水肿时吸氧需用20%~30%的乙醇湿化。其目的是
- A、使患者呼吸道湿化
 - B、消毒吸入的氧气
 - C、使痰液易咳出
 - D、降低肺泡表面张力
 - E、降低肺泡内泡沫表面张力
- () 33、休克病人微循环衰竭期典型的临床表现是
- A、表情淡漠，皮肤苍白
 - B、尿量减少
 - C、血压下降
 - D、脉搏增快
 - E、弥散性血管内凝血
- () 34、法洛四联症的主要临床特点不包括
- A、肺动脉狭窄
 - B、室间隔缺损
 - C、主动脉骑跨

D、房间隔缺损

E、右心室肥厚

- () 35、患儿男，9岁。因水肿、少尿、肉眼血尿7天，烦躁、气促1天入院。查体：
T37.0℃，BP130/80mmHg，端坐呼吸，心率138次/分，双肺底有少量小水泡音，腹胀，肝肋下
2cm。血常规：正常；尿常规：尿蛋白(++)，红细胞20~25个/HP，白细胞0~2个/HP。
护士考虑此患儿是
- A、急性肾炎合并肺炎
- B、急性肾炎合并严重循环充血
- C、肾炎性肾病合并肺炎
- D、肾盂肾炎合并肺炎
- E、慢性肾炎急性发作
- () 36、烧伤患者，女性，24岁，烧伤面积50%，伤后8h入院，转送过程中输液1250ml，入院测
BP10.7/6kPa(80/50mmHg)，尿量20ml/h，四肢厥冷、呼吸急促，以上征象提示
- A、肾功能不全
- B、心功能不全
- C、血容量不足
- D、肺功能不全
- E、以上都不是
- () 37、高热病人可选用
- A、热水坐浴
- B、红外线照射
- C、冰槽
- D、热水袋
- E、冰袋
- () 38、立即
- A、st
- B、ID
- C、sos
- D、bid
- E、qd
- () 39、下列哪项是食物消化和吸收的主要部位
- A、胃
- B、小肠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/856214010221010143>