

2024 河北省唐县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库及答案 (新)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 主要对成本进行量化分析、也同时考虑效果，用于两种或多种药物治疗方案的选择是指

- A: 成本-效用分析
- B: 成本-效益分析
- C: 最大效果分析
- D: 最小成本分析

答案: D

2. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度轻度贫血为

- A: 30~60g / L
- B: 90~120g / L
- C: 120~160g / L
- D: 60~90g / L

答案: B

3. 口服氯化铵用于解救的是 ()

- A: 硝西泮中毒
- B: 瘦肉精中毒
- C: 苯丙胺中毒
- D: 氯丙嗪中毒

答案: C

4. 药师在接受护士用药咨询时，应重点关注的内容是

- A: 药品的生产厂商和批号
- B: 药物制剂的等效性
- C: 注射剂的配制和滴注速度等
- D: 药品经济学知识

答案：C

5. 成人白细胞计数（WBC）的正常参考区间是

- A: $(5.0 \sim 10.0) \times 10^9 / L$
- B: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9 / L$
- C: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9 / L$
- D: $(5.0 \sim 12.0) \times 10^9 / L$

答案：C

6. 普通处方一般不得超过几日用量

- A: 7
- B: 5
- C: 1
- D: 3

答案：A

7. （2015 年真题）伴有高血压的患者应慎用的是（ ）。

- A: 氯苯那敏
- B: 阿司匹林
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 含伪麻黄碱的复方制剂

答案：D

8. 麻醉药品、第一类精神药品处方的前记中，必须添加的项目是

- A: 临床诊断
- B: 患者姓名、性别
- C: 患者身份证明编号
- D: 药品名称、剂型、规格、数量

答案：C

9. 硫脲类最严重的不良反应是

- A: 粒细胞缺乏
- B: 中枢抑制
- C: 甲状腺功能亢进
- D: 甲状腺功能低下

答案：A

10. 对半衰期短的药物，为了减少血药浓度波动可采取的方法是()

- A: 延长给药间隔
- B: 增加给药剂量
- C: 缩短给药间隔的同时减少单剂量
- D: 减少给药剂量

答案：C

11. 患者，女，72岁，有青霉素过敏史，主诉尿痛、尿频。尿常规检查示大量白细胞，尿细菌数 $>10^5$ cfu/ml。诊断为急性膀胱炎。应选用的药物是

- A: 阿奇霉素片
- B: 阿莫西林胶囊
- C: 莫西沙星片

D: 复方磺胺甲噁唑片

答案: D

12. 属于公众用药咨询的是

A: 栓剂、气雾剂的正确使用方法

B: 减肥、补钙、补充营养素

C: 抗菌药物的合理应用

D: 注射剂溶媒的正确选择

答案: B

13. 女，37 岁，前来药店购买退热药，药师应进行的咨询与指导，错误的是

A: 顾客告知自己母亲 72 岁，有慢阻肺病史，昨日出现头痛、肌肉酸痛、咽痛、咳嗽，前来替母亲购药，药师应建议顾客带家属就医，不宜自我药疗

B: 如果得知顾客为本人购药，且已经服用过对乙酰氨基酚 3 日，症状未缓解，药师可建议患者联合服用布洛芬口服液

C: 如果顾客购买对乙酰氨基酚口服液，应告知患者 3 天后症状未缓解需及时就医

D: 若经过咨询得知顾客是为家里 3 岁女儿购买，不应推荐阿司匹林

答案: B

14. 氯喹与伯氨喹合用

A: 诱发癫痫

B: 引起心脏房室传导阻滞

C: 加重神经肌肉接头抑制作用

D: 根治间日疟

答案: D

15. 处方中“餐后给药”的外文缩写是

A: Ac

B: po

C: pc

D: qn

答案：C

16. 控制心室率的药物是

A: 达比加群酯

B: 氯吡格雷

C: 美托洛尔

D: 胺碘酮

答案：C

17. 主要不良反应为锥体外系反应的是

A: 多潘立酮

B: 莫沙必利

C: 甲氧氯普胺

D: 西沙必利

答案：C

18. 可升高血细胞，用于化疗所致的中性粒细胞减少症的是

A: 维生素 B12

B: 非格司亭

C: 重组人促红素

D: 硫酸亚铁

答案：B

19. 患者，女，39 岁，有哮喘病史。1 天前因发热服用阿司匹林 250mg，用药后 30 分钟哮喘严重发作，大汗、发绀、强迫坐位。

- A: 这是由于发热引发了哮喘
- B: 可用肾上腺素治疗
- C: 这是阿司匹林中毒的表现
- D: 这是由于阿司匹林诱发了哮喘

答案：D

20. (2017 年真题) 抗结核联合治疗方案中可出现橘红色尿的药物是 ()

- A: 利福平
- B: 吡嗪酰胺
- C: 左氧氟沙星
- D: 乙胺丁醇

答案：A

21. 以下血浆脂质水平检查结果中，不能判断为高脂血症的是

- A: 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-ch)高于同年龄正常值
- B: 总胆固醇(Tc)高于同年龄正常值
- C: 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-ch)高于同年龄正常值
- D: 三酰甘油(TG)高于同年龄正常值

答案：D

22. 轻度支气管哮喘疾病的临床表现为

- A: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率>30 次/分，常有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常>120 次/分，奇脉，PaO₂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失

C: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常

D: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉

答案：C

23. 可影响幼儿软骨发育，导致承重关节损伤的药物是

A: 米诺环素

B: 诺氟沙星

C: 阿米卡星

D: 头孢唑林

答案：B

24. 药库接受了一批药品，其中需要在冷处贮存的是

A: 硫普罗宁片

B: 西地碘片

C: 双歧三联活菌胶囊

D: 乳酶生片

答案：C

25. COPD 气流受限严重程度分级的方法是

A: FEV1 占预计值%

B: CHA, DS, -VAsE 评分

C: HAS-BLED 评分

D: CTP 分级

答案：A

26. 对于 ACEI 类药描述错误的是

- A: 抑制血管紧张素转化酶(ACE)活性
- B: 抑制交感神经活性作用
- C: 明显降低全身血管阻力
- D: 唯一的抑制心肌及血管重构药物

答案：B

27. 可出现体位性低血压的是

- A: 苯二氮
- B: 哌替啶
- C: 双嘧达莫
- D: 甲氧氯普胺

答案：C

28. 起效较慢，需要 3 个月才可以改善由前列腺增生所导致的尿路梗阻，减少残余尿量的 5 α 还原酶抑制剂是

- A: 氟伏沙明
- B: 非那雄胺
- C: 阿夫唑嗪
- D: 特拉唑嗪

答案：B

29. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 分泌性腹泻

B: 消化不良性腹泻

C: 动力性腹泻

D: 感染性腹泻

答案：D

30. 患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是()

A: 氢化可的松软膏

B: 联苯苄唑软膏

C: 复方苯甲酸软膏

D: 酮康唑软膏

答案：A

31. 患者，女，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见 WBC $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

B: 首选针对革兰阳性菌的药物

C: 选用肾毒性小、不良反应少的抗菌药物

D: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄西林

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

32. 在消化性溃疡形成中起到关键作用的因素为（）

A: 胃酸

B: 胃黏膜血流减少

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: H. pylori 感染

D: 胃黏膜屏障的完整性

答案：A

33. (2021 年真题) 患者,男,52 岁支气管哮喘病史 10 年。因间断喘息发作,长期自行服用泼尼松片 20mgq

A: 骨质疏松

B: 低血压

C: 消化性溃疡

D: 该患者可能出现的不良反应中,不包括的是 ()

答案：D

34. 患者,男,身高 180cm,体重 90kg,腰围 100cm,其体重指数(BMI)是 ()

A: 27.8

B: 30.2

C: 20

D: 18

答案：A

35. 抗抑郁药物的合理使用适合治疗伴有焦虑症的抑郁患者的药物是

A: 丙米嗪

B: 氟伏沙明

C: 帕罗西汀

D: 阿米替林

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

36. 各调剂部门每天下班（或交班）前，管理人员应核对药品和相关记录，实施的是

- A: 防盗设施
- B: 基数卡
- C: 印鉴卡
- D: 五专管理

答案：D

37. 轻微的反应或疾病、症状不发展、一般无需治疗，应判为

- A: 重度
- B: 中度
- C: 弱轻度
- D: 轻度

答案：D

38. 苯溴马隆为促进尿酸排泄的药物，在痛风急性期不宜服用，以防止发生转移性痛风。在治疗期间，不能与下列药物同时使用的是

- A: 碳酸氢钠
- B: 阿司匹林
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

答案：B

39. 可致直立性低血压的抗焦虑药物为（）

- A: 丁螺环酮
- B: 氟西汀
- C: 阿米替林
- D: 劳拉西泮

答案：C

40. 服用磺胺甲噁唑时

- A: 宜少饮水
- B: 忌用热水送服
- C: 禁吸烟
- D: 宜多饮水

答案：D

41. 严重肝功能减退病人常伴功能性肾功能不全，以致使"经肝肾两种途径清除"的药物的血药浓度很高，因此用药原则是

- A: 须谨慎使用，必要时减量给药
- B: 必须减量应用
- C: 尽可能避免使用
- D: 一般无须调整剂量

答案：B

42. 针对严重单纯急性酒精中毒同时出现烦躁不安症状的患者，下列救治措施中错误的是（）

- A: 肌内注射维生素 B1、维生素 B6 和烟酸各 100mg
- B: 静脉滴注维生素 C 注射液 1g
- C: 静脉注射 50%葡萄糖注射液 100ml 和胰岛素 20U
- D: 静脉注射纳洛酮 0.4mg 和吗啡 20mg

答案：D

43. 过敏性皮炎常表现为（）

- A: 中性粒细胞增多
- B: 红细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 血红蛋白减少

答案: C

44. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

A: 受精后 1 周至 3 个月

B: 受精后 3 周至 2 个月

C: 受精后 2 周至 3 个月

D: 受精后 3 周至 3 个月

答案: D

45. 药物相互作用是双向的，既可能产生对患者有益的结果，使疗效协同或毒性降低；也可能产生对患者有害的结果，使疗效降低和毒性增强，有时会带来严重后果，甚至危及生命。

A: 阿托品联用普萘洛尔

B: 铁剂联用维生素

C: 阿托品联用吗啡

D: 山莨菪碱联用哌替啶

答案: D

46. 患者，女，27 岁，2 年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血 T₃、T₄ 及 TSH 检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 不含碘的食用盐

B: 海带

C: 虾皮

D: 紫菜

答案：A

47. 饮酒过多可致死亡，所以乙醇浓度危及生命最低限是

A: 0.35%~0.4%

B: 0.25%~0.3%

C: 0.2%~0.25%

D: 0.15%~0.2%

答案：A

48. 防心绞痛药物

A: 胃黏膜保护剂

B: 去氨加压素

C: 甘草合剂

D: 硝酸甘油

答案：D

49. 拓扑异构酶抑制剂

A: 依托泊苷

B: 培美曲塞

C: 放线菌

D: 顺铂

答案：A

50. 脑梗死的治疗药物，抗凝治疗

A: 普通肝素

B: 阿替普酶

C: 阿司匹林

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 甘露醇

答案：A

51. 一旦血肌酐升幅大于 30%~50% 应

A: 给予硫酸亚铁

B: 联用他汀类

C: 停用 ACEI 或减量

D: 慎用甲基多巴

答案：C

52. 使用消化性溃疡治疗药物的注意事项, 因长期应用可导致腹泻或便秘的药物是

A: 丙谷胺

B: 硫糖铝

C: 铝碳酸镁

D: 铋剂

答案：C

53. 在人体血中白细胞群体中, 中性粒细胞 (DC) 的正常比例范围是

A: 0.03-0.08

B: 0.01-0.05

C: 0.20~0.40

D: 0.50~0.70

答案：D

54. 对多数药品而言, 贮藏环境与药品保管的关系是

A: 在 8℃ 以上时, 温度越低, 对保管越有利

B: 在 0℃ 以下时, 温度越低, 对保管越有利

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 在 10℃ 以上时，温度越低，对保管越有利

D: 在 2℃ 以上时，温度越低，对保管越有利

答案：D

55. 一般给予肠外营养物质的热氮比为

A: 100kcal: 1gN

B: NPC7: 3

C: NPC5: 5

D: 150kcal: 1gN

答案：D

56. 能刺激骨骼、肌肉和组织的生长发育的是

A: 利尿剂

B: 肽激素类

C: 麻醉药品

D: 蛋白同化制剂

答案：B

57. 患者，男，62 岁，糖尿病病史 7 年，长期使用胰岛素、二甲双胍治疗，近期为控制血压加服治疗药物，该患者不宜应用的药物是

A: 洛伐他汀

B: 卡托普利

C: 氢氯噻嗪

D: 普萘洛尔

答案：D

58. 中度药品不良反应是指

A: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

B: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无须治疗

C: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

D: 没有临床症状，无须治疗

答案：A

59. 左旋多巴可引起

A: 听神经障碍

B: 锥体外系反应

C: 癫痫发作

D: 再生障碍性贫血

答案：B

60. 对于铁剂的使用，错误的是

A: 钙剂可促进铁剂吸收？

B: 口服铁剂宜选用 2 价铁？

C: 为了补足储存铁，铁剂治疗应该在 Hb 正常后至少再补充铁剂 4~6 个月？

D: 口服铁剂是治疗缺铁性贫血的首选方法？

答案：A

61. 适宜睡前服用，用于抑制“酸突破现象”的抑酸剂是

A: 铝碳酸镁

B: 法莫替丁

C: 硫糖铝

D: 乳酸菌素

答案：B

62. 在治疗痛风时，应用尿酸药过程中，应多饮水，一日尿量宜保持在

- A: 1500ml 以上
- B: 500ml 以上
- C: 2000ml 以上
- D: 1000ml 以上

答案：C

63. 铁剂与维生素 C 联用增效的机制是

- A: 作用于不同的靶点
- B: 竞争性拮抗作用
- C: 促进机体的利用
- D: 延缓或降低抗药性

答案：C

64. (2018 年真题) 可引起嗜酸性粒细胞增多的药物是 ()

- A: 碳酸氢钠
- B: 氯苯那敏
- C: 坎地沙坦
- D: 头孢氨苄

答案：D

65. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛；查体：T38℃，肾区叩击痛；血常规见 WBC15X10⁹ / L，中性粒细胞百分比 85%，尿常规见尿液混浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高
- B: 选用肾毒性小、不良反应少的抗菌药物
- C: 首选针对革兰阳性菌的药物

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素

答案：C

66. 患胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者宜选用的药物是

A: 可待因

B: 羧甲司坦

C: 右美沙芬

D: 喷托维林

答案：A

67. 以健康受试者进行初步的临床药理学及人体安全性评价是指

A: I 期临床试验

B: 临床预试验

C: II 期临床试验

D: III 期临床试验

答案：A

68. 合并三度房室传导阻滞的高血压患者不宜选用

A: 多沙唑嗪

B: 维拉帕米

C: 卡托普利

D: 哌唑嗪

答案：B

69. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

A: 对乙酰氨基酚片

- B: 双嘧达莫片
- C: 华法林片
- D: 氯吡格雷片

答案：D

70. 抗氧化，减少再灌注期氧自由基的产生

- A: 阿司匹林
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱
- D: 丙磺舒

答案：B

71. 属于抗胆碱药的是

- A: 恩托卡朋
- B: 普拉克索
- C: 司来吉兰
- D: 苯海索

答案：D

72. 可引起血清尿素氮增高的是

- A: 肾衰竭
- B: 急性胰腺炎
- C: 严重肝病
- D: 胃溃疡

答案：A

73. 患者男，34 岁因糖尿病酮症酸中毒入院，需静脉给予胰岛素或胰岛素类似物，应选用的药物是（）

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 精蛋白锌胰岛素
- B: 低精蛋白锌胰岛素
- C: 普通胰岛素
- D: 门冬胰岛素

答案：C

74. 使用硫酸亚铁片治疗缺铁性贫血，元素铁的治疗量是

- A: 60mg tid
- B: 100mg/次
- C: 60mg qd
- D: 60mg bid

答案：A

75. 用于房颤时控制心室率的药物是

- A: 维拉帕米
- B: 胺碘酮
- C: 卡托普利
- D: 缬沙坦

答案：A

76. 肠外营养液中 1g 葡萄糖能提供的热量是

- A: 9kcal
- B: 4kcal
- C: 7kcal
- D: 3kcal

答案：B

77. 大剂量或连续使用顺铂可导致

- A: 不可逆性肾小管坏死
- B: 肾小管阻塞
- C: 肾间质纤维化
- D: 直接肾毒性

答案：A

78. 尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物，正常人每日排出尿液 1000~3000ml。其中 97% 为水分，而在 3% 的固体物质中，主要含有两大类物质：有机物（尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物）和无机物（氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等）。

- A: 组织性蛋白尿
- B: 肾小管性蛋白尿
- C: 肾毒性蛋白尿
- D: 溢出性蛋白尿

答案：C

79. 关于透析患者使用磷结合剂的下列叙述错误的是

- A: 透析患者服用钙剂必须在进食的同时服用
- B: 高磷血症会导致心脏、血管的钙化
- C: 透析患者服用钙剂的量大时易出现高钙血症
- D: 透析患者服用磷结合剂的钙剂目的是为了补钙

答案：D

80. 沟通的时间不宜过长，提供的信息不宜过多

- A: 注意掌握时间
- B: 关注特殊人群
- C: 认真聆听
- D: 注意语言的表达

答案：A

81. 用药期间尿液可呈橘红色的抗结核药是

- A: 吡嗪酰胺
- B: 利福平
- C: 乙胺丁醇
- D: 链霉素

答案：B

82. (2019 年真题) 患者，男，65 岁，因咳嗽、咳大量脓痰、呼吸困难入院，诊断为慢性阻塞性肺病急性加重。该患者临床治疗不应选用的药物是

- A: 氨溴索
- B: 右美沙芬
- C: 羧甲司坦
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：B

83. 患者，女，85 岁，既往有高血压病史，慢性心力衰竭，给予地高辛每日维持量治疗，近 Et 频发室性心动过速，检测血钾值在正常范围。

- A: 胺碘酮
- B: 阿托品
- C: 苯海拉明
- D: 苯巴比妥

答案：B

84. 容易水解的药物是

- A: 牛痘菌苗

B: 胃蛋白酶

C: 青霉素类

D: 吗啡

答案：C

85. 妥布霉素可导致药源性肾病的机制是

A: 肾小球滤过率下降

B: 结晶沉积

C: 前列腺素合成障碍

D: 不可逆性肾小管坏死

答案：A

86. 与头孢曲松钠注射液混合可产生肉眼难以观测到的白色细微沉淀的注射液是

A: 乳酸钠林格注射液

B: 氯化钠注射液

C: 葡萄糖注射液

D: 葡萄糖氯化钠注射液

答案：A

87. 发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。高热是指体温范围

A: 39.1℃～41.0℃

B: 38.1℃～39.0℃

C: 37.4℃～38.0℃

D: 37.0℃～38.3℃

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/856220143054011030>