

口腔内科高级职称题-牙体硬组织非龋性疾病

- 1、关于牙本质过敏症，哪项正确（ ）
 - A. 并不是所有牙本质暴露的牙都出现敏感症状
 - B. 涂局麻药于牙本质表面能减轻症状
 - C. 刺激去除后仍痛
 - D. 是一种独立的疾病
 - E. 症状不受健康和气候的影响

- 2、下列哪种不是根折转归（ ）
 - A. 牙根外吸收
 - B. 钙化性愈合
 - C. 结缔组织性愈合
 - D. 骨、结缔组织联合愈合
 - E. 断端被慢性炎症组织分开

- 3、牙颈部脱敏最好用（ ）
 - A. 碘化银法
 - B. 氨硝酸银法
 - C. 氟化钠法
 - D. 碘酚法
 - E. 离子导入法

4、临床检查牙本质过敏症的主要方法为（ ）

- A. 温度刺激
- B. 化学刺激
- C. 探针检查牙敏感点
- D. 叩诊
- E. 视诊

5、下列哪项不是牙磨损的并发症（ ）

- A. 牙隐裂
- B. 颞下颌关节病
- C. 食物嵌塞
- D. 牙髓病
- E. 创伤性溃疡

6、关于磨牙症，正确的是（ ）

- A. 仅见于夜磨牙习惯者
- B. 不会引起牙周组织疾病
- C. 是咀嚼系统的一种功能异常运动
- D. 见于精神紧张患者
- E. 仅见于白天有无意识地磨牙习惯者

7、导致成年人牙劈裂而丧失的主要疾病是（ ）

- A. 深龋
- B. 畸形中央尖
- C. 遗传性乳光牙本质
- D. 楔状缺损
- E. 牙隐裂

8、牙隐裂最重要的临床表现是（ ）

- A. 冷刺激痛
- B. 热刺激痛
- C. 叩痛
- D. 定点性咀嚼剧痛
- E. 夜间痛

9、关于釉质钙化不良与平滑面浅龋下列说法哪项错误（ ）

- A. 前者釉质表面可见白色斑块，有光泽
- B. 前者斑块形状大小不一
- C. 后者病变可见于牙面的任何部位
- D. 后者龋斑表面无光泽
- E. 前者釉质表面完整光滑

10、牙本质过敏症最可靠的诊断方法是（ ）

- A. 电活力测定
- B. 尖锐探针在牙面上滑动
- C. 热诊
- D. 备洞试验
- E. 冷诊

11、哪种酸是最能引起牙酸蚀症（ ）

- A. 硫酸
- B. 硝酸
- C. 磷酸
- D. 盐酸
- E. 胃酸

12、关于酸蚀症，下列哪项正确（ ）

- A. 仅有牙本质感觉过敏症状
- B. 多见于喜食酸性食物者
- C. 由于酸雾或酸酐作用于牙而造成
- D. 无牙体实质缺损
- E. 可引起楔状缺损

13、以下选项中哪项不是影响牙咀嚼磨损的原因（ ）

- A. 牙的硬度

- B. 食物的硬度
- C. 咀嚼习惯
- D. 咀嚼肌张力
- E. 夜磨牙

14、浅表的隐裂,无明显症状,且牙髓活力正常者,其治疗应首选()

- A. 开髓失活
- B. 全冠修复
- C. 备洞充填
- D. 调治疗
- E. 拔除患牙

15、隐裂发生最多的牙齿是()

- A. 上颌前磨牙
- B. 下颌第一磨牙
- C. 上颌第一磨牙
- D. 下颌第二磨牙
- E. 上颌第二磨牙

16、关于楔状缺损,下列哪项是错误的()

- A. 是牙体硬组织的慢性损害
- B. 多发生在唇颊侧牙颈部

- C. 多见于青少年牙
- D. 前磨牙多见
- E. 一般有牙龈退缩

17、患者 20 岁，1 小时前外伤，自觉上前牙变短，要求治疗。查：左上 1 牙冠比邻牙短 3mm，牙冠完整，叩诊(+)，牙龈轻度红肿，X 线：根尖周膜消失。该牙处理为（ ）

- A. 待其自然萌出，定期观察
- B. 复位后固定，牙髓治疗
- C. 复位固定 4 周后，牙髓治疗
- D. 牙髓治疗后复位固定
- E. 拔除

18、患者男性 50 岁，上颌两侧 345 颊侧颈部楔状缺损，中等深度，探诊较敏感。患者因有事，要求一次完成治疗。最好选用下列哪种材料治疗（ ）

- A. 银汞合金
- B. 氧化锌丁香油糊剂
- C. 玻璃离子水门汀
- D. 复合树脂
- E. 磷酸锌水门汀

19、患者 16 岁，男性，1 小时前上前牙外伤，查：左上 1 唇向错位，松动 II 度，叩(±)，牙龈轻度红肿，右上 1 左上 2 叩(-)，松(-)，牙髓活力测验同对照牙，X 线未见根折，该患者处理为（ ）

- A. 自行愈合
- B. 调合观察
- C. 复位固定，观察
- D. 牙髓治疗后复位固定
- E. 拔除

20、患者因楔状缺损，复合树脂充填后一直冷热刺激痛，复诊。查：右上 6 颊面复合树脂充填物，叩(-)，冷测疼痛，去除刺激可缓解，该患者处理应为（ ）

- A. 观察
- B. 脱敏
- C. 去除旧充填体，复合树脂重新充填
- D. 去除旧充填体，氧化锌丁香油糊剂安抚
- E. 牙髓治疗

21、患者 1 年前，运动时上前牙碰伤，当时有咬物疼痛，无其他不适，未治疗。以后发现牙冠变色，其原因可能为（ ）

- A. 色素沉着
- B. 牙髓坏死

- C. 牙髓变性
- D. 牙本质变性
- E. 以上都不是

22、25 岁女性患者要求前牙美观治疗，查：上、下前牙有不同程度的散在黄褐色及白垩状斑，部分唇面釉质有缺损，探硬，光滑。该患牙治疗原则为（ ）

- A. 内脱色
- B. 外脱色
- C. 复合树脂贴面修复
- D. 牙髓治疗后桩冠修复
- E. 以上均可以

23、患者要求前牙美观治疗，自觉自牙萌出后牙面有花斑，而且周围邻牙也有类似表现，查：全口牙列均可见不同程度的散在黄褐色及白垩状斑。该患牙诊断为（ ）

- A. 釉质发育不全症
- B. 氟牙症
- C. 四环素牙
- D. 浅龋
- E. 遗传性乳光牙本质

24、患者半年来因右侧后牙咬合痛、冷热痛要求治疗。查右上 6 无龋，面近中可疑隐裂，冷热测引起疼痛，刺激去除后，持续数秒，叩诊(±)，右侧后牙不同程度磨损，探敏。该患者主诉牙治疗原则为（ ）

- A. 脱敏
- B. 不治疗
- C. 调
- D. 牙髓治疗后全冠修复
- E. 备洞充填

25、患者 30 岁，因右侧下后牙反复肿痛就诊。查：右下 5 无龋，面磨损可见牙本质暴露，探无应，叩(+)，X 线：根尖病变，根尖孔呈喇叭口状。造成该牙的原因可能为（ ）

- A. 磨损
- B. 牙隐裂
- C. 畸形中央尖
- D. 创伤
- E. 釉质发育不全

26、患者 30 岁，因治疗其他龋坏牙时，发现左上 5 面中央有一圆形钝锥形突起，上下前磨牙咬合关系正常，叩(-)，冷热测同照牙，该牙应如何处理（ ）

- A. 不必治疗，定期观察

- B. 备洞银汞充填
- C. 备洞玻璃离子充填
- D. 直接盖髓
- E. 活髓切断

27、患者上前牙外伤就诊。查：右上 1 牙冠松动Ⅲ度，牙龈出血，叩(++)，X 线片示：根折位于颈 1/3 处，剩余根长约 15mm。该牙处理为（ ）

- A. 拔除牙冠部分，直接修复
- B. 固定
- C. 拔除患牙
- D. 拔除牙冠部分，根部行根管治疗
- E. 直接光敏粘着修复

28、对于牙本质过敏首选的治疗方法有（ ）

- A. 药物脱敏
- B. 牙髓治疗
- C. 牙周洁治
- D. 垫底充填
- E. 树脂充填

29、牙再植后，X 线片显示牙根炎症性吸收的最早时间是（ ）

- A. 伤后 2~4 周
- B. 伤后 1~4 个月
- C. 伤后 2~5 个月
- D. 伤后 3~6 个月
- E. 伤后 1~7 个月

30、患者全口牙遇冷热敏感要求治疗。查：全口多个牙牙颈部探诊敏感，无缺损，牙龈轻度退缩，冷测敏感去除刺激可缓解。该患者应选用哪种治疗方法（ ）

- A. 氟化物脱敏
- B. 氨硝酸银脱敏
- C. 电凝法
- D. 充填治疗
- E. 牙髓治疗

31、患者右上后牙半年来咬物不适，偶有咬到一处时锐痛。检查：右上 4567 未见龋及牙周袋。右上 6 近中面可疑裂纹，冷敏感，X 线未见异常。该牙患以下哪种疾病的可能性最大（ ）

- A. 楔状缺损
- B. 隐裂
- C. 磨损
- D. 磨牙症

E. 慢性牙髓炎

32、患者因右侧牙冷热痛就诊。查：右上 6 重度磨损不均匀，未探及穿髓孔，热测引起疼痛并持续 2 分钟，叩(-)，该患牙处理原则为（ ）

A. 嘱患者少食硬食

B. 脱敏

C. 调合

D. 牙髓治疗

E. 全冠修复

33、患者因楔状缺损，复合树脂充填后，冷热刺激疼痛，不敢咬合。查：右上 456 复合树脂充填，右上 46 冷测疼痛，去除后可缓解，右上 5 叩(+)，冷热测疼痛明显，去除后持续一段时间。右上 5 的处理原则应为（ ）

A. 不治疗，观察

B. 脱敏治疗

C. 去除旧充填体，重新充填

D. 去除旧充填体，氧化锌丁香油糊剂安抚

E. 牙髓治疗

34、患者 18 岁，在治疗其他牙时，发现左上 2 畸形舌侧窝，深，可卡探针，温度测同对照牙。该牙的处理应为（ ）

- A. 不治疗
- B. 预防性充填
- C. 直接盖髓
- D. 活髓切断术
- E. 根管治疗

35、氨硝酸银溶液治疗作用是（ ）

- A. 直接杀菌作用
- B. 较强的渗透性
- C. 堵塞牙本质小管作用
- D. 氧化作用
- E. 还原作用

36、不能治疗牙本质过敏症的是以下哪种药物（ ）

- A. 0.76%单氟磷酸钠凝胶
- B. 碘化银
- C. 激光
- D. 碘甘油
- E. 75%氯化锶甘油

37、Turner 牙是指（ ）

- A. 先天性梅毒的半月形切牙

- B. 氟斑牙
- C. 牙中牙
- D. 因乳牙根尖周严重感染致其继承恒牙牙釉质发育不全
- E. 多生牙

38、畸形中央尖最常见于（ ）

- A. 下颌第一双尖牙
- B. 下颌第二双尖牙
- C. 上颌第一双尖牙
- D. 上颌第二双尖牙
- E. 下颌第一磨牙

39、牙纵折后最明显的症状是（ ）

- A. 牙伸长感
- B. 咀嚼痛
- C. 牙叩痛
- D. 冷刺激痛
- E. 热刺激痛

40、下列哪个时期生活在高氟区，可造成氟牙症发生（ ）

- A. 怀孕期～7 岁
- B. 8～15 岁

- C. 15~19 岁
- D. 23~30 岁
- E. 31 岁以后

41、牙本质暴露但未露髓的冠折牙，形成足够修复性牙本质的时间是（ ）

- A. 冠折后 1 月
- B. 冠折后 4~6 周
- C. 冠折后 6~8 周
- D. 冠折后 9~10 周
- E. 冠折后 8~9 周

42、关于四环素牙，下列哪一项错误（ ）

- A. 四环素可通过胎盘引起乳牙着色
- B. 四环素对牙的影响仅仅是着色，影响美观
- C. 通常前牙比后牙着色深
- D. 四环素在牙本质中的沉积比在釉质中高 4 倍
- E. 四环素牙的着色是永久的

43、关于氟斑牙，下列哪个说法是错误（ ）

- A. 氟主要损害釉质发育期牙胚的造釉细胞
- B. 饮用水是摄入氟的最大来源

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/857122061146010003>