

2024 年甘肃省宕昌县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题大全含答案（预热题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 需慎用司坦唑醇的是()

- A: 低血压患者
- B: 代谢性酸中毒患者
- C: 高血压患者
- D: 肝、肾病患者

答案：D

2. 下列对外用糖皮质激素的叙述，不正确的是

- A: 氟轻松是强效外用糖皮质激素
- B: 丁酸氢化可的松是中效外用糖皮质激素
- C: 醋酸氢化可的松是弱效外用糖皮质激素
- D: 糠酸莫米松是中效外用糖皮质激素

答案：D

3. 伊伐布雷定发挥作用特异性针对

- A: 心房传导
- B: 房室传导
- C: 心室传导
- D: 窦房结

答案：D

4. 耐青霉素酶青霉素类的是

- A: 青霉素 V
- B: 氨苄西林
- C: 苯唑西林
- D: 哌拉西林

答案：C

5. (2021 年真题) 血培养结果为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，首选的抗菌药物是 ()

- A: 青霉素 G
- B: 万古霉素
- C: 左氧氟沙星
- D: 头孢唑林

答案：B

6. 减少房水生成，治疗青光眼可选用

- A: 氢氯噻嗪
- B: 螺内酯
- C: 呋塞米
- D: 乙酰唑胺

答案：D

7. 下列药物中，不能增强他莫西芬活性和疗效的是

- A: 长春新碱
- B: 甲氨蝶呤
- C: 氟尿嘧啶
- D: 西咪替丁

答案：D

8. 甲状腺素

- A: 可导致血管神经性水肿、上呼吸道水肿及喉头水肿
- B: 可导致甲状腺功能低下
- C: 可导致粒细胞缺乏症
- D: 可诱发心绞痛和心肌梗死

答案：D

9. 可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂的药物是()

- A: 咪康唑
- B: 灰黄霉素
- C: 克霉唑
- D: 环丙沙星

答案：D

10. 华法林的抗凝血机制是

- A: 抑制血小板聚集
- B: 加速抗凝血酶Ⅲ的作用
- C: 抑制维生素 K 在肝细胞合成凝血因子
- D: 促进纤维蛋白溶解

答案：C

11. 长期大量服用维生素 D 会出现

- A: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- B: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- C: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活
- D: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

答案：B

12. 患者女，59 岁，既往高脂血症病史 5 年，心功能 II 级。因发现血压升高 7 天入院。入院查体血压 172/95mmHg，心率 62 次 / 分。该患者目前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀。

- A: 阿托伐他汀
- B: 辛伐他汀
- C: 洛伐他汀
- D: 普伐他汀

答案：A

13. 室性心律失常可用

- A: 地尔硫蕈
- B: 美西律
- C: 地高辛
- D: 普萘洛尔

答案：B

14. 吡嗪酰胺联用丙磺舒使

- A: 吸收减少
- B: 肝毒性增加
- C: 月经不规则
- D: 疗效减弱

答案：D

15. （2015 年真题）患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者用药过程中可能发生的典型不良反应是（ ）。

- A: 低血糖
- B: 光过敏
- C: 干咳
- D: 水肿

答案：C

16. 患者,男,64 岁因“慢性肾脏病、肾性高血压”入院,血压 203/110mmHg,该患者宜首选（如果疗程超过 72 小时需密切监测血中硫酸盐水平）的降压药物是

- A: 美托洛尔
- B: 氨氯地平
- C: 贝那普利
- D: 硝普钠

答案：D

17. 下列属于窄谱抗菌药物的是

- A: 头孢唑啉
- B: 阿莫西林
- C: 环丙沙星
- D: 氨基糖苷

答案：D

18. 普通感冒患者,有打喷嚏、流鼻涕的症状,宜选用的药物是()

- A: 右美沙芬片
- B: 对乙酰氨基酚滴剂
- C: 氯苯那敏片
- D: 茶碱缓释片

答案：C

19. 泛昔洛韦口服后代谢为

- A: 西多福韦
- B: 喷昔洛韦
- C: 更昔洛韦
- D: 阿昔洛韦

答案：B

20. 对肝素的正确描述是

- A: 可以口服给药
- B: 可抑制血小板聚集
- C: 直接抑制凝血因子的活化
- D: 仅在体内有抗凝作用

答案：C

21. （2016 年真题）属于 5α 受体还原酶抑制剂的抗良性前列腺增生症的药品是

- A: 酚妥拉明
- B: 普适秦
- C: 特拉唑嗪
- D: 度他雄胺

答案：D

22. 组胺 H

- A: 西咪替丁 > 雷尼替丁 > 法莫替丁
- B: 雷尼替丁 > 法莫替丁 > 西咪替丁
- C: 雷尼替丁 > 西咪替丁 > 法莫替丁
- D: 法莫替丁 > 雷尼替丁 > 西咪替丁

答案：D

23. 患者，男，65 岁。高血压病史 8 年，血压峰值 180/110mmHg，冠心病史 5 年，双侧肾动脉狭窄，不宜选用的抗高血压药是

- A: 赖诺普利
- B: 吧达帕胺
- C: 氨氯地平
- D: 普萘洛尔

答案：A

24. 可使后者疗效显著下降的是

- A: 维生素 C
- B: 红霉素
- C: 他莫昔芬
- D: 氯丙嗪

答案：A

25. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

- A: 超过常规服药时间的 12 小时后漏服，应在下次常规服药时间服用加倍剂量
- B: 在常规服药时间的 12 小时内漏服，应立即补服一次标准剂量，并按照常规服药时间服用下一次剂量
- C: 单次负荷量 300mg 开始，然后以 75mg，每日 1 次连续服药
- D: 发现氯吡格雷抗血小板作用不足者可进行代谢酶基因型检测

答案：A

26. 属于持续大剂量应用糖皮质激素引起的不良反应是

- A: 青光眼
- B: 骨质疏松症
- C: Cushing 综合征体型
- D: 胰腺炎

答案：C

27. 肝素的抗凝作用特点

- A: 必须有维生素 K 辅助
- B: 仅在体内有效
- C: 体内、体外均有效
- D: 仅在体外有效

答案：C

28. 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

- A: 能刺激脂蛋白脂肪酶的释放，加速血液循环中脂蛋白的清除
- B: 体外试验具有直接的抗凝活性，可抑制体外凝血过程
- C: 通过增强抗凝血酶川（AT-III）的活性，抑制凝血因子 IIa 和 Xa 发挥抗凝作用
- D: 能使凝血级联的丝氨酸蛋白酶失活

答案：C

29. 在体外无抗凝作用，在体内有抗凝作用的是

- A: 肝素
- B: 噻氯匹定
- C: 华法林
- D: 尿激酶

答案：C

30. 阿斯综合征患者禁用

- A: 丙戊酸钠
- B: 卡马西平
- C: 氨己烯酸
- D: 苯妥英钠

答案：D

31. 易引起吉海反应的药物是()

- A: 庆大霉素
- B: 青霉素
- C: 四环素
- D: 诺氟沙星

答案：B

32. 促进尿酸排泄的抗痛风代表药物是

- A: 丙磺舒
- B: 扑热息痛
- C: 塞来昔布
- D: 别嘌醇

答案：A

33. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

- A: 餐后服用比餐前效果佳
- B: 具有抗雄激素样作用，剂量过大可出现男性乳房女性化、女性泌乳等
- C: 停药后复发率高
- D: 餐前服用比餐后效果佳

答案：D

34. 属于雌激素类退乳药的是()

- A: 睾酮
- B: 他莫昔芬
- C: 甲羟孕酮
- D: 己烯雌酚

答案：D

35. 血管紧张素转化酶 I 抑制剂是()

- A: 多巴酚丁胺
- B: 米力农
- C: 依那普利
- D: 地高辛

答案：C

36. 利多卡因的电生理作用错误的是()

- A: 显著减慢传导
- B: 缩短 APD
- C: 降低自律性
- D: ERP 相对延长

答案：A

37. 鲑降钙素对骨质疏松症进行治疗期间，为防继发性甲状旁腺功能亢进需要补充

- A: 双膦酸盐类骨吸收抑制剂
- B: 维生素 D
- C: 钙剂
- D: 铁剂

答案：C

38. 通过抑制 α -葡萄糖苷酶，减少多糖水解为葡萄糖()

- A: 格列本脲
- B: 艾塞那肽
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案：C

39. 主要用于治疗皮肤真菌感染，可抑制角鲨烯环氧酶活性，属于丙烯胺类的抗真菌药物是

- A: 特比萘芬
- B: 阿莫罗芬
- C: 联苯苄唑
- D: 制霉菌素

答案：A

40. 茶碱属于

- A: β 肾上腺素受体激动剂
- B: 黄嘌呤类药物
- C: 白三烯调节剂
- D: M 胆碱受体阻断剂

答案：B

41. 治疗高脂血症达到中等强度（每日剂量可降低 LDL30%~50%），所需药物剂量最小的是

- A: 辛伐他汀
- B: 匹伐他汀
- C: 氟伐他汀
- D: 洛伐他汀

答案：B

42. 伴随剂量增大，阿托品出现的症状以下排序正确的是

- A: 瞳孔扩大、心率加快、胃液分泌抑制、胃肠道平滑肌兴奋性降低
- B: 心率减慢、心率加快、显著口干、肠蠕动减少
- C: 显著口干、心率减慢、心率加快、肠蠕动减少
- D: 心率加快、心率减慢、显著口干、肠蠕动减少

答案：B

43. 卡泊芬净属于()

- A: 棘白菌素类抗真菌药
- B: 多烯类抗真菌药
- C: 唑类抗真菌药
- D: 丙烯胺类抗真菌药

答案：A

44. 主要用于肺炎支原体、衣原体、立克次体及螺旋体（四体）感染的药物是

- A: 阿奇霉素
- B: 头孢米诺

C: 红霉素

D: 四环素

答案: D

45. 长期大量应用可致视神经炎、视力下降、视野缩小，出现盲点的是

A: 乙胺丁醇

B: 链霉素

C: 利福平

D: 异烟肼

答案: A

46. 氯霉素属于

A: 酰胺醇类

B: β -内酰胺类

C: 氨基糖苷类

D: 四环素类

答案: A

47. (2019 年真题) 患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适宜使用的药物是 ()

A: 美托洛尔

B: 贝那普利

C: 硝普钠

D: 氨氯地平

答案: A

48. 患者女性，30 岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌肉注射后，10 分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

- A: 链霉素引起的过敏性休克
- B: 链霉素引起的神经毒性
- C: 链霉素引起的神经肌肉阻滞作用
- D: 链霉素引起的肾毒性

答案：A

49. 阿司匹林预防血栓形成的机制是

- A: 抑制 TXA₂ 的合成
- B: 促进 PG 的合成
- C: 抑制 PABA 的合成
- D: 抑制 GABA 的合成

答案：A

50. 对抗杆菌属等厌氧菌具有抗菌活性，属于头霉素类的抗菌药物是()

。

- A: 头孢美唑
- B: 氨曲南
- C: 亚胺培南
- D: 头孢吡肟

答案：A

51. 作用机制是抑制纯化的 HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶，与蛋白酶的活性部位直接结合，是蛋白酶的竞争性抑制剂，这种竞争性结合阻碍了病毒颗粒成熟过程中病毒前体多蛋白的裂解过程，由此产生的不成熟的病毒颗粒不具有感染性，无法建立新一轮感染，该类药物是

- A: 核苷类反转录酶抑制药
- B: 非核苷类反转录酶抑制药
- C: 整合酶抑制剂
- D: 蛋白酶抑制药

答案：D

52. 可引起女性男性化、男性乳房胀痛的是

- A: 非那雄胺
- B: 普适泰
- C: 十一酸睾酮
- D: 哌唑嗪

答案：C

53. 用于白色念珠菌、隐球菌和球孢子菌等引起的感染的药物是

- A: 两性霉素 B
- B: 制霉菌素
- C: 益康唑
- D: 咪康唑

答案：B

54. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的是

- A: 卡托普利
- B: 氯沙坦
- C: 硝苯地平
- D: 普萘洛尔

答案：B

55. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 双歧杆菌
- B: 粪肠球菌
- C: 嗜酸乳杆菌
- D: 梭状芽孢杆菌

答案：D

56. 与避孕药合用，可能导致避孕失败的药物不包括

- A: 苯巴比妥
- B: 四环素
- C: 环孢素
- D: 利福平

答案：C

57. 大剂量可导致 Q-Tc 间期延长的是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 多潘立酮
- C: 莫沙必利
- D: 西沙必利

答案：D

58. 不易透过血-脑屏障，药理作用单一，主要用于治疗膀胱过度活动症的非选择性 M 受体阻断药是

- A: 奥昔布宁
- B: 索利那新
- C: 托特罗定

D: 黄酮哌酯

答案: C

59. 可能引起持续性干咳的抗高血压药是

A: 阿托普利

B: 硝普钠

C: 氨氯地平

D: 阿利克仑（阿利吉仑）

答案: A

60. 组胺 H

A: 消化性溃疡

B: 变态反应性疾病

C: 失眠

D: 肠激惹综合征

答案: A

61. 起效缓慢,可增加心力衰竭和女性骨折风险的口服抗糖尿病药物是
()

A: 利拉鲁肽

B: 艾塞那肽

C: 罗格列酮

D: 瑞格列奈

答案: C

62. 长期服用糖皮质激素不会产生下列哪种副作用 ()

A: 满月脸

B: 肾上腺皮质萎缩

C: 溃疡或出血穿孔

D: 高血钾

答案: D

63. 与碳酸氢钠等碱性药物并用，能引起尿液及粪便变色的是

A: 开塞露

B: 酚酞

C: 聚乙二醇 4000

D: 乳果糖

答案: B

64. 为避免引起大面积中毒性表皮坏死松解症，服用前提倡做人体白细胞抗原等位基因（HLA-B*1502）检测的抗癫痫药是

A: 丙戊酸钠

B: 氯硝西泮

C: 托吡酯

D: 卡马西平

答案: D

65. 甲羟孕酮口服用于功能失调性子宫出血(功血)止血的用法用量是

A: 口服一日 4~8mg，连服 5~10 日

B: 于月经后半周期(撤退性出血的第 16~25 日)开始口服，一次 10mg，一日 1 次，连用 10~14 日，酌情应用 3~6 个周期

C: 口服，一次 10~20mg，每 4~8 小时一次，连用 2~3 日；血止后每隔 3 日递减 1/3 剂量，直至维持量每日 100mg，连续用药至血止后 21 日停药

D: 一日 30mg，连服 6 个月

答案: C

66. 下述关于甘油的描述，错误的是()

- A: 用于便秘的治疗
- B: 属于润滑性泻药
- C: 属于渗透性泻药
- D: 孕妇慎用

答案: C

67. 红霉素不是下列哪些疾病的首选药物

- A: 骨髓炎
- B: 空肠弯曲杆菌肠炎
- C: 白喉带菌者
- D: 婴幼儿支原体肺炎

答案: A

68. 下列关于过氧化氢的用法及注意事项，叙述错误的是

- A: 遇光稳定，不易变质
- B: 遇氧化物或还原物即迅速分解并产生泡沫
- C: 避免皮肤及黏膜接触高浓度溶液
- D: 妊娠及哺乳期妇女慎用

答案: A

69. 雌激素替代疗法应在绝经后几年之内开始

- A: 4
- B: 8
- C: 2
- D: 6

答案: D

70. 噻嗪类利尿药发挥利尿作用的主要作用靶点是

- A: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子
- B: 远曲小管近端
- C: 磷酸二酯酶
- D: Na^+-Cl^- 共转运子

答案：D

71. 治疗立克次体感染所致斑疹伤寒应首选

- A: 青霉素
- B: 庆大霉素
- C: 链霉素
- D: 四环素

答案：D

72. 痛风急性发作时首选的药物是

- A: 苯溴马隆
- B: 秋水仙碱
- C: 非布司他
- D: 碳酸氢钠

答案：B

73. 华法林过量导致的出血可选用的拮抗剂是()

- A: 氨甲苯酸
- B: 维生素 K
- C: 硫酸鱼精蛋白
- D: 维生素 B

答案：B

74. (2017 年真题) 前庭功能失调 (眩晕) ()

- A: 左氧氟沙星
- B: 米诺环素
- C: 哌拉西林
- D: 甲硝唑

答案: B

75. 抗炎效能最大的糖皮质激素是

- A: 甲泼尼龙
- B: 氟氢可的松
- C: 地塞米松
- D: 氢化可的松

答案: C

76. 主要抑制排卵的短效口服避孕药

- A: 复方炔诺酮片
- B: 雌三醇
- C: 雌二醇
- D: 炔诺酮

答案: A

77. 氯吡格雷临床应用

- A: 急性中性粒细胞减少症
- B: 缺铁性贫血
- C: 缺血性脑卒中
- D: 失去药效

答案: C

78. (2015 年真题) 属于膨胀性泻药的是 ()。

- A: 甘油 (开塞露)
- B: 乳果糖
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 酚酞

答案: C

79. 复方炔诺酮 ()

- A: 减少精子数目
- B: 抑制排卵作用
- C: 抗着床
- D: 促进蛋白质合成

答案: B

80. 糖尿病患者应慎用的高效能利尿剂是 ()

- A: 呋塞米
- B: 乙酰唑胺
- C: 氢氯噻嗪
- D: 阿米洛利

答案: A

81. 下列药物中，属于非二氢吡啶类钙通道阻滞药的是 ()

- A: 尼莫地平
- B: 维拉帕米
- C: 硝苯地平
- D: 氨氯地平

答案: B

82. 奥昔布宁、托特罗定与索利那新的代谢酶是

A: CYP3A5

B: CYP3A4

C: CYP2C9

D: CYP3A7

答案：B

83. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的药物是

A: 阿格列汀

B: 伏格列波糖

C: 那格列奈

D: 利拉鲁肽

答案：B

84. 高效选择性 5-HT

A: 甲氧氯普胺

B: 莫沙必利

C: 多潘立酮

D: 西沙必利

答案：B

85. 干扰核酸生物合成的抗恶性肿瘤药是

A: 吉非替尼

B: 多柔比星

C: 环磷酰胺

D: 5-氟尿嘧啶

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/858010104044007022>